



实分析

作者: 邹文杰

组织: 无

时间: 2024/10/25

版本: ElegantBook-4.5

自定义: 信息



宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 \mathbb{R}^n 的拓扑性质	1
1.1 \mathbb{R}^n 中开集、闭集及其性质	1
1.1.1 n 维欧氏空间	1
1.1.2 \mathbb{R}^n 中的开集及其性质	2
1.1.3 \mathbb{R}^n 中的闭集及其性质	3
1.2 \mathbb{R}^n 中点集的距离	6
1.2.1 点集距离概念及性质	6
1.2.2 \mathbb{R}^n 上的完备性定理及应用	7
1.3 一维开集的构造与 Cantor 集	11
1.3.1 一维开集的构造	11
1.3.2 Cantor 集	12

第 1 章 \mathbb{R}^n 的拓扑性质

1.1 \mathbb{R}^n 中开集、闭集及其性质

1.1.1 n 维欧氏空间

定义 1.1

我们用 \mathbb{R}^n 表示 n 维欧氏空间, 即

$$\mathbb{R}^n = \{x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) : \xi_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n\}.$$


其中, ξ_i 称为 x 的第 i 个坐标.

定义 1.2 (\mathbb{R}^n 中的加法与数乘)

设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \in \mathbb{R}^n, k \in \mathbb{R}$, 定义 \mathbb{R}^n 中的加法、数乘分别为

$$x + y = (\xi_1 + \eta_1, \xi_2 + \eta_2, \dots, \xi_n + \eta_n)$$

$$kx = (k\xi_1, k\xi_2, \dots, k\xi_n)$$

 **笔记** 不难证明 \mathbb{R}^n 在上述加法和数乘下构成线性空间.

定义 1.3 (\mathbb{R}^n 中两点之间距离)

对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 设 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i - \eta_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

表示点 x 到 y 的**距离**. 通常记 $d(x, 0) = \|x\|$, 表示 x 的**范数**, 若 $x \in \mathbb{R}^1$, 则 $\|x\|$ 即为 x 的绝对值.

命题 1.1 (\mathbb{R}^n 中两点之间距离的基本性质)

- (1) (非负性) 对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 我们有 $d(x, y) \geq 0$, 当且仅当 $x = y$ 时等号成立;
- (2) (对称性) 对于任意的 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 我们有 $d(x, y) = d(y, x)$;
- (3) (三角不等式) 对任意的 $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, 都有

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y).$$

证明 (1) 和 (2) 的证明是显然的. 下面证明 (3). 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n), z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, 则

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i + z_i - y_i)^2},$$

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2}, d(z, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (z_i - y_i)^2}.$$

记 $x_i - z_i = a_i, z_i - y_i = b_i$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$. 则

$$d(x, z) = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2}, d(z, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}, \quad (1.1)$$

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i + z_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i + b_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n a_i b_i}. \quad (1.2)$$

又由 Cauchy - Schwarz 不等式可得

$$(\sum_{i=1}^n a_i b_i)^2 \leq (\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2).$$

从而

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt{(\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2)}. \quad (1.3)$$

于是结合(1.1)(1.2)(1.3)式可得

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n a_i b_i} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i=1}^n b_i^2 + 2 \sqrt{(\sum_{i=1}^n a_i^2)(\sum_{i=1}^n b_i^2)}} \\ &= \sqrt{[\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}]^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2} = d(x, z) + d(z, y). \end{aligned}$$

□

定义 1.4

设 $\{x_k\}$ 为 \mathbb{R}^n 中的点列, 若存在 $x \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, x) = 0$$

则称 $\{x_k\}$ 收敛于 x , 记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$ 或 $x_k \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$.

♣

命题 1.2

设 $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$, 则 $\{x_k\}$ 是收敛数列, 当且仅当

$$\lim_{i, j \rightarrow \infty} d(x_i, x_j) = 0$$

♣

证明 设 $x_k = (\xi_1^{(k)}, \xi_2^{(k)}, \dots, \xi_n^{(k)})$, $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$. 注意到

$$|\xi_i^{(k)} - \xi_i| \leq d(x_k, x) \leq \sum_{i=1}^n |\xi_i^{(k)} - \xi_i|$$

易证 $x_k \rightarrow x$, 当且仅当对每个坐标位置 i , 都有 $\xi_i^{(k)} \rightarrow \xi_i (k \rightarrow \infty)$. 再由柯西收敛准则即可得到证明.

□

1.1.2 \mathbb{R}^n 中的开集及其性质

定义 1.5 (邻域、内点、内部和开集)

设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $\varepsilon > 0$, 定义

$$U(x_0, \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, x_0) < \varepsilon\}$$


为 x_0 的 ε -邻域.

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, $x \in A$, 若存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $U(x, \varepsilon_0) \subset A$, 则称 x 为 A 的内点. A 的全体内点, 记为 A° , 也称为 A 的内部.

若 A 中每个点都是 A 的内点, 则称 A 为开集. 此即对 $\forall x \in A$, 都存在 $r_x > 0$, 使得

$$U(x, r_x) \subset A.$$

♣

 **笔记** (a, b) , $(-\infty, a)$, $(a, +\infty)$ 都是 \mathbb{R} 中的开集; 邻域 $U(x_0, r)$, 又称以 x_0 为心、以 r 为半径的开球, 是 \mathbb{R}^n 中的开集; A° 也是开集.

命题 1.3 (开集的性质)

- (1) \emptyset 和 \mathbb{R}^n 是开集;
- (2) 任意个开集的并集是开集;
- (3) 有限个开集的交集是开集.



注 无限个开集的交集不一定是开集. 例如

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \{0\}.$$

证明

(1) 显然.

(2) 设 $\{G_\alpha : \alpha \in \Gamma\}$ 为一族开集. 任取 $x \in \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$, 则存在 $\alpha_0 \in \Gamma$ 使得 $x \in G_{\alpha_0}$. 由于 G_{α_0} 是开集, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$U(x, \varepsilon_0) \subset G_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$$

故 x 是 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$ 的内点. 再由 x 的任意性知 $\bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_\alpha$ 是开集.

(3) 设 G_1, G_2, \dots, G_n 为开集, 任取 $x \in \bigcap_{i=1}^n G_i$, 则 $x \in G_i, i = 1, 2, \dots, n$. 由于 G_i 是开集, 故存在 $\varepsilon_i > 0$ 使得

$$U(x, \varepsilon_i) \subset G_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

令 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$, 则 $\varepsilon > 0$ 且 $U(x, \varepsilon) \subset \bigcap_{i=1}^n G_i$, 故 x 是 $\bigcap_{i=1}^n G_i$ 的内点. 再由 x 的任意性知 $\bigcap_{i=1}^n G_i$ 是开集.

□

命题 1.4

设 A 为非空集合, 则 A° 为开集.



证明 任取 $x \in A^\circ$, 则存在 $r > 0$ 使得 $U(x, r) \subset A$. 对 $\forall y \in U(x, r)$, 令 $\delta = r - d(x, y)$, 则易知 $U(y, \delta) \subset A$, 故 $y \in A^\circ$. 从而 $U(x, r) \subset A^\circ$, 因此, A° 是开集.

□

1.1.3 \mathbb{R}^n 中的闭集及其性质**定义 1.6 (聚点、极限点和孤立点)**

设 $x_0 \in \mathbb{R}^n, A \subset \mathbb{R}^n$. 若对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有

$$U(x_0, \varepsilon) \cap (A - \{x_0\}) \neq \emptyset.$$

则称 x_0 为 A 的**聚点**或**极限点**.

不是聚点, 即存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得

$$U(x_0, \varepsilon_0) \cap (A - \{x_0\}) = \emptyset$$

则称 x_0 为 A 的**孤立点**.



注 \mathbb{R}^n 空间, 聚点 = 内点 + 边界点, 故聚点不一定属于 A , 比如边界点. 例如, $A = (0, 1)$, 则 $[0, 1]$ 都是 A 的聚点.

命题 1.5 (\mathbb{R}^n 中聚点的等价条件)

设 $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $A \subset \mathbb{R}^n$. 则 x_0 是 A 的聚点等价于:

- (1) 对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $U(x_0, \varepsilon) \cap (A - \{x_0\}) \neq \emptyset$.
- (2) 对 $\forall \varepsilon > 0$, $U(x, \varepsilon)$ 中含有无穷多 A 中的点.

证明 (2) \Leftarrow (1) 是显然的. 下证 (1) \Rightarrow (2).

假设存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得

$$U(x_0, \varepsilon_0) \cap (A - \{x_0\}) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

令


$$\delta = \min\{|x_0 - x_i| : i = 1, 2, \dots, n\}$$

则 $U(x_0, \delta)$ 中不含 A 中异于 x_0 的点, 这与 x_0 是 A 的聚点矛盾. \square

定义 1.7 (导集、完全集、闭包和闭集)

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则 A 的聚点的全体, 称为 A 的**导集**, 记为 A' . 若 $A' = A$, 则称 A 为**完全集** (无孤立点). $A - A'$ 中的点, 即为所有孤立点.

$A \cup A'$ 称为 A 的**闭包**, 记为 \bar{A} . 开集的余集, 称为**闭集**.

 **笔记** 例如, $[a, b]$, $(-\infty, a]$, $[a, +\infty)$ 都是 \mathbb{R} 中的闭集; 以 x_0 为心, 以 r 为半径的闭球 $B(x_0, r) = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, x_0) \leq r\}$ 是 \mathbb{R}^n 中的闭集; A' , \bar{A} 也是闭集.

命题 1.6

- (1) 若 $A \subset B$, 则 $A' \subset B'$;
- (2) $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

证明 利用导集的定义容易验证. \square

命题 1.7 (闭集的性质)

- (1) \emptyset 和 \mathbb{R}^n 是闭集;
- (2) 任意个闭集的交集是闭集;
- (3) 有限个闭集的并集是闭集.

注 无限个闭集的并集不一定是闭集. 例如, $\bigcup_{n=1}^{\infty} [1/n, 1] = (0, 1]$.

证明 由命题 1.3, 闭集的定义以及 De Morgan 定律, 容易验证. \square

命题 1.8

设 $A \subset \mathbb{R}^n$, 则

- (1) $x \in A' \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset (A - \{x\})$ 使得 $x_n \rightarrow x$;
- (2) $x \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists \{x_n\} \subset A$ 使得 $x_n \rightarrow x$.

证明 (1) “ \Rightarrow ”. 若 $x \in A'$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $U(x, \varepsilon) \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$. 特别地, 依次令 $\varepsilon_n = 1/n$, $n = 1, 2, \dots$, 取 $x_n \in U(x, 1/n) \cap (A - \{x\})$, 则 $x_n \rightarrow x$.

“ \Leftarrow ”. 设 $\{x_n\} \subset (A - \{x\})$ 满足 $x_n \rightarrow x$. 由于 $x_n \rightarrow x$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得当 $n \geq N$ 时有 $d(x_n, x) < \varepsilon$, 即 $x_n \in U(x, \varepsilon)$. $\forall n \geq N$. 又 $x_n \neq x$, 故 $U(x, \varepsilon) \cap (A - \{x\}) \neq \emptyset$. 因此, $x \in A'$.

(2) “ \Rightarrow ”. $\bar{A} = A \cup A'$. 若 $x \in A$, 令 $x_n = x$, $n \in \mathbb{N}$, 则 $x_n \rightarrow x$. 若 $x \in A'$, 由 (i) 知, 结论仍然成立.

“ \Leftarrow ”. 设 $\{x_n\} \subset A$ 满足 $x_n \rightarrow x$. 若 $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $x_{n_0} = x$, 则 $x \in A \subset \bar{A}$. 否则 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $x_n \neq x$, 则由 (i)

知, $x \in A' \subset \bar{A}$. □

定理 1.1

A 为闭集 $\Leftrightarrow A' \subset A$. ♡

证明 “ \Rightarrow ”. 设 A 为闭集, 则 A^c 为开集. 任取 $x \in A'$, 往证 $x \in A$, 即 $x \notin A^c$. 若 $x \in A^c$, 由于 A^c 是开集, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $U(x, \varepsilon_0) \subset A^c$. 故 $U(x, \varepsilon_0) \cap A = \emptyset$, 从而 $U(x, \varepsilon_0) \cap (A - \{x\}) = \emptyset$. 这与 $x \in A'$ 矛盾.

“ \Leftarrow ”. 设 $A' \subset A$, 往证 A 是闭集, 即 A^c 是开集. 任取 $x \in A^c$, 由于 $A' \subset A$, 则 $x \notin A'$. 故 $\exists \varepsilon_0 > 0$ 使得 $U(x, \varepsilon_0) \cap (A - \{x\}) = \emptyset$, 从而

$$U(x, \varepsilon_0) \subset (A - \{x\})^c = (A \cap \{x\}^c)^c = A^c \cup \{x\} = A^c$$

因此, A^c 是开集. □

定理 1.2

A 为闭集 $\Leftrightarrow A = \bar{A}$. ♡

注 闭集 $A = \bar{A}$, 再由命题 1.8(2)知, 闭集中任一点都能找到闭集中的点列收敛到该点. 这也是闭集才具有的好的性质.

证明 “ \Rightarrow ”. A 为闭集, 则 $A' \subset A$. 故 $\bar{A} = A \cup A' \subset A \subset \bar{A}$. 因此, $A = \bar{A}$.

“ \Leftarrow ”. 若 $A = \bar{A}$, 则 $A' \subset \bar{A} = A$, 故 A 是闭集. □

定理 1.3

设 A 为一个非空集合, 则 A' 为闭集. ♡

证明 只需证明 $(A')' \subset A'$. 设 $x \in (A')'$, 由命题 1.8(1), 存在 $\{x_n\} \subset A' - \{x\}$ 使得 $x_n \rightarrow x$. 往证 $x \in A'$, 即存在 $\{y_n\} \subset A - \{x\}$ 使得 $y_n \rightarrow x$.

对于固定的 $n \in \mathbb{N}$, 由于 $x_n \in A'$, 则存在 $y_n \in A - \{x, x_n\}$ 使得 $d(y_n, x_n) < 1/n$. 于是

$$d(y_n, x) \leq d(y_n, x_n) + d(x_n, x) \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$$

故 $y_n \rightarrow x$. □

定义 1.8 (连续映射)

设 X, Y 为距离空间, 称映射 $f: X \rightarrow Y$ 在点 $x_0 \in X$ 处连续, 是指对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得当 $d(x, x_0) < \delta$ 时, 有 $d(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$.

若 f 在任意点 $x \in X$ 都连续, 则称 f 为 X 上的连续映射. ♣

注 f 在 x_0 点连续可等价地用集合语言描述如下:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 使得 } f(U(x_0, \delta)) \subset U(f(x_0), \varepsilon)$$

定理 1.4 (连续映射的充要条件)

设 $f: X \rightarrow Y$ 是映射, 则下列条件等价:

- (1) f 连续;
 - (2) Y 的任一开集在 f 下的原象是 X 中的开集;
 - (3) Y 的任一闭集在 f 下的原象是 X 中的闭集.
- ♡

注 若上述定理的 (2) 换成 “ X 的任一开集在 f 下的象是 Y 中的开集”, 结论不一定成立. 因为连续映射在开集上的象未必是开集. 例如, $f(x) = |x|$, 则 f 在开区间 $(-1, 1/2)$ 上连续, 但 f 的象是 $[0, 1)$, 不是开集.

证明 (1) \Rightarrow (2). 设 f 连续, $G \subset Y$ 为开集. 不妨设 $f^{-1}(G) \neq \emptyset$, 任取 $x_0 \in f^{-1}(G)$, 则 $f(x_0) \in G$. 由于 G 是开集, 则

$\exists \varepsilon > 0$ 使得 $U(f(x_0), \varepsilon) \subset G$. 又 f 连续, 则对上述 $\varepsilon, \exists \delta > 0$ 使得

$$f(U(x_0, \delta)) \subset U(f(x_0), \varepsilon) \subset G$$

从而 $U(x_0, \delta) \subset f^{-1}(G)$. 这就证明了 x_0 是 $f^{-1}(G)$ 的内点. 因此, $f^{-1}(G)$ 是开集.

(2) \Rightarrow (1). 设 $x_0 \in X$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 都有 $U(f(x_0), \varepsilon)$ 是 Y 中的开集, 从而由 (2) 知 $f^{-1}(U(f(x_0), \varepsilon))$ 是 X 中的开集. 又 $x_0 \in f^{-1}(U(f(x_0), \varepsilon))$, 则存在 $\delta > 0$ 使得

$$U(x_0, \delta) \subset f^{-1}(U(f(x_0), \varepsilon))$$

故 $f(U(x_0, \delta)) \subset U(f(x_0), \varepsilon)$, 从而 f 在点 x_0 连续, 再由 x_0 的任意性知 f 连续.

(2) \Rightarrow (3). 设 $F \subset Y$ 为闭集, 则 F^c 是开集, 故由 (2) 知 $f^{-1}(F^c)$ 是 X 中的开集. 于是, $f^{-1}(F) = (f^{-1}(F^c))^c$ 是 X 中的闭集.

(3) \Rightarrow (2) 类似. □

1.2 \mathbb{R}^n 中点集的距离

1.2.1 点集距离概念及性质

定义 1.9

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集, 则 A 的直径定义为

$$\text{diam}(A) = \sup\{d(x, y) : x, y \in A\}$$

若 $\text{diam}(A) < \infty$, 则称 A 为有界集. 容易验证: A 有界, 当且仅当存在 $M \geq 0$ 使得 $d(\mathbf{0}, x) \leq M, \forall x \in A$.

设 $x \in \mathbb{R}^n$, 则点 x 到集合 A 的距离定义为

$$d(x, A) = \inf\{d(x, y) : y \in A\}$$

设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集, 则集合 A 到 B 的距离定义为

$$d(A, B) = \inf\{d(x, y) : x \in A, y \in B\}$$

命题 1.9

设 E 为 \mathbb{R}^n 中的非空点集, 则 $d(x, E)$ 作为 x 的函数在 \mathbb{R}^n 上是一致连续的. ▲

证明 设 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 由 $d(y, E)$ 的定义, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $z \in E$ 使得 $d(y, z) < d(y, E) + \varepsilon$. 从而

$$d(x, E) \leq d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + d(y, E) + \varepsilon$$

由 ε 的任意性, $d(x, E) - d(y, E) \leq d(x, y)$. 同理可证 $d(y, E) - d(x, E) \leq d(x, y)$. 从而

$$|d(x, E) - d(y, E)| \leq d(x, y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

因此, $d(x, E)$ 在 \mathbb{R}^n 上是一致连续. □

命题 1.10

设 F_1, F_2 为 \mathbb{R}^n 中互不相交的非空闭集, 则存在 \mathbb{R}^n 上的连续函数 $f(x)$ 满足:

(i) $0 \leq f(x) \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}^n$;

(ii) $F_1 = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 1\}, F_2 = \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0\}$. ▲

证明 定义函数

$$f(x) = \frac{d(x, F_2)}{d(x, F_1) + d(x, F_2)}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

则由命题 1.9 以及连续函数四则运算封闭性知 $f(x)$ 连续. 容易验证 $f(x)$ 满足条件 (i), (ii). □

命题 1.11

\mathbb{R}^n 中每个闭集可表示为可列个开集的交集; 每个开集可表示为可列个闭集的并集.



证明 首先证明: 若 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空集, $r > 0$, 则 $G = \{x \in \mathbb{R}^n : d(x, A) < r\}$ 是开集. 实际上, 任取 $x \in G$, 则 $d(x, A) < r$. 令 $h = r - d(x, A)$, 则对 $\forall y \in U(x, h/2)$, 有

$$d(y, A) \leq d(y, x) + d(x, A) < \frac{h}{2} + d(x, A) = \frac{r}{2} + \frac{d(x, A)}{2} < r$$

故 $U(x, h/2) \subset G$. 从而 x 是 G 的内点, 因此, G 是开集.

(1) 设 $F \subset \mathbb{R}^n$ 为闭集, 令

$$G_n = \left\{x \in \mathbb{R}^n : d(x, F) < \frac{1}{n}\right\}$$

则 G 是开集. 下面证 $F = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$.

设 $x \in F$, 则 $d(x, F) = 0 < 1/n, n = 1, 2, \dots$, 故 $x \in G_n, n = 1, 2, \dots$, 于是 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$. 从而 $F \subset \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$.

设 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 则 $x \in G_n, n = 1, 2, \dots$, 故 $d(x, F) < 1/n, n = 1, 2, \dots$. 令 $n \rightarrow \infty$, 可得 $d(x, F) = 0$. 又 F 是闭集,

故 $x \in F$. 从而 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n \subset F$.

(2) 设 $G \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 G^c 是闭集. 由 (1) 知 $G^c = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$, 其中, G_n 为开集. 从而 $G = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n\right)^c = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n^c$,

其中 G_n^c 为闭集.

特别地, 对于一维的闭区间与开区间, 有

$$[a, b] = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(a - \frac{1}{n}, b + \frac{1}{n}\right), \quad (a, b) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}\right]$$

□

1.2.2 \mathbb{R}^n 上的完备性定理及应用

我们知道, 数学分析中学过的实数集完备性的基本定理是构建极限理论和数学分析的基础. 实际上这些结果在 \mathbb{R}^n 中仍然成立.

定理 1.5 (致密性定理)

\mathbb{R}^n 中任意有界点列都存在收敛子列.



证明 设 $\{x_k\} \subset \mathbb{R}^n$ 为有界点列, 记

$$x_k = (x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}), \quad k = 1, 2, \dots$$

注意到 $|x_i^{(k)}| \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i^{(k)}|^2\right)^{1/2} = d(x_k, \mathbf{0})$, 则 $\{x_1^{(k)}\}$ 是 \mathbb{R} 中的有界数列, 由 \mathbb{R} 上的致密性定理, 存在 $\{x_1^{(k)}\}$ 的子列 $\{x_1^{(k_i)}\}$ 满足 $x_1^{(k_i)} \rightarrow x_1$; 同理, 实数列 $\{x_2^{(k_i)}\}$ 进而 $\{x_2^{(k_{i_j})}\}$ 有界, 由 \mathbb{R} 上的致密性定理, 存在 $\{k_{i_j}\}$ 的子列 $\{k_{i_{j_l}}\}$ 使得 $x_2^{(k_{i_{j_l}})} \rightarrow x_2$; 以此类推 $\dots\dots$; 存在 $\{k_{n-1}\}$ 的子列 $\{k_n\}$ 使得 $x_n^{(k_n)} \rightarrow x_n$. 令 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 则

$$d(x_{k_n}, x) = \left(\sum_{i=1}^n (x_i^{(k_n)} - x_i)^2\right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0$$

因此, $x_{k_n} \rightarrow x, k_n \rightarrow \infty$.

□

定理 1.6 (闭集套定理)

设 $\{A_n\}$ 为 \mathbb{R}^n 中一列单调递减的非空闭集列, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 为非空有界闭集. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(A_n) = 0$, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 为单点集.

证明 $A_n \neq \emptyset$, 取 $x_n \in A_n, n \in \mathbb{N}$, 则 $\{x_n\}$ 有界. 由致密性定理, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 满足 $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$.

由于 $\{A_n\}$ 单调递减, 则对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有 $x_{n_k}, x_{n_{k+1}}, \dots \in A_{n_k}$. 注意到 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ 以及 A_{n_k} 是闭集, 可得 $x_0 \in A_{n_k} \subset A_k$ (因为 $n_k \geq k$). 因此, $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(A_n) = 0$. 若存在 $y_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 且 $y_0 \neq x_0$, 则

$$\text{diam}(A_n) \geq \text{diam}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) \geq d(x_0, y_0)$$

这与 $\text{diam}(A_n) \rightarrow 0$ 矛盾. □

定理 1.7 (有限覆盖定理)

设 A 为 \mathbb{R}^n 中的有界闭集, 若 $A \subset \bigcup_{\alpha \in \Gamma} G_{\alpha}$, 其中 G_{α} 为开集, 则存在 G_1, G_2, \dots, G_n 使得 $A \subset \bigcup_{i=1}^n G_i$.

证明 令 $E_n = \bigcup_{i=1}^n G_i, F_n = E_n^c \cap A$. 只需证存在 $n_0 \in \mathbb{N}$, 使得 $F_{n_0} = \emptyset$.

若对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $F_n \neq \emptyset$. 注意到 $\{E_n\}$ 是单调递增的开集列, A 是有界闭集, 则 $\{F_n\}$ 是有界单调递减的非空闭集列. 由闭集套定理知 $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$, 则存在 $x_0 \in F_n, \forall n \in \mathbb{N}$. 又 $F_n = E_n^c \cap A$, 从而 $x_0 \in A$, 且 $x_0 \notin E_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 故 $x_0 \notin \bigcup_{i=1}^{\infty} G_i$. 这与 $x_0 \in A \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} G_i$ 矛盾. □

定义 1.10 (紧集)

若 X 的任一开覆盖均含有一个有限子覆盖, 则称 X 为紧集. ♣

定理 1.8

\mathbb{R}^n 中的紧集等价于有界闭集. ♡

证明 见豌豆讲义. □

定理 1.9

设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 为非空闭集, $x \in \mathbb{R}^n$, 则存在 $y_0 \in A$ 使得

$$d(x, A) = d(x, y_0).$$

证明 由下确界的定义, 存在点列 $\{y_n\} \subset A$ 满足

$$d(x, A) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y_n)$$

故存在 $M > 0$ 使得 $d(x, y_n) \leq M$. 再由

$$d(0, y_n) \leq d(0, x) + d(x, y_n) \leq d(0, x) + M$$

知 $\{y_n\}$ 有界, 利用致密性定理, 存在子列 $\{y_{n_k}\} \subset \{y_n\}$ 满足 $y_{n_k} \rightarrow y_0, k \rightarrow \infty$. 又 A 是闭集, 故 $y_0 \in A$, 从而

$$d(x, y_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} d(x, y_{n_k}) = d(x, A)$$

□

定理 1.10

设 A, B 为 \mathbb{R}^n 中的非空闭集, 且其中之一有界, 则存在 $x_0 \in A, y_0 \in B$ 使得 $d(A, B) = d(x_0, y_0)$. 若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $d(A, B) > 0$.

♡

注 若这个定理中的 A, B 均为无界闭集, 则上述结论不一定成立. 例如

$$A = \{n\}, \quad B = \{n + 1/2n\}$$

则 $A' = B' = \emptyset$, 从而 A, B 是闭集. 显然, $d(A, B) = 0$, 而 $A \cap B = \emptyset$, 故不存在 $x_0 \in A, y_0 \in B$ 使得 $d(x_0, y_0) = 0$.

证明 由 $d(A, B)$ 的定义, 存在 $\{x_n\} \subset A$ 与 $\{y_n\} \subset B$ 满足

$$d(A, B) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

故存在 $M \geq 0$ 使得 $d(x_n, y_n) \leq M$.

不妨设 A 有界, 则 $\{x_n\}$ 有界. 由致密性定理, 存在子列 $\{x_{n_k}\} \subset \{x_n\}$ 满足 $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$. 又 A 是闭集, 故 $x_0 \in A$. 注意到

$$d(0, y_n) \leq d(0, x_n) + d(x_n, y_n) \leq d(0, x_n) + M$$

以及 $\{x_n\}$ 的有界性, 则有 $\{y_n\}$ 有界. 再由致密性定理, 存在子列 $\{y_{n_{k'}}\} \subset \{y_n\}$ 满足 $y_{n_{k'}} \rightarrow y_0, k' \rightarrow \infty$. 同样, B 是闭集保证了 $y_0 \in B$. 于是

$$d(x_0, y_0) = \lim_{k' \rightarrow \infty} d(x_{n_{k'}}, y_{n_{k'}}) = d(A, B)$$

若 $A \cap B = \emptyset$, 则 $x_0 \neq y_0$, 从而 $d(A, B) = d(x_0, y_0) > 0$.

□

定理 1.11

设 $F_1, F_2 \subset \mathbb{R}^n$, 若 $d(F_1, F_2) > 0$, 则存在开集 G_1, G_2 满足 $G_1 \supset F_1, G_2 \supset F_2$ 且 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

♡

证明 由于 $d(F_1, F_2) > 0$, 则对 $\forall x \in F_1$, 都有 $d(x, F_2) \geq d(F_1, F_2) > 0$. 同理, 对 $\forall y \in F_2$, 都有 $d(y, F_1) \geq d(F_1, F_2) > 0$. 令

$$G_1 = \bigcup_{x \in F_1} U\left(x, \frac{d(x, F_2)}{2}\right), \quad G_2 = \bigcup_{y \in F_2} U\left(y, \frac{d(y, F_1)}{2}\right)$$

则 G_1, G_2 是开集, 且 $G_1 \supset F_1, G_2 \supset F_2$. 下面证明 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

若存在 $z \in G_1 \cap G_2$, 即 $z \in G_1$ 且 $z \in G_2$, 则存在 $x_0 \in F_1, y_0 \in F_2$ 使得

$$z \in U\left(x_0, \frac{d(x_0, F_2)}{2}\right), \quad z \in U\left(y_0, \frac{d(y_0, F_1)}{2}\right)$$

不妨设 $d(y_0, F_1) \leq d(x_0, F_2)$, 则有

$$\begin{aligned} d(x_0, F_2) &\leq d(x_0, y_0) \leq d(x_0, z) + d(z, y_0) \\ &< \frac{d(x_0, F_2)}{2} + \frac{d(y_0, F_1)}{2} \\ &\leq d(x_0, F_2) \end{aligned}$$

矛盾.

□

定理 1.12 (分离定理)

设 F_1, F_2 为 \mathbb{R}^n 中的闭集, 且 $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, 则存在开集 G_1, G_2 满足 $G_1 \supset F_1, G_2 \supset F_2$ 且 $G_1 \cap G_2 = \emptyset$.

♡

证明 由于 F_1, F_2 是闭集, 且 $F_1 \cap F_2 = \emptyset$, 则 $\forall x \in F_1$ 都有 $d(x, F_2) > 0$; $\forall y \in F_2$ 都有 $d(y, F_1) > 0$. 由定理 1.11 知结论成立.

□

定理 1.13 (连续函数延拓定理 (Tietze 扩张定理))

设 F 是 \mathbb{R}^n 中的闭集, $f(x)$ 是定义在 F 上的连续函数, 且 $|f(x)| \leq M, \forall x \in F$, 则存在 \mathbb{R}^n 上的连续函数 $g(x)$ 满足:

- (i) $g(x) = f(x), \forall x \in F$;
- (ii) $|g(x)| \leq M, \forall x \in \mathbb{R}^n$.



注 $f(x)$ 无界时, 定理中连续延拓的结论仍成立.

证明 (1) 把 F 分为三个点集

$$\begin{aligned} F_1 &= \{x \in F : M/3 \leq f(x) \leq M\} \\ F_2 &= \{x \in F : -M \leq f(x) \leq -M/3\} \\ F_3 &= \{x \in F : -M/3 < f(x) < M/3\} \end{aligned}$$

则 F_1, F_2 是互不相交的闭集, 作 \mathbb{R}^n 上的函数

$$g_1(x) = \frac{M}{3} \cdot \frac{d(x, F_2) - d(x, F_1)}{d(x, F_2) + d(x, F_1)}, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

由 **命题 1.9** 以及连续函数四则运算封闭性, 知 $g_1(x)$ 在 \mathbb{R}^n 上连续. 又容易验证

$$\begin{aligned} |g_1(x)| &\leq \frac{M}{3}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ |f(x) - g_1(x)| &\leq \frac{2M}{3}, \quad \forall x \in F \end{aligned}$$

(2) 用 (1) 的方法在 F 上考察函数 $f(x) - g_1(x)$ (相当于上述的 $f(x)$). 由于 $|f(x) - g_1(x)| \leq 2M/3$, 故得到 \mathbb{R}^n 上的函数 $g_2(x)$ 满足

$$\begin{aligned} |g_2(x)| &\leq \frac{1}{3} \cdot \frac{2M}{3}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ |f(x) - g_1(x) - g_2(x)| &\leq \frac{2}{3} \cdot \frac{2M}{3} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 M, \quad \forall x \in F \end{aligned}$$

(3) 依次做下去, 得到一系列 \mathbb{R}^n 上的函数 $\{g_k(x)\}$ 满足

$$|g_k(x)| \leq \frac{1}{3} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{k-1} M, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, \quad k = 1, 2, \dots \quad (1.4)$$

$$\left| f(x) - \sum_{i=1}^k g_i(x) \right| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^k M, \quad \forall x \in F, \quad k = 1, 2, \dots \quad (1.5)$$

式(1.4)表明函数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 一致收敛, 记其和函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 连续 (连续函数项级数一致收敛的和函数是连续函数). 令式(1.5)中的 $k \rightarrow \infty$ 得

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = g(x), \quad \forall x \in F$$

(4) 对 $\forall x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |g_k(x)| \leq \frac{M}{3} \left(1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \dots \right) = M$$

定理得证. □

1.3 一维开集的构造与 Cantor 集

1.3.1 一维开集的构造

定义 1.11 (构成区间)

设 $G \subset \mathbb{R}$ 为开集, 若区间 (α, β) 满足:

- (i) $(\alpha, \beta) \subset G$;
- (ii) $\alpha \notin G, \beta \notin G$.

则称 (α, β) 为 G 的一个构成区间.

命题 1.12

设 G_1, G_2 为 \mathbb{R} 中的开集, 若 $G_1 \subset G_2$, 则 G_1 的每个构成区间都含于 G_2 的某个构成区间.

证明 设 (α_1, β_1) 为 G_1 的构成区间, 取 $x \in (\alpha_1, \beta_1)$, 则 $x \in G_2$. 记 G_2 中包含 x 的构成区间为 (α_2, β_2) . 往证 $(\alpha_1, \beta_1) \subset (\alpha_2, \beta_2)$, 即 $\alpha_2 \leq \alpha_1, \beta_1 \leq \beta_2$.

若 $\alpha_2 > \alpha_1$, 又 $x > \alpha_2$, 故

$$\alpha_2 \in (\alpha_1, x) \subset (\alpha_1, \beta_1) \subset G_1 \subset G_2$$

这与 $\alpha_2 \notin G_2$ 矛盾. 故 $\alpha_2 \leq \alpha_1$. 类似可证 $\beta_1 \leq \beta_2$. □

定理 1.14 (开集构造定理)

\mathbb{R} 上每个非空开集都可表示为至多可列个互不相交的构成区间的并集.

笔记 由于闭集是开集的余集, 由开集构造定理知, \mathbb{R} 上的闭集或者是全直线, 或者是从直线上挖去有限个或可列个互不相交的开区间所得到的集合. 而后者恰好就是直线上挖去那些开区间所剩下的孤立点和闭区间. 注意, 这些孤立点和闭区间不一定是可列个.

证明 分三个步骤. 设 G 为 \mathbb{R} 中的非空开集.

(1) 对 $\forall x_0 \in G$, 存在 G 的一个构成区间 (α, β) , 使得 $x_0 \in (\alpha, \beta)$.

由于 G 是开集, 故存在 $\delta > 0$ 使得 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset G$. 令

$$\alpha = \inf\{x \in \mathbb{R} : (x, x_0) \subset G\}$$

$$\beta = \sup\{x \in \mathbb{R} : (x_0, x) \subset G\}$$

(α 可以是 $-\infty$, β 可以是 $+\infty$). 显然, $x_0 \in (\alpha, \beta)$. 下面证 (α, β) 为 G 的构成区间.

设 $x' \in (\alpha, \beta)$, 不妨设 $\alpha < x' < x_0$. 由 α 的定义, 存在 z 满足 $\alpha < z < x'$ 且 $(z, x_0) \subset G$, 故 $x' \in (z, x_0) \subset G$. 因此 $(\alpha, \beta) \subset G$.

若 $\alpha \in G$, 由于 G 是开集, 则存在 $\eta > 0$ 使得 $(\alpha - \eta, \alpha + \eta) \subset G$, 从而 $(\alpha - \eta, x_0) \subset G$. 这与 α 的定义矛盾, 故 $\alpha \notin G$. 类似地, $\beta \notin G$.

(2) 设 (α_1, β_1) 和 (α_2, β_2) 是 G 的两个构成区间, 则或者 $(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_2)$ 或者 $(\alpha_1, \beta_1) \cap (\alpha_2, \beta_2) = \emptyset$.

假设存在 $x \in (\alpha_1, \beta_1) \cap (\alpha_2, \beta_2)$, 则

$$\alpha_1 < x < \beta_1, \quad \alpha_2 < x < \beta_2$$

若 $\beta_1 < \beta_2$, 则 $\beta_1 \in (x, \beta_2) \subset (\alpha_2, \beta_2) \subset G$, 这与 $\beta_1 \notin G$ 矛盾, 故 $\beta_1 \geq \beta_2$. 同理, $\beta_2 \geq \beta_1$. 因此, $\beta_1 = \beta_2$. 类似地, $\alpha_1 = \alpha_2$. 即 $(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_2, \beta_2)$.

(3) $G = \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$.

由于 \mathbb{R} 上互不相交的开区间至多有可列个, 故 G 的构成区间至多有可列个, 记为 (α_k, β_k) , $k = 1, 2, \dots$, 下面证 $G = \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$.

注意到构成区间的定义, 任取 $x \in \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$, 则存在某个构成区间使得 $x \in (\alpha_{k_0}, \beta_{k_0}) \subset G$. 另一方面, 对 $\forall x \in G$, 由 (1) 知存在一个构成区间 $(\alpha_{k_0}, \beta_{k_0})$ 使得

$$x \in (\alpha_{k_0}, \beta_{k_0}) \subset \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$$

故 $G \subset \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$. 因此, $G = \bigcup_k (\alpha_k, \beta_k)$. □

1.3.2 Cantor 集

定义 1.12 (稠密集与疏朗集)

设 X 为非空集合, $A \subset X$, 若 $\overline{A} = X$, 则称 A 为 X 中的**稠密集**. 若 X 存在可数稠密集, 则称 X 是可分的. 若 $(\overline{A})^\circ = \emptyset$, 则称 A 为**疏朗集** (闭包中不包含任何邻域). ♣

康托尔 (三分) 集在举反例时经常用到, 下面给出康托尔集的构造. 记 $C_0 = [0, 1]$. 第 1 步: 将 C_0 三等分, 去掉中间的开区间 $(1/3, 2/3)$, 剩下的部分记为 C_1 , 即

$$C_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right]$$

第 2 步: 将 C_1 中每个闭区间都三等分, 再去掉各自中间的开区间 $(1/9, 2/9)$ 和 $(7/9, 8/9)$, 剩下的部分记为 C_2 , 即

$$C_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{3}{9}\right] \cup \left[\frac{6}{9}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

依次做下去 $\dots\dots$, 得到一集列 $\{C_n\}$, 其中 C_n 是 2^n 个互不相交的闭区间的并, 每个闭区间的长度为 $1/3^n$.

令 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$, 称为康托尔集. 康托尔集具有以下性质:

(1) 康托尔集是闭的疏朗集 (康托尔集无内点).

证明 由闭集的性质易知康托尔集 C 是闭集. 为证 C 为疏朗集, 只需证明 $C^\circ = \emptyset$, 即任意 C 中的点都不是内点. 假设存在 $x \in C^\circ$, 则 $\exists \varepsilon_0 > 0$, 使得 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \subset C$. 取足够大的 n_0 使得 $1/3^{n_0} < \varepsilon_0$, 则 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0)$ 中必含有不属于 C_{n_0} 的点, 这与 $(x - \varepsilon_0, x + \varepsilon_0) \subset C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ 矛盾. □

(2) 构造康托尔集从 $[0, 1]$ 中去掉的开区间长度之和为 1.

证明 第 n 步, 去掉了 2^{n-1} 个长度为 $1/3^n$ 的区间. 因此, 去掉的开区间长度之和为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = 1$$

□

(3) 康托尔集是完全集 (康托尔集每个点都是聚点).

证明 设 $x \in C$, 则 $x \in C_n, n = 1, 2, \dots$, 故对每个 $n \in \mathbb{N}$, x 属于长度为 $1/3^n$ 的闭区间中的某一个, 记为 F_n . 于是, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在足够大的 n_0 使得 $1/3^{n_0} < \varepsilon$, 故 $F_{n_0} \subset U(x, \varepsilon)$. 又 F_{n_0} 的两个端点都属于 C , 故至少有一个端点不是 x , 记为 x' , 从而 $x' \in U(x, \varepsilon) \cap (C - \{x\}) \neq \emptyset$, 即 $x \in C'$. □

(4) $\overline{C} = [0, 1]$.

证明 考虑 $[0, 1]$ 中的点用三进制小数表示. 去掉的开区间 $(1/3, 2/3)$ 中的每个点 x 可表示为

$$x = 0.1x_2x_3\dots, \text{ 其中 } x_2, x_3, \dots \in \{0, 1, 2\}.$$

区间端点 $1/3$ 和 $2/3$ (属于 C) 作特殊处理, 两种表示

$$\frac{1}{3} = 0.100\dots = 0.022\dots, \quad \frac{2}{3} = 0.122\dots = 0.200\dots$$

都采用后一种表示 (不出现 “1”). 去掉的开区间 $(1/9, 2/9)$ 和 $(7/9, 8/9)$ 中的点 x 可表示为

$$x = 0.01x_3x_4\dots \text{ 或 } x = 0.21x_3x_4\dots$$

其中, $x_3, x_4, \dots \in \{0, 1, 2\}$. 区间端点 $1/9, 2/9, 7/9, 8/9$ (属于 C) 采用如下表示

$$\frac{1}{9} = 0.0022\cdots, \frac{2}{9} = 0.0200\cdots, \\ \frac{7}{9} = 0.2022\cdots, \frac{8}{9} = 0.2200\cdots.$$

依此类推, 去掉的开区间中的点必出现“1”, 而 C 则与所有不出现“1”的小数一一对应, 即

$$C \sim \{0.x_1x_2x_3\cdots : x_k \in \{0, 2\}\}.$$

而

$$\{0.x_1x_2x_3\cdots : x_k \in \{0, 2\}\} \sim \{0.x_1x_2x_3\cdots : x_k \in \{0, 1\}\}.$$


上式右端即为 $[0, 1]$ 的二进制小数表示, 故与 $[0, 1]$ 对等. 因此, $\overline{C} = \overline{[0, 1]}$. □

定义 1.13 (Cantor 函数)

定义如下函数

$$C(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{2k-1}{2^n}, & x \in I_{n,k} \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

其中, $I_{n,k} (n = 1, 2, \dots; k = 1, \dots, 2^{n-1})$ 为康托尔集在构造过程中第 n 步挖去的三分开区间, 该函数称为康托尔函数.

 **笔记** Cantor 函数 $C(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的单调递增的连续函数.