

0.1 其他

定理 0.1

设 $\mathbb{F}$ 是一个域, $m_i, a_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, n$, 且 $\gcd(m_i, m_j) \mid (a_i - a_j), i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 则存在 $f \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, i = 1, 2, \dots, n,$$

即存在 $k_i \in \mathbb{F}[x]$ 使得

$$f(x) = k_i(x)m_i(x) + a_i(x), i = 1, 2, \dots, n.$$



证明 Show/Hide Proof

□

例题 0.1 设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_n(\mathbb{K}), g(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $g(A_1), g(A_2), \dots, g(A_m)$ 都是非异阵. 试用两种方法证明: 存在 $h(x) \in \mathbb{K}[x]$, 使得 $g(A_i)^{-1} = h(A_i)$ 对所有的 $1 \leq i \leq m$ 都成立.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 由命题??可知, 对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$, 存在 $h_i \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$g^{-1}(A_i) = h_i(A_i). \quad (1)$$

记 A_i 的极小多项式为 $n_i(x), i = 1, 2, \dots, m$. 考虑 $\gcd(n_i, n_j) (i, j \in \{1, 2, \dots, m\})$, 设 $x_0 \in \mathbb{C}$ 是 $\gcd(n_i, n_j)$ 的根, 则 $(x - x_0) \mid n_i, n_j$, 即 x_0 是 A_i 和 A_j 的公共特征值. 由命题??和命题??可知, $h_i(x_0)$ 是 $h_i(A_i)$ 的特征值, $\frac{1}{g(x_0)}$ 是 $g^{-1}(A_i)$ 的特征值. 再由(1)式可知

$$g^{-1}(A_i) = h_i(A_i) \implies \frac{1}{g(x_0)} = h_i(x_0), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

于是

$$h_i(x_0) - h_j(x_0) = \frac{1}{g(x_0)} - \frac{1}{g(x_0)} = 0.$$

因此 $(x - x_0) \mid (h_i - h_j)$. 故在 $\mathbb{C}$ 上就有 $\gcd(n_i, n_j) \mid (h_i - h_j)$. 又因为整除不随数域扩张而改变, 所以在 $\mathbb{K}$ 上也有 $\gcd(n_i, n_j) \mid (h_i(x) - h_j(x))$. 于是由中国剩余定理的推广可知, 方程

$$h(x) \equiv h_i(x) \pmod{n_i(x)}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

在 $\mathbb{K}$ 上有解. 故存在 $h \in \mathbb{K}[x]$, 使得

$$h(A_i) = h_i(A_i) = g^{-1}(A_i), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

证法二: 记 A_i 的极小多项式为 $n_i(x), i = 1, 2, \dots, m$, 由命题??可知

$$(n_i, g) = 1, i = 1, 2, \dots, m.$$

从而 $(n_1 n_2 \cdots n_m, g) = 1$. 因此存在 $h, k \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$h(x)g(x) + n_1(x)n_2(x) \cdots n_m(x)k(x) = 1.$$

从而

$$h(A_i) = g^{-1}(A_i), i = 1, 2, \dots, m.$$

□

命题 0.1

设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $A \sim \tilde{A}$, 其中 $\tilde{A}$ 是主对角元都为 0 的上三角阵, 则 A 是幂零矩阵.



证明 Show/Hide Proof

由条件可知存在可逆阵 P , 使得 $A = P^{-1}\tilde{A}P$. 从而根据矩阵乘法易得

$$A^n = P^{-1}\tilde{A}^n P = O.$$

故 A 是幂零矩阵. □

例题 0.2 设 $n \in \mathbb{N}$ 且 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 满足

$$AB + A = BA + B.$$

证明:

$$(A - B)^n = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$AB - BA = B - A.$$

由命题??知 A, B 可同时相似上三角化. 不妨设 A, B 都是上三角矩阵, 由上三角阵的性质可知 $AB - BA$ 也是上三角阵且主对角元都为 0. 再由上式可知 $A - B$ 是对角线全为 0 的上三角阵, 故由命题 0.1 知 $A - B$ 是幂零矩阵. 现在我们知道

$$(A - B)^n = 0.$$

□

例题 0.3 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是对角矩阵. 考虑

$$S(A) \triangleq \{P^{-1}AP : P \in \mathbb{R}^{n \times n} \text{ 是可逆矩阵}\}.$$

证明: $S(A)$ 在 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中是闭集. 反过来, 如果 $S(A)$ 是闭集, 证明 A 在 $\mathbb{C}$ 上一定可对角化.

证明 Show/Hide Proof

设 A 的极小多项式为 m , 特征多项式为 p , 则由知 m 无重根. 设 $A_k \in S(A), k = 1, 2, \dots$ 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \tilde{A}.$$

由定理??知

$$m(\tilde{A}) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(A_k) = 0,$$

$$|\lambda I - \tilde{A}| = \left| \lambda I - \lim_{k \rightarrow \infty} A_k \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda I - A_k| = \lim_{k \rightarrow \infty} |\lambda I - A| = |\lambda I - A| = p(\lambda).$$

因此 $\tilde{A}$ 的特征多项式也是 p , $\tilde{A}$ 极小多项式整除 m , 从而 $\tilde{A}$ 极小多项式也无重根. 因此 $\tilde{A}$ 和 A 有相同的特征值且可对角化, 故 $\tilde{A} \in S(A)$.

反之, 如果 $S(A)$ 是闭的, 由实数域上的广义 Jordan 标准型知, A 在实数域 $\mathbb{R}$ 上相似于下列分块对角矩阵:

$$\tilde{J} = \text{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_k}(\lambda_k), \tilde{J}_{s_1}(a_1, b_1), \dots, \tilde{J}_{s_l}(a_l, b_l)\},$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_k, a_1, b_1, \dots, a_l, b_l$ 都是实数, $b_1, \dots, b_l$ 都非零, 且 λ_j 都是 A 的实特征值, $a_j \pm ib_j$ 都是 A 的复特征值, $J_{r_i}(\lambda_i)$ 表示以 λ_i 为特征值的通常意义下的 Jordan 块, 并且

$$c_j = -2a_j, d_j = a_j^2 + b_j^2, \quad R_j = \begin{pmatrix} 0 & -d_j \\ 1 & -c_j \end{pmatrix}, C_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\tilde{J}_{s_j}(a_j, b_j) = \begin{pmatrix} R_j & C_2 & & \\ & R_j & C_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & R_j & C_2 \\ & & & & R_j \end{pmatrix}.$$

对于 $J_{r_j}(\lambda_j)$, 在实数域上, 我们有

$$J_{r_j}(\lambda_j) \sim \begin{pmatrix} \lambda_j & \frac{1}{n} & & \\ & \lambda_j & \ddots & \\ & & \ddots & \frac{1}{n} \\ & & & \lambda_j \end{pmatrix} \triangleq J_{r_j}^{(n)}(\lambda_j), \forall n \in \mathbb{N}.$$

对于 $\tilde{J}_{s_j}(a_j, b_j)$, 在实数域上, 我们有

$$J_{s_j}(a_j, b_j) \sim \begin{pmatrix} 0 & -d_j & & & & \\ 1 & -c_j & \frac{1}{n} & & & \\ & & 0 & -d_j & & \\ & & 1 & -c_j & \frac{1}{n} & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 & -d_j \\ & & & & & 1 & -c_j & \frac{1}{n} \\ & & & & & & 0 & -d_j \\ & & & & & & 1 & -c_j \end{pmatrix} \triangleq J_{s_j}^{(n)}(a_j, b_j), \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是在实数域上, 就有

$$A \sim \tilde{J} \sim \text{diag}\{J_{r_1}^{(n)}(\lambda_1), \dots, J_{r_k}^{(n)}(\lambda_k), \tilde{J}_{s_1}^{(n)}(a_1, b_1), \dots, \tilde{J}_{s_l}^{(n)}(a_l, b_l)\} \triangleq \tilde{J}^{(n)}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

故 $\tilde{J}^{(n)} \in S(A)$. 因为 $S(A)$ 是闭集, 所以 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}^{(n)} \in S(A)$. 不难发现

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} J_{r_j}^{(n)}(a_j, b_j) &= \begin{pmatrix} \lambda_j & & & \\ & \lambda_j & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_j \end{pmatrix}, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} J_{s_j}^{(n)}(a_j, b_j) &= \begin{pmatrix} 0 & -d_j & & & \\ 1 & -c_j & & & \\ & & 0 & -d_j & \\ & & 1 & -c_j & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 & -d_j \\ & & & & & 1 & -c_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_j & & & \\ & R_j & & \\ & & \ddots & \\ & & & R_j \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

注意到 R_j 的极小多项式等于

$$x^2 + c_j x + d_j = (x - a_j)^2 + b_j^2 = (x - a_j - ib_j)(x - a_j + ib_j)$$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上无重根, 故 R_j 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化, 从而 $\lim_{n \rightarrow +\infty} J_{s_j}^{(n)}(a_j, b_j)$ 在复数域 $\mathbb{C}$ 上也可对角化. 因此

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}^{(n)} = \text{diag}\left\{\lim_{n \rightarrow +\infty} J_{r_1}^{(n)}(\lambda_1), \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} J_{r_k}^{(n)}(\lambda_k), \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}_{s_1}^{(n)}(a_1, b_1), \dots, \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}_{s_l}^{(n)}(a_l, b_l)\right\}$$

在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化. 又 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}^{(n)} \in S(A)$, 故 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 上相似于 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{J}^{(n)}$. 因此 A 在复数域 $\mathbb{C}$ 上可对角化. □

例题 0.4 设 $n \geq 2, A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实对称矩阵, $v \in \mathbb{R}^{n \times n} \setminus \{0\}$. 证明:

$$\text{tr}(A^T A) \geq \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\|Av\|^2}{\|v\|^2} - \frac{1}{n-1} [\text{tr}(A)]^2.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

不妨设 A 为实对角矩阵, 即

$$A = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}, \lambda_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n.$$

现在再设 $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, 我们有原不等式等价于

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \geq \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 v_i^2}{\sum_{i=1}^n v_i^2} - \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2.$$

不妨设 λ_1 是 $\lambda_i, i=1, 2, \dots, n$ 的最大值, 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 v_i^2}{\sum_{i=1}^n v_i^2} + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 \geq \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \lambda_1^2 + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2.$$

于是打开上述右边括号知原不等式等价于

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \lambda_1^2 + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 - \frac{2n-1}{2n-2} \cdot \lambda_1^2 + \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \right) \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \frac{1}{2n-2} \lambda_1^2 + \frac{n}{n-1} \sum_{i=2}^n \lambda_i^2 + \frac{2}{n-1} \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \geq 0 \\ \Leftrightarrow & \lambda_1^2 + 2n \sum_{i=2}^n \lambda_i^2 + 4 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \geq 0. \end{aligned} \quad (2)$$

上述关于 λ_i 的二次型矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2n & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2n \end{pmatrix}.$$

直接计算行列式得

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & \cdots & -2 \\ -2 & \lambda-2n & \cdots & -2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -2 & -2 & \cdots & \lambda-2n \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{(-1)r_1+r_i \\ i=2,3,\dots,n}]{\quad} \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & \cdots & -2 \\ -\lambda-1 & \lambda-2n+2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\lambda-1 & 0 & \cdots & \lambda-2n+2 \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{\text{“爪”型行列式}} (\lambda-1)(\lambda-2n+2)^{n-1} - 2(n-1)(\lambda+1)(\lambda-2n+2)^{n-2} \\ & = (\lambda-2n+2)^{n-2} [(\lambda-1)(\lambda-2n+2) - 2(n-1)(\lambda+1)] \\ & = (\lambda-2n+2)^{n-2} \lambda(\lambda-4n+3). \end{aligned}$$

现在矩阵特征值是

$$0, 4n-3, \underbrace{2n-2, 2n-2, \dots, 2n-2}_{n-2 \text{ 个}}. \quad (n \geq 2)$$

故矩阵的特征值全都大于等于 0. 于是矩阵半正定, 从而这个矩阵对应的二次型大于等于 0. 这就得到了不等式 (2). $\square$

例题 0.5 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且满足对任何 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $|A^k + I_n| = 1$. 证明 A 是幂零矩阵.

 笔记 Show/Hide Note

证明的想法类似于定理??.

注 实际上, 由知(6)式只需要对 $k = 1, 2, \dots, 2^n - 1$ 成立, 就可以得到结论成立. 见例题 0.6.

证明 Show/Hide Proof

事实上设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的全部特征值. 由题目条件得

$$\prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j^k) = 1, \forall k \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

实际上有

$$1 = \prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j) = 1 + \sum_{j=1}^n \lambda_j + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j + \dots + \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n. \quad (4)$$

展开(3)得

$$1 = \prod_{j=1}^n (1 + \lambda_j^k) = 1 + \sum_{j=1}^n \lambda_j^k + \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i^k \lambda_j^k + \dots + \lambda_1^k \lambda_2^k \dots \lambda_n^k. \quad (5)$$

将(4)中右边除 1 以外的每项看成 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$, 由(5)(3)得

$$y_1^k + y_2^k + \dots + y_{2^n-1}^k = 0, \forall k \in \mathbb{N}. \quad (6)$$

由 Netwon 公式得 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$ 所有初等对称多项式为 0. 从而由 Vieta 定理知 $y_1, y_2, \dots, y_{2^n-1}$ 是多项式 $y^{2^n-1} = 0$ 的全部根. 这就给出了

$$y_i = 0, i = 1, 2, \dots, 2^n - 1 \Rightarrow \lambda_i = 0, i = 1, 2, \dots, n,$$

因此由命题??知 A 是幂零矩阵. □

例题 0.6 设 A 是 3 阶复矩阵, 对 $k = 1, 2, \dots, 7$, 我们有

$$|I + A^k| = 1,$$

证明 A 是幂零矩阵, 并问 k 是否可只取 $1, 2, \dots, 6$.

 笔记 Show/Hide Note

反例甚至可以完整的刻画出来, 因为原题没要求, 所以留给读者思考.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 设 $\lambda_i, i = 1, 2, 3$ 是 A 的特征值, 那么

$$(1 + \lambda_1^k)(1 + \lambda_2^k)(1 + \lambda_3^k) = 1, k = 1, 2, \dots, 7.$$

于是我们有

$$(1 + \lambda_1^k)(1 + \lambda_2^k)(1 + \lambda_3^k) = 1 + \sum_{i=1}^3 \lambda_i^k + \lambda_1^k \lambda_2^k + \lambda_1^k \lambda_3^k + \lambda_2^k \lambda_3^k + \lambda_1^k \lambda_2^k \lambda_3^k,$$

从而

$$\sum_{i=1}^3 \lambda_i^k + \lambda_1^k \lambda_2^k + \lambda_1^k \lambda_3^k + \lambda_2^k \lambda_3^k + \lambda_1^k \lambda_2^k \lambda_3^k = 0, k = 1, 2, \dots, 7.$$

上面一共有 7 项, 这 7 个数字的小于等于 7 次的幂和为 0, 由 Netwon 公式他们是 $\lambda^7 = 0$ 的七个根 (类似例题 0.5), 因此我们推出了

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0,$$

这就说明了 A 幂零.

如果 k 只能取 $1, 2, 3, \dots, 6$, 反例可取

$$A = \begin{pmatrix} e^{\frac{2\pi i}{7}} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\frac{4\pi i}{7}} & 0 \\ 0 & 0 & e^{\frac{8\pi i}{7}} \end{pmatrix}.$$

□

例题 0.7 设 f, g 是互素多项式且 A 是一个 n 阶矩阵, 证明 $f(A)g(A) = 0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的秩之和为 n .

 **笔记** Show/Hide Note

这题也可以用 Jordan 标准型解决, 可以得到 $f(A), g(A)$ 的 0 特征值的个数即代数重数之和为 n , 从而 $n - r(f(A)) + n - r(g(A)) = n$, 故结论得证.

证明 Show/Hide Proof

由 f, g 是互素多项式知, 存在多项式 a, b 使得 $af + bg = 1$. 于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} f(A) & 0 \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & a(A)f(A) + b(A)g(A) \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} f(A) & E \\ 0 & g(A) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} f(A) & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & E \\ -f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & E \\ f(A)g(A) & 0 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} f(A)g(A) & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即 $f(A)g(A) = 0$ 的充要条件是 $f(A)$ 的秩和 $g(A)$ 的秩之和为 n .

□

例题 0.8 设 A 是 n 阶幂零矩阵, B 是 n 阶方阵满足 $AB = BA$ 且 $r(AB) = r(B)$, 证明 $B = 0$.

证明 Show/Hide Proof

由命题??知 $AB = BA$ 表明 $\text{Im } B$ 是 A 不变子空间. 于是可以考虑 $A|_{\text{Im } B}$, 显然 $\text{Im } A|_{\text{Im } B} = \text{Im } AB$. 由维数公式有

$$\dim \text{Im } B = \dim \ker A|_{\text{Im } B} + \dim \text{Im } AB = \dim \ker A|_{\text{Im } B} + \dim \text{Im } B,$$

即 $\ker A|_{\text{Im } B} = 0$. 现在 $A|_{\text{Im } B}$ 也是 $\text{Im } B$ 上的单射. 由推论??知 $A|_{\text{Im } B}$ 是双射. 又因为双射的复合还是双射, 所以 $(A|_{\text{Im } B})^n = A^n|_{\text{Im } B} = 0$ 也是双射. 从而可知 $\text{Im } B = 0$, 这就完成了证明.

□

例题 0.9 设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $\text{rank}(AB - BA + I) = 1$, 证明

$$\text{tr}(ABAB) - \text{tr}(A^2B^2) = \frac{n(n-1)}{2}. \quad (7)$$

证明 Show/Hide Proof

由秩 1 矩阵性质, 我们知道存在 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^n$ 使得 $AB - BA + I = \alpha\beta^T$, 于是我们有

$$n = \text{tr}(AB - BA + I) = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr}(\beta^T\alpha)$$

现在

$$\begin{aligned} \text{tr}((AB - BA)^2) &= \text{tr}(ABAB - AB^2A - BA^2B + BABA) \\ &= \text{tr}(ABAB - A^2B^2 - A^2B^2 + ABAB) \\ &= 2\text{tr}(ABAB - A^2B^2) = \text{tr}((\alpha\beta^T - I)^2) \end{aligned}$$

利用定理??, 我们有 $\alpha\beta^T$ 特征值为 $\beta^T\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}$. 故 $(\alpha\beta^T - I)^2$ 特征值为 $(\beta^T\alpha - 1)^2, \underbrace{1, \dots, 1}_{n-1}$. 于是

$$\text{tr}(ABAB) - \text{tr}(A^2B^2) = \frac{(n-1)^2 + (n-1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

□

例题 0.10 设 n 为奇数, 证明行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & (n+1)^2 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & (n+1)^3 & (n+1)^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & (n+1)^n & (n+1)^n & \cdots & (n+1)^n & (n+1)^n \end{vmatrix}$$

不为 0.

 **笔记** Show/Hide Note

行列式 $\bmod p$ 技巧, 基本固定套路, 应该练成肌肉反应. 行列式是元素的多元多项式操作, 因此求余数也会保持.

注 行列式左上角元素不变的原因: (1) 对行列式整体做 $\bmod 2$ 运算, 左上角元素无论变化还是不变都不影响行列式的值, 因为此时行列式是个对角阵, 其值只与对角元有关.

(2) 我们在有限域 $\mathbb{Z}_w$ 上考虑行列式 D , 这样 $3 = 5 = \cdots = 1, 2 = 4 = \cdots = 0$, 因此无论各个元素的形式如何, 最终的结果是一样的, 都等于 1. 故 D 的值不可能是 0!

证明 Show/Hide Proof

我们将行列式 D 的元素 $\bmod 2$, 因为 $(n+1)^n$ 是偶数, 所以

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 2^2 & 3^2 & 4^2 & \cdots & n^2 & 0 \\ 3^3 & 4^3 & 5^3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ n^n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

这个行列式当然就是对角线之积 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n \cdot n^2 \cdots n^n$ 还是奇数, 故 $D = 2k + (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} n \cdot n^2 \cdots n^n (k \in \mathbb{Z})$, 奇数加偶数当然还是奇数. 因此行列式 D 也是奇数, 所以 D 不为 0. 证毕!

□

例题 0.11 设 $n \geq 3$ 阶矩阵 $A = (a_{ij}), a_{ij} = \begin{cases} 3i, & i = j \\ 3i + 1, & i < j \\ 2 - 3j, & i > j \end{cases}$ 证明 $\det A$ 是 3 的倍数当且仅当 n 是奇数.

 **笔记** Show/Hide Note

$\bmod p$ 技巧几乎快直接怼脸了. 本题同样需要积累一种特别的求行列式方法.

证明 Show/Hide Proof

我们在有限域 $\mathbb{Z}_3$ 上考虑矩阵 A , 即

$$A = (a_{ij}), a_{ij} = \begin{cases} 0, & i = j \\ 1, & i < j \\ 2, & i > j \end{cases}$$

故 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 2 & \cdots & 2 & 0 \end{pmatrix}$. (行列式 A 的计算可见命题??, 下面计算用的是大拆分法) 现在定义

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & x+1 & \cdots & x+1 \\ x+2 & x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & x+1 \\ x+2 & \cdots & x+2 & x \end{vmatrix},$$

则显然 f 是关于 x 的一次函数且

$$f(-1) = (-1)^n, f(-2) = (-2)^n \Rightarrow f(x) = ((-1)^n - (-2)^n)(x+1) + (-1)^n.$$

现在

$$|A| = f(0) = 2(-1)^n - (-2)^n = \begin{cases} 2 - 4^m, & n = 2m \\ -2 + 2^{2m-1}, & n = 2m-1 \end{cases},$$

注意到

$$4 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 4^m \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2 - 4^m \equiv 1 \pmod{3},$$

以及

$$4 \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2^{2m-2} \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 2(2^{2m-2} - 1) \equiv 0 \pmod{3} \Rightarrow -2 + 2^{2m-1} \equiv 0 \pmod{3},$$

这就完成了证明. □

例题 0.12 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{2025 \times 2025}$ 满足

$$a_{ii} = i^3 + 3i^2 + 2i, a_{ij} = \begin{cases} 3(i-j) + 1, & i < j \\ 3(i+j) + 2, & i > j \end{cases}.$$

证明: $3 \mid \det A$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

在有限域 $\mathbb{Z}_3$ 上考虑. 注意到

$$i^3 + 3i^2 + 2i = i(i+1)(i+2) = 0, \forall i \in \mathbb{N}.$$

故

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 0 \end{vmatrix},$$

记 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T, |A(t)| = |A + t\alpha\alpha^T|$, 则

$$|A(t)| = |A| + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij},$$

其中 A_{ij} 为 A 的 (i, j) 元的代数余子式. 从而

$$|A| - \sum_{i,j=1}^n A_{ij} = |A(-1)| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 = 2;$$

$$|A| - 2 \sum_{i,j=1}^n A_{ij} = |A(-2)| = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -2 \end{vmatrix} = -2^{2025} = 1^{2025} = 1.$$

于是 $|A| = 2 \times 2 - 1 = 3 = 0$. 故 $3 | \det A$.

□

例题 0.13 设 A, B 为正定矩阵, 证明关于 X 的矩阵方程 $AX + XA = B$ 有唯一解, 且解也为正定矩阵.

证明 [Show/Hide Proof](#)

考虑映射 $T: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}, X \mapsto AX + XA$. 由推论??知 A 特征值为正, $-A$ 特征值为负. 于是由命题??, 我们知道 $AX = X(-A)$ 只有 0 解, 即 $\ker T = \{0\}$. 因此 T 为单射, 从而由推论??知 T 也是满射. 故矩阵方程 $AX + XA = B$ 有唯一解 X . 此外

$$A^T X^T + X^T A^T = B^T \implies AX^T + X^T A = B,$$

故解 X 是实对称的. 设 $X\alpha = \lambda\alpha, \alpha \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \lambda \in \mathbb{R}$. 我们有

$$2\lambda\alpha^T A\alpha = \alpha^T AX\alpha + \alpha^T XA\alpha = \alpha^T B\alpha > 0 \implies \lambda = \frac{\alpha^T B\alpha}{2\alpha^T A\alpha} > 0,$$

从而由推论??知 X 是正定矩阵.

□

例题 0.14 设 $\mathbb{F}$ 是一数域且 $AB = BA$. 设方程组 $ABX = 0, AX = 0, BX = 0$ 的解空间分别是 V, V_1, V_2 . 证明 $V = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件是存在 $C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $CA + DB = I_n$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

初等变换得

$$\begin{pmatrix} A^T & B^T & I_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & I_n \end{pmatrix}.$$

于是注意到

$$\begin{aligned} \exists C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}, \text{使得 } CA + DB = I_n &\iff \exists C, D \in \mathbb{F}^{n \times n}, \text{使得 } \begin{pmatrix} C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = I_n \\ &\iff \begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix} X = I_n \text{ 在 } \mathbb{F}^{2n \times n} \text{ 有解} \iff r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}\right) = r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T & I_n \end{pmatrix}\right) \\ &\iff r\left(\begin{pmatrix} A^T & B^T \end{pmatrix}\right) = n \iff r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = n \iff AX = 0, BX = 0 \text{ 公共解只有 } 0 \text{ 解} \\ &\iff V_1 \cap V_2 = \{0\}. \end{aligned}$$

容易看到必要性得证.

对于充分性, 由上面的推导我们知道 $V_1 + V_2$ 是直和. 由 $AB = BA$ 我们知道 $V_1 \oplus V_2 \subset V \implies$ 于是

$$n - r(AB) \geq n - r(A) + n - r(B) \implies r(AB) \leq r(A) + r(B) - n.$$

由 Sylvester(西尔维斯特) 不等式我们得

$$n - r(AB) = n - r(A) + n - r(B),$$

即 $V = V_1 \oplus V_2$.

□

例题 0.15 在 n 维欧式空间 V 中, 两两夹角为钝角的非 0 向量个数至多只有 $n+1$ 个.

证明 Show/Hide Proof

先构造 $n+1$ 个两两夹角为钝角的单位向量. $n=1$ 是显然的, 假定对维数小于 n 为空间, 的确是存在的, 则对 n , 在 V 的一个 $n-1$ 维子空间中取 n 个两两夹角为钝角的向量, 记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 考虑这个子空间的正交补空间的一个单位向量 β . 待定 λ , 使得 $n+1$ 个不同向量

$$\alpha_1 - \lambda\beta, \alpha_2 - \lambda\beta, \dots, \alpha_n - \lambda\beta, \beta. \quad (8)$$

两两夹角为钝角. 从而现在我们有

$$(\alpha_i - \lambda\beta, \beta) = -\lambda < 0, \forall i = 1, 2, \dots, n \Leftrightarrow \lambda > 0;$$

$$(\alpha_i - \lambda\beta, \alpha_j - \lambda\beta) = (\alpha_i, \alpha_j) + \lambda^2 < 0, \forall 1 \leq i < j \leq n \Leftrightarrow \lambda^2 < \min_{1 \leq i < j \leq n} \{-(\alpha_i, \alpha_j)\}.$$

于是这样的 λ 肯定存在. 又若 $\alpha_i - \lambda\beta = \beta$, 则 $\beta = \frac{\alpha_i}{1+\lambda} \in \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$, 矛盾! $\alpha_i - \lambda\beta = \alpha_j - \lambda\beta \Leftrightarrow \alpha_i = \alpha_j$, 这也是矛盾! 于是我们证明了 (8) 中向量的确互不相同, 这就归纳完成了构造.

再证明两两夹角为钝角的非 0 向量个数不超过 $n+1$ 个. $n=1$ 显然, 假定对维数小于 n 为空间, 的确成立, 在 n 时, 假定有 $n+2$ 个不同的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+2}$ 两两夹角为钝角. 受存在性构造的启发, 我们把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$ 正交化, 但不必单位化. 即令

$$\beta_i = \alpha_i - (\alpha_i, \alpha_{n+2})\alpha_{n+2}, i = 1, 2, \dots, n+1.$$

注意到

$$(\beta_i, \alpha_{n+2}) = 0, i = 1, 2, \dots, n+1;$$

$$(\beta_i, \beta_j) = (\alpha_i, \alpha_j) - (\alpha_i, \alpha_{n+2})(\alpha_j, \alpha_{n+2}) < 0, 1 \leq i < j \leq n+1,$$

我们两两夹角为钝角的向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n+1}$ 张成的空间至多是 $n-1$ 维, 由归纳假设, 他应该至多只有 n 个向量两两夹角为钝角, 这是一个矛盾! 至此我们完成了证明.

□

例题 0.16 设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且存在 $n+1$ 个不同实数 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$ 使得

$$A + t_i B, i = 1, 2, \dots, n+1$$

是幂零矩阵, 证明 A, B 都是幂零矩阵.

证明 Show/Hide Proof

定义 $p(\lambda, \mu) \triangleq |\lambda I - A - \mu B|$. 由 $A + t_i B, i = 1, 2, \dots, n+1$ 都是幂零矩阵及命题??得

$$p(\lambda, t_i) = \lambda^n, i = 1, 2, \dots, n+1.$$

对固定的 $\lambda \in \mathbb{C}$, 注意到不超过 n 次的多项式 $p(\lambda, \mu) - \lambda^n$ 有 $n+1$ 个不同实根 $t_1, t_2, \dots, t_{n+1}$, 于是 $p(\lambda, \mu) - \lambda^n \equiv 0$, 即

$$|\lambda I - A - \mu B| = \lambda^n, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C}.$$

让 $\mu = 0$ 得 $|\lambda I - A| = \lambda^n, \forall \lambda \in \mathbb{C}$, 即 A 是幂零矩阵. 注意到

$$\mu^n \left| \frac{\lambda}{\mu} I - \frac{A}{\mu} - B \right| = \lambda^n, \forall \mu > 0, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

把 λ 用 $\mu\lambda$ 替换得

$$\left| \lambda I - \frac{A}{\mu} - B \right| = \lambda^n.$$

让 $\mu \rightarrow +\infty$ 得 $|\lambda I - B| = \lambda^n$, 即 B 也是幂零矩阵.

□

例题 0.17 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $u, v \in \mathbb{R}^n$ 且 A, u, v 元素都是正数并满足 $Au = v, Av = u$. 证明: $u = v$.

证明 Show/Hide Proof

记 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T, v = (v_1, v_2, \dots, v_n)^T, t^* \triangleq \min \left\{ \frac{u_i}{v_i} \mid 1 \leq i \leq n \right\}, \tau \triangleq u - t^*v = (\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_n)^T$, 则 τ 元素非负.

设 $u_{i'} = t^*v_{i'}$, 则 $\tau_{i'} = 0$. 于是

$$A\tau = Au - t^*Av = v - t^*v,$$

$$A^2\tau = Av - t^*Av = u - t^*v = \tau.$$

设 $A^2 = (a_{ij})$, 则由 $A^2\tau = \tau$ 可得

$$\sum_{j=1}^n a_{i'j}\tau_j = \tau_{i'} = 0.$$

再结合 A^2 是正数, τ 元素都非负可知

$$\tau_1 = \tau_2 = \dots = \tau_n = 0 \implies u = t^*v.$$

从而由条件可得

$$v = Au = t^*Av = t^*u = (t^*)^2v \implies (t^*)^2 = 1 \implies u = v.$$

□

例题 0.18 设 $n, m \in \mathbb{N}$, 设 $n \geq 1$ 次不可约多项式 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 的 n 个根是实数且成等差数列, 证明: $n \leq 2$.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 等差数列 $\{x_n\} \subseteq \mathbb{R}$ 且 d 为公差. 反证, 设 $n \geq 3$, 则只需证此时 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 即上述部分一次因式乘积为有理多项式. 下证 $(x - x_1)(x - x_n) \in \mathbb{Q}[x]$, 即证 $x_1 + x_n, x_1x_n \in \mathbb{Q}$. 由 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 知 $f(x)$ 的常数项为有理数, 即

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{(x_1 + x_n)n}{2} \in \mathbb{Q} \implies x_1 + x_n \in \mathbb{Q}.$$

注意到

$$x_1x_n = \frac{(x_1 + x_n)^2 - (x_n - x_1)^2}{4} = \frac{(x_1 + x_n)^2 - (n-1)^2d^2}{4},$$

故只须证的 $d^2 \in \mathbb{Q}$. 由 $f \in \mathbb{Q}[x]$ 和 Vieta 定理知

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^2 - 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \in \mathbb{Q}.$$

于是

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n x_k^2 &= \frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^n x_k^2 + \sum_{k=1}^n x_{n-k+1}^2 \right] = \sum_{k=1}^n \frac{[(x_k + x_{n-k+1})^2 + (x_k - x_{n-k+1})^2]}{4} \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{[(x_1 + x_n)^2 + (n-2k+1)^2d^2]}{4} \triangleq q \in \mathbb{Q}. \end{aligned}$$

从而

$$d^2 = \frac{4q - \sum_{k=1}^n (x_1 + x_n)^2}{\sum_{k=1}^n (n-2k+1)^2} \in \mathbb{Q}.$$

故 $x_1x_n \in \mathbb{Q}$, 进而 $(x - x_1)(x - x_n) \in \mathbb{Q}[x]$, 此时 $(x - x_1)(x - x_n) \mid f(x)$, 故此时 f 在 $\mathbb{Q}$ 上可约, 矛盾!

□

例题 0.19 设 $n \geq 2$ 为一个正整数, $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为两个 n 阶实矩阵, 已知 $A^2 = -I_n$ (I_n 为 n 阶单位矩阵), 且

$AB = BA$, 证明: B 的行列式 $\det(B) \geq 0$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证法一: 由 $A^2 = -I_n$ 和 $x^2 + 1$ 不可约知 A 的极小多项式为 $x^2 + 1$, 从而 A 的特征值只有 $\pm i$, 于是 $|A| = 1$, 且 n 为偶数. 进而 A 的特征多项式为 $(x^2 + 1)^{\frac{n}{2}}$. 由实数域上的广义 Jordan 标准型知, 存在可逆阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} R & I_2 & & & \\ & R & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & R & I_2 \\ & & & & R \end{pmatrix}, \text{ 其中 } R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于命题和结论在实数域上的相似下保持不变, 故可不妨设 $A = J, B = (B_{ij})$ 为相应分块矩阵, $B_{ij} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$. 由 $AB = BA$ 可得

$$\begin{pmatrix} RB_{11} + B_{21} & * & \cdots & * & * \\ RB_{21} + B_{31} & RB_{22} + B_{32} & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ RB_{\frac{n}{2}-1,1} + B_{\frac{n}{2},1} & RB_{\frac{n}{2}-1,2} + B_{\frac{n}{2},2} & \cdots & RB_{\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1} + B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1} & * \\ RB_{\frac{n}{2},1} & RB_{\frac{n}{2},2} & \cdots & RB_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1} & RB_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11}R & * & \cdots & * & * \\ B_{21}R & B_{21} + B_{22}R & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ B_{\frac{n}{2}-1,1}R & B_{\frac{n}{2}-1,1} + B_{\frac{n}{2}-1,2}R & \cdots & B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-2} + B_{\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1}R & * \\ B_{\frac{n}{2},1}R & B_{\frac{n}{2},1} + B_{\frac{n}{2},2}R & \cdots & B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-2} + B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1}R & B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1} + B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}}R \end{pmatrix} \quad (9)$$

比较第一列和最后一行元素得

$$RB_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},1}R,$$

$$RB_{i1} + B_{i+1,1} = B_{i1}R, \quad i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2} - 1.$$

$$RB_{\frac{n}{2},i+1} = B_{\frac{n}{2},i} + B_{\frac{n}{2},i+1}R, \quad i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2} - 1.$$

于是

$$B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2}-1,1}R - RB_{\frac{n}{2}-1,1} = RB_{\frac{n}{2},2} - B_{\frac{n}{2},2}R.$$

又因为 $R^2 = -I_2$ 且 R 可逆, 所以对上式两边同乘 R 可得

$$\begin{aligned} RB_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},1}R &\iff RB_{\frac{n}{2}-1,1}R + B_{\frac{n}{2}-1,1} = -B_{\frac{n}{2}-1,1} - RB_{\frac{n}{2}-1,1}R \\ &\implies RB_{\frac{n}{2},1} = RB_{\frac{n}{2}-1,1}R + B_{\frac{n}{2}-1,1} = O \implies B_{\frac{n}{2},1} = O. \end{aligned}$$

因此 $B_{\frac{n}{2}-1,1}R = RB_{\frac{n}{2}-1,1}, RB_{\frac{n}{2},2} = B_{\frac{n}{2},2}R$, 同理可得 $B_{\frac{n}{2}-1,1} = B_{\frac{n}{2},2} = O$. 依此类推可得

$$B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2}-1,1} = \cdots = B_{21} = O, \quad B_{\frac{n}{2},1} = B_{\frac{n}{2},2} = \cdots = B_{\frac{n}{2},\frac{n}{2}-1} = O, \quad RB_{11} = B_{11}R.$$

再比较(9)式第 2 列和倒数第 2 行主对角线以下元素, 同理可得

$$B_{\frac{n}{2}-1,i} = O, \quad i = 2, 3, \dots, \frac{n}{2} - 2,$$

$$B_{i,2} = O, \quad i = 3, 4, \dots, \frac{n}{2} - 1,$$

$$RB_{22} = B_{22}R.$$

依此类推最终可得 $B_{ij} = O, i > j$, 即 B 为分块上三角阵, 并且

$$RB_{ii} = B_{ii}R, \quad i = 1, 2, \dots, \frac{n}{2}. \quad (10)$$

对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, \frac{n}{2}\}$, 设 $B_{ii} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, 则由(10)式得

$$RB_{ii} = B_{ii}R \iff \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b & a \\ -d & c \end{pmatrix} \implies a = d, c = -b.$$

从而

$$B_{ii} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \implies |B_{ii}| = a^2 + b^2 \geq 0.$$

因此 $|B| = \prod_{i=1}^{\frac{n}{2}} |B_{ii}| \geq 0$.

证法二: 由 $A^2 = -I_n$ 和 $x^2 + 1$ 不可约知 A 的极小多项式为 $x^2 + 1$, 从而 A 的特征值只有 $\pm i$, 于是 $|A| = 1$, 且 n 为偶数. 进而 A 的特征多项式为 $(x^2 + 1)^r$, 其中 $r = \frac{n}{2}$. 由实数域上的广义 Jordan 标准型知, 存在可逆阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} R & I_2 & & \\ & R & I_2 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & R & I_2 \\ & & & & R \end{pmatrix}, \text{ 其中 } R = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

又注意到实矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & E_r \\ -E_r & O \end{pmatrix}$ 的特征多项式也为 $(x^2 + 1)^r$, 进而由实数域上的广义 Jordan 标准型知, C 在实数域上也相似于 J . 因此 A 在实数域上相似于实矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & E_r \\ -E_r & O \end{pmatrix}$, 从而存在可逆矩阵 P , 满足 $A = P^{-1}CP$. 由于

命题和结论在实数域上的相似下保持不变, 故可不妨设 $A = C, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$, 其中 B_1 为 r 阶矩阵, 由 $AB = BA$ 可得

$$\begin{pmatrix} B_3 & B_4 \\ -B_1 & -B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -B_2 & B_4 \\ -B_4 & B_3 \end{pmatrix},$$

此时 $B_3 = -B_2, B_1 = B_4$, 从而

$$\begin{aligned} |B| &= \begin{vmatrix} B_1 & B_2 \\ -B_2 & B_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 - iB_2 & B_2 + iB_1 \\ -B_2 & B_1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} B_1 - iB_2 & O \\ -B_2 & B_1 + iB_2 \end{vmatrix} \\ &= |B_1 - iB_2| |B_1 + iB_2| = |B_1 - iB_2| \overline{|B_1 - iB_2|} \geq 0. \end{aligned}$$

□

例题 0.20 设 σ 为 n 维复向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的一个线性变换. $\mathbf{1}$ 表示恒等变换. 证明以下两条等价:

- (1) $\sigma = k\mathbf{1}, k \in \mathbb{C}$;
- (2) 存在 σ 的 $n+1$ 个特征向量: $v_1, \dots, v_{n+1}$, 这 $n+1$ 个向量中任何 n 个向量均线性无关.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) $\implies$ (2): 记

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T, \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)^T,$$

$e = e_1 + \dots + e_n$. 由 σ 是纯量变换知上述 $n+1$ 个向量都是其特征向量. 任取其中 n 个向量, 因为 $e_1, \dots, e_n$ 显然是

线性无关的, 所以可不妨设这 n 个向量为 $\{e_1, \dots, e_{i-1}, e, e_{i+1}, \dots, e_n\}$, 于是

$$a_1 e_1 + \dots + a_{i-1} e_{i-1} + a_i e + a_{i+1} e_{i+1} + \dots + a_n e_n = 0$$

$$\iff \begin{pmatrix} a_1 + a_i \\ \vdots \\ a_{i-1} + a_i \\ a_i \\ a_{i+1} + a_i \\ \vdots \\ a_n + a_i \end{pmatrix} = 0 \iff a_1 = \dots = a_{i-1} = a_i = a_{i+1} = \dots = a_n = 0.$$

故 $\{e_1, \dots, e_{i-1}, e, e_{i+1}, \dots, e_n\}$ 线性无关.

(2) $\implies$ (1): 假设这 $n+1$ 个向量分别属于 $k(k \leq n+1)$ 个不同特征值的特征子空间 $V_1, \dots, V_k$ 中. 不妨设

$$1 = t_0 < t_1 < \dots < t_k = k, \quad t_i \in \mathbb{N};$$

$$v_{t_{i-1}}, \dots, v_{t_i} \in V_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

显然 V_i 中至多含有 n 个 $\{v_1, \dots, v_{n+1}\}$ 中向量. 任取 $\{v_1, \dots, v_{n+1}\} \setminus \{v_{t_{i-1}}, \dots, v_{t_i}\}$ 中 $n - (t_i - t_{i-1} + 1)$ 个向量, 则由假设可知 $v_{t_{i-1}}, \dots, v_{t_i}$ 和这 $n - (t_i - t_{i-1} + 1)$ 个向量组成的向量组线性无关, 进而 $v_{t_{i-1}}, \dots, v_{t_i}$ 也线性无关. 又因为属于不同特征值的特征向量必线性无关, 所以由 $\{v_{t_{i-1}}, \dots, v_{t_i}\}, i = 1, 2, \dots, k$ 组成的向量组 $\{v_1, \dots, v_{n+1}\}$ 也线性无关, 这与 $\mathbb{C}^n$ 中至多只有 n 个线性无关向量矛盾! 因此这个 $n+1$ 个向量都属于同一个特征子空间, 由于其中任意 n 个向量线性无关, 故这个特征子空间就是全空间, 即 σ 是纯量变换. □

例题 0.21 设 A, B 为 n 阶实方阵, 证明: $r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A)$.

证明 Show/Hide Proof

由矩阵秩的基本公式和命题??可知 $r(A) = r(A^T A) \leq r(A^T A BA) = r((A^T B) A) \leq r(A)$. 从而 $r(A^T A) = r(A^T A BA)$, 于是 $A^T A X = BA$ 存在非零解 X_0 . 故

$$\begin{pmatrix} E & -X_0 \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & BA - A^T A X_0 \\ O & A^T A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & O \\ O & A^T A \end{pmatrix}.$$

因此

$$r \begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^T A \end{pmatrix} = 2r(A).$$

□

例题 0.22 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, $A, B, M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 满足 $AM = MB$ 且 A, B 有相同的特征多项式, 证明: 对任何 $X \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 都有

$$\det(A - MX) = \det(B - XM).$$

证明 Show/Hide Proof

设有理数列 $t_n \rightarrow 0$, 使得 $A_n = t_n E + A, B_n = t_n E + B$ 可逆. 因为 A, B 有相同特征多项式, 所以 A_n, B_n 也有相同的特征多项式, 且 $A_n M = M B_n$. 从而 $|A_n| = |B_n| \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 于是由降价公式可得

$$\begin{aligned} |A_n - MX| &= |A_n| |E - X A_n^{-1} M| = |A_n| |E - X M B_n^{-1}| \\ &= |E - M X B_n^{-1}| |B_n| = |B_n - XM|. \end{aligned}$$

因为上式两边都是关于 t_n 的连续函数, 所以令 $n \rightarrow \infty$ 得 $|A - MX| = |B - XM|$.

□

例题 0.23 设 $\mathbb{F}$ 为数域且 $A, B, C \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 证明同构

$$\text{Ker}(A + B - ACB) \cong \text{Ker}(A + B - BCA). \quad (11)$$

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到初等变换

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} &\rightarrow \begin{pmatrix} E & A \\ 0 & A + B - BCA \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -E & A \\ -E + BC & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E - AC & A \\ -E & B \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} AC - E & A \\ E & B \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & B \\ AC - E & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & B \\ 0 & B + A - ACB \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & B + A - ACB \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\text{rank}(A + B - ACB) = \text{rank}(A + B - BCA)$, 这恰好由维数公式是(11).

证法二: 不妨设 $A = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 否则用可逆矩阵 $P, Q \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $A = P^{-1} \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$, 然后用 PAQ 代替 A, PBQ 代替 $B, Q^{-1}CP^{-1}$ 代替 C . 我们对应分块

$$B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} C_1 & C_2 \\ C_3 & C_4 \end{pmatrix}.$$

注意到恒等式

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} E_r & C_2 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} (A + B - ACB) &= E_n + \begin{pmatrix} E_r - C_1 & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 - E_{n-r} \end{pmatrix}, \\ (A + B - BCA) \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ C_3 & E_{n-r} \end{pmatrix} &= E_n + \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 - E_{n-r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r - C_1 & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

利用可逆矩阵乘矩阵不改变矩阵的秩和推论??知 $\text{rank}(A + B - ACB) = \text{rank}(A + B - BCA)$, 这恰好由维数公式是(11).

□

例题 0.24 设 a_1, a_2, a_3 为满足 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$ 的一组实数, b_1, b_2 为满足 $b_1^2 + b_2^2 = 1$ 的一组实数. 又设 M_1 为 5×3 矩阵, 其每一行都为 a_1, a_2, a_3 的一个排列; M_2 是 5×2 矩阵, 其每一行都为 b_1, b_2 的一个排列. 令 $M = (M_1, M_2)$, 它为 5×5 矩阵. 证明:

- (1) $(\text{tr } M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \text{rank } M$;
- (2) M 必有绝对值小于或等于 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 的实特征值 λ .

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1, b_1^2 + b_2^2 = 1$ 知 $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 \leq 1$. 从而

$$(\text{tr } M)^2 \leq 5^2 = 25.$$

且有均值不等式可得

$$a_1 + a_2 + a_3 \leq 3\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}{3}} = \sqrt{3}, \quad b_1 + b_2 \leq 2\sqrt{\frac{b_1^2 + b_2^2}{2}} = \sqrt{2}. \quad (12)$$

当 $\text{r}(M) \geq 3$ 时, 就有

$$(\text{tr } M)^2 \leq 25 < (5 + 2\sqrt{6}) \cdot 3 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \text{r}(M)$$

恒成立. 故只需考虑 $r(M) = 1, 2$ 的情形. 当 $r(M) = 1$ 时, 不妨设

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \end{pmatrix},$$

则由(12)式可得

$$(\operatorname{tr} M)^2 = (a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2)^2 \leq (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2 = 5 + 4\sqrt{6}.$$

当 $r(M) = 2$ 时, 不妨设

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 & b_2 & b_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 & b_2 & b_1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & b_1 & b_2 \end{pmatrix},$$

其中 $a_3 = \max_{i=1,2,3} a_i, b_2 = \max_{i=1,2} b_i$. 否则, $\operatorname{tr} M$ 都没有上述矩阵的迹大. 则

$$\begin{aligned} a_1 + 2a_3 &\leq 3\sqrt{\frac{a_1^2 + 2a_3^2}{3}} = \sqrt{3}\sqrt{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + a_3^2 - a_2^2} \\ &= \sqrt{3}\sqrt{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2) + a_3^2 - a_2^2} = \sqrt{3}\sqrt{1 + a_3^2 - a_2^2} \\ &\leq \sqrt{6}. \end{aligned}$$

于是

$$(\operatorname{tr} M)^2 = (a_1 + 2a_3 + 2b_2)^2 \leq (\sqrt{6} + 2)^2 = (5 + 2\sqrt{6}) r(M).$$

综上, 我们有

$$(\operatorname{tr} M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) r(M).$$

(2) 注意到

$$M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = (a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

故 $(a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2)$ 是 M 的一个特征值, 并且由(12)式可得

$$a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2 \leq \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

□

例题 0.25 设 $A \in M_2(\mathbb{R})$ 是行列式为 d 的可逆矩阵, 且满足 $\det(A + dA^*) = 0$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵. 求 $\det(A - dA^*)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}$, 则 $A^* = \begin{pmatrix} w & -y \\ -z & x \end{pmatrix}$. 由 A 可逆知 $d = |A^*| = |A| = xw - yz \neq 0$. 从而

$$|A + dA^*| = \begin{vmatrix} x + dw & (1-d)y \\ (1-d)z & w + dx \end{vmatrix} = (x + dw)(dx + w) - (1-d)^2 yz = 0$$

$$\iff (1 + d^2)xw + d(x^2 + w^2) = (1-d)^2 yz$$

$$\iff d(x^2 + w^2) = (1-d)^2 yz - (1 + d^2)xw.$$

于是

$$\begin{aligned}
 |A - dA^*| &= \begin{vmatrix} x - dw & (1+d)y \\ (1+d)z & w - dx \end{vmatrix} = (x - dw)(w - dx) - (1+d)^2 yz \\
 &= (1+d^2)xw - d(x^2 + w^2) - (d^2 yz + 2dyz + yz) \\
 &= (1+d^2)(xw - yz) - (1-d)^2 yz + (1+d^2)xw - 2dyz \\
 &= (1+d^2)(xw - yz) + (1+d^2)(xw - yz) \\
 &= 2(1+d^2)d.
 \end{aligned}$$

□

命题 0.2

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda_1, \lambda_2, \mu_1, \mu_2 \in \mathbb{C}$. 若 A, B 的极小多项式分别是

$$f_A(x) = (x - \lambda_1)(x - \lambda_2), f_B(x) = (x - \mu_1)(x - \mu_2),$$

证明 A, B 至少有一个维数 1 或者 2 的公共不变子空间.

笔记 Show/Hide Note

构造思路: 我希望找到 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 使得线性方程组

$$\begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} x = 0 \quad (13)$$

有非零解 α . 从而 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$ 就是 A 和 B 的一个维数为 1 或 2 的公共不变子空间. 而(13)式有非零解等价于 $r \begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} < n$. 故现在只需找到 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 使得 $r \begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} < n$.

我们的想法是: 用第一行分块阵将第二行分块消掉, 因此需要第二行分块阵是第一行分块阵的倍数. 然后是第一行分块的秩小于 n , 即不满秩. 注意到取 $a = 1, b$ 为 $B - A$ 的特征值, 则 $|B - A - bE| = 0 \iff r(B - A - bE) < n$. 由条件可设 B 的极小多项式 $f_B(x) = x^2 + kx + r$. 由 Cayley-Hamilton 定理知 $B^2 + kB + rE = O \iff kB = -(1+r)E$. 于是待定 $c, d \in \mathbb{C}$, 使得

$$BA - cA - dE - (B - A - bE)A = k(B - A - bE) \iff (b - c)A + (1 - d)E = -(1 + r + kb)E - kA.$$

只要取 $c = kb + b + r + 1, d = k + 1$ 就有上式成立. 从而(13)式成立.

证明 Show/Hide Proof

由条件可设 $f_B(x) = x^2 + kx + r$, 则 $B^2 + kB + rE = O \iff kB = -(1+r)E$. 取 b 为 $B - A$ 的一个特征值, $c = kb + b + r + 1, d = k + 1$. 于是

$$BA - cA - dE - (B - A - bE)A = k(B - A - bE),$$

$|B - A - bE| = 0 \iff r(B - A - bE) < n$. 考虑如下分块矩阵的初等变换

$$\begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B - A - bE \\ k(B - A - bE) \end{pmatrix} \xrightarrow{-kr_1 + r_2} \begin{pmatrix} B - A - bE \\ O \end{pmatrix}.$$

于是

$$r \begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} B - A - bE \\ O \end{pmatrix} = r(B - A - bE) < n.$$

因此线性方程组

$$\begin{pmatrix} B - aA - bE \\ BA - cA - dE \end{pmatrix} x = 0$$

有非零解 α . 考虑 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$. 显然 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$ 是 A -不变子空间. 并且由上式可得

$$B\alpha = aA\alpha + b\alpha \in \text{span}(\alpha, A\alpha); \quad B(A\alpha) = cA\alpha + d\alpha \in \text{span}(\alpha, A\alpha).$$

所以 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$ 也是 B -不变子空间. 又 $\text{span}(\alpha, A\alpha)$ 是由两个非零向量生成的, 故维数显然等于 1 或 2. $\square$

例题 0.26 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的线性变换, 且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{B}^2 = \mathcal{E}$, 其中 $\mathcal{E}$ 为恒等变换. 证明:

- (1) 若 n 为奇数, 则 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 有公共的特征向量;
- (2) 若 n 为偶数, 则存在一子空间 W 同时是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的不变子空间, 且 $\dim W = 1$ 或 2.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由条件可知, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 适合 $x^2 - 1$. 显然 $x^2 - 1$ 无重根. 从而 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的极小多项式也无重根, 进而 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都可对角化, 并且特征值只可能有 ± 1 . 于是

$$V = V_1^{\mathcal{A}} \oplus V_{-1}^{\mathcal{A}} = V_1^{\mathcal{B}} \oplus V_{-1}^{\mathcal{B}},$$

其中 $V_1^{\mathcal{A}}, V_{-1}^{\mathcal{B}}$ 分别为 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的特征值 1 的特征子空间, $V_{-1}^{\mathcal{A}}, V_{-1}^{\mathcal{B}}$ 分别为 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的特征值 -1 的特征子空间. 从而

$$n = \dim \mathbb{C}^n = \dim V_1^{\mathcal{A}} + \dim V_{-1}^{\mathcal{A}} = \dim V_1^{\mathcal{B}} + \dim V_{-1}^{\mathcal{B}}.$$

又因为 n 为奇数, 所以存在 $i, j \in \{1, -1\}$, 使得

$$\dim V_i^{\mathcal{A}}, \dim V_j^{\mathcal{B}} > \frac{n}{2}.$$

因此由维数公式可得

$$\dim V_i^{\mathcal{A}} \cap V_j^{\mathcal{B}} = \dim V_i^{\mathcal{A}} + \dim V_j^{\mathcal{B}} - \dim (V_i^{\mathcal{A}} + V_j^{\mathcal{B}}) > \frac{n}{2} + \frac{n}{2} - n = 0.$$

故 $V_i^{\mathcal{A}} \cap V_j^{\mathcal{B}} \neq \{0\}$. 任取 $\alpha \in V_i^{\mathcal{A}} \cap V_j^{\mathcal{B}}$, 则 α 就是 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的公共特征向量.

- (2) 当 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 中至少有一个为纯量变换时, 不妨设 $\mathcal{A}$ 为纯量变换, 则全空间 $\mathbb{C}^n$ 都是 $\mathcal{A}$ -不变子空间. 任取 $\mathcal{B}$ 的一个特征向量 α , 则 $\text{span}\{\alpha\}$ 就是 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的公共不变子空间, 且维数为 1.

当 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都不是纯量变换时, 则 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 都不适合 $x \pm 1$, 故此时 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 的极小多项式都是 $x^2 - 1$. 于是由命题 0.2 立得. $\square$

例题 0.27 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A^3 = O, B = (I + A)^3$ (I 为单位方阵), 求一多项式 $f(x)$, 使得 $f(B) = A$.

证明 Show/Hide Proof

由条件知

$$B = (I + A)^3 = I + 3A + 3A^2 \implies 3A^2 = B - 3A - I.$$

于是

$$\begin{aligned} B^2 &= (I + 3A + 3A^2)^2 = I + 6A + 15A^2 \\ &= I + 6A + 5(B - 3A - I) \\ &= 5B - 9A - 4I. \end{aligned}$$

从而

$$A = \frac{-B^2 + 5B - 4I}{9}.$$

故取 $f(x) = \frac{-x^2 + 5x - 4}{9}$ 即可. $\square$

例题 0.28 设 A, B 为 n 阶矩阵, A_i 为 A 的第 i 列, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 B 的特征值. 证明:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \det(A_1, \dots, BA_i, \dots, A_n) &= \det A \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j, \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \det(A_1, \dots, BA_i, \dots, BA_j, \dots, A_n) &= \det A \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \det(A_1, \dots, BA_i, \dots, BA_j, \dots, BA_k, \dots, A_n) &= \det A \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \lambda_i \lambda_j \lambda_k, \\ &\vdots \\ \det(BA_1, BA_2, \dots, BA_n) &= \det A \cdot \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n. \end{aligned}$$

证明 Show/Hide Proof

设 B 的特征多项式为

$$f_B(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n,$$

其中

$$a_1 = -\sum_{i=1}^n \lambda_i, a_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j, \dots, a_n = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n.$$

注意到

$$A(xI + B) = xA + BA = (xA_1 + BA_1, \dots, xA_n + BA_n),$$

并且

$$|A(xI + B)| = (-1)^n |A| \cdot |xI - B| = |A| \cdot (-1)^n f_B(-x) = |A| [x^n - a_1 x^{n-1} + \cdots + (-1)^n a_n]. \quad (14)$$

又由行列式的基本性质, 按列拆分可得

$$|xA_1 + BA_1, \dots, xA_n + BA_n| = |A| x^n + x^{n-1} \sum_{i=1}^n \det(A_1, \dots, BA_i, \dots, A_n) + \cdots + \det(BA_1, BA_2, \dots, BA_n). \quad (15)$$

比较(14)和(15)式各项系数即得结论. □

例题 0.29 n 维欧氏空间 V 中 s 个向量 $\alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$ 满足

$$\sum_{i=1}^s c_i \alpha_i = 0, c_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s \Rightarrow c_1 = c_2 = \cdots = c_s = 0.$$

证明: 存在 $\alpha \in V$, 使得 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, 2, \dots, s$.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $f(t_1, t_2, \dots, t_s) = \|t_1 \alpha_1 + t_2 \alpha_2 + \cdots + t_s \alpha_s\|_{\mathbb{R}^n}^2$ 是紧集

$$K = \left\{ (t_1, t_2, \dots, t_s) \in \mathbb{R}^s : \sum_{i=1}^s t_i = 1, t_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, s \right\}$$

上的连续函数, 故存在 $(t_1^0, t_2^0, \dots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 使得 f 在 $(t_1^0, t_2^0, \dots, t_s^0) \in \mathbb{R}^s$ 上达到 f 在 K 上的最小值. 因为条件, 我们知道 f 在 K 上的最小值为正数. 下证 $\alpha = \sum_{i=1}^s t_i^0 \alpha_i \neq 0$ 为所求.

事实上, 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$\|(1-t)\alpha + t\alpha_i\|^2 \geq \|\alpha\|^2, \forall t \in [0, 1].$$

展开计算就有

$$(t^2 - 2t)(\alpha, \alpha) + 2t(1-t)(\alpha, \alpha_i) + t^2(\alpha_i, \alpha_i) \geq 0, \forall t \in [0, 1],$$

即

$$(t-2)(\alpha, \alpha) + 2(1-t)(\alpha, \alpha_i) + t(\alpha_i, \alpha_i) \geq 0, \forall t \in [0, 1].$$

让 $t \rightarrow 0^+$ 就有

$$(\alpha, \alpha_i) \geq (\alpha, \alpha) > 0,$$

这就证明了 $(\alpha, \alpha_i) > 0, i = 1, 2, \dots, s$.

□

例题 0.30 设 $\Gamma = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$ 为 r 个互不相同的可逆 n 阶复方阵构成的集合. 若该集合关于矩阵乘法封闭 (即 $\forall M, N \in \Gamma$, 有 $MN \in \Gamma$). 证明

$$\sum_{i=1}^r W_i = O \text{ 当且仅当 } \sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 下证充分性. 首先, 对于可逆矩阵 $W_i \in \Gamma$, 有 $W_i W_1, \dots, W_i W_r$ 各不相同. 故有

$$W_i \Gamma \equiv \{W_i W_1, W_i W_2, \dots, W_i W_r\} = \{W_1, W_2, \dots, W_r\}$$

即 $W_i \Gamma = \Gamma, \forall W_i \in \Gamma$. 记 $S = \sum_{i=1}^r W_i$, 则 $W_i S = S, \forall W_i \in \Gamma$. 进而

$$S^2 = \sum_{i=1}^r W_i \sum_{j=1}^r W_j = \sum_{i=1}^r W_i S = \sum_{i=1}^r S = rS,$$

即 $S^2 - rS = 0$. 若 λ 为 S 的特征值, 则 $\lambda^2 - r\lambda = 0$, 即 $\lambda = 0$ 或 r . 结合条件 $\sum_{i=1}^r \text{tr}(W_i) = 0$ 知, S 的特征值只能为 0. 因此有 $S - rI$ 可逆. 再次注意到 $S(S - rI) = S^2 - rS = 0$, 此时右乘 $(S - rI)^{-1}$, 即得 $S = 0$. 证毕.

□

例题 0.31 设 $f_i(x) = a_{i0} + a_{i1}x + a_{i2}x^2 + \dots + a_{in}x^n (i = 0, 1, \dots, n)$. 并且 $a_{ij} \in \mathbb{Z}, i, j = 0, 1, \dots, n$. 记 $A = (a_{ij})$ 是 $n+1$ 阶矩阵, 证明:

- (1) 对于任意的整数 k , 有 $(f_0(k), f_1(k), \dots, f_n(k)) \mid \det(A)$.
- (2) 存在 $n+1$ 阶整数矩阵 B 使得 $AB = I_{n+1}$ 的充要条件是存在 $n+1$ 个互不相同的整数 $b_0, b_1, \dots, b_n$ 使得 $n+1$ 阶方阵 $(f_i(b_j))$ 使得 $|\det(f_i(b_j))| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i)$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 对 $\forall k \in \mathbb{Z}$, 设 $d = (f_0(k), \dots, f_n(k)), f_i(k) = c_i d$, 则 $c_i \in \mathbb{Z}$. 由行列式的基本性质可知

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0n} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n0} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f_0(k) & a_{01} & \cdots & a_{0n} \\ f_1(k) & a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(k) & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{按第一列展开}} \sum_{i=0}^n f_i(k) A_{i0} = d \sum_{i=0}^n c_i A_{i0},$$

其中 A_{ij} 表示 A 的 (i, j) 元的代数余子式. 因为 $A \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$, 所以 $A_{ij} \in \mathbb{Z}$. 又 $c_i \in \mathbb{Z}$, 故 $d \mid \det(A)$.

- (2) 充分性: 注意到

$$\det(f_i(b_j)) = \begin{vmatrix} f_0(b_0) & f_0(b_1) & \cdots & f_0(b_n) \\ f_1(b_0) & f_1(b_1) & \cdots & f_1(b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(b_0) & f_n(b_1) & \cdots & f_n(b_n) \end{vmatrix} = |A| \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \end{vmatrix}$$

$$= |A| \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i),$$

故由 $|\det(f_i(b_j))| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i)$ 知 $|A| = \pm 1$, 因此 A 可逆, 从而存在 A^{-1} 使得 $AA^{-1} = I_{n+1}$. 又因为

$A \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$, 所以 $A^* \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$, 故 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \pm A^* \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$. 因此取 $B = A^{-1}$, 则 $AB = I_{n+1}$ 且 $B \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$.

必要性: 由 $AB = I_{n+1}$ 且 $A, B \in \mathbb{Z}^{(n+1) \times (n+1)}$ 知

$$|A||B| = 1 \implies |A| = \pm 1.$$

任取 $n+1$ 个互不相同的整数 $b_0, b_1, \dots, b_n$, 则

$$\begin{aligned} \det(f_i(b_j)) &= \begin{vmatrix} f_0(b_0) & f_0(b_1) & \cdots & f_0(b_n) \\ f_1(b_0) & f_1(b_1) & \cdots & f_1(b_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_n(b_0) & f_n(b_1) & \cdots & f_n(b_n) \end{vmatrix} = |A| \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ b_0 & b_1 & \cdots & b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_0^n & b_1^n & \cdots & b_n^n \end{vmatrix} \\ &= \pm \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i). \end{aligned}$$

$$\text{故 } |\det(f_i(b_j))| = \prod_{0 \leq i < j \leq n} (b_j - b_i).$$

□

例题 0.32 设整数 $n \geq 2$, $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是对称的且满足

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = 0, j = 1, 2, \dots, n.$$

对 $k = 1, 2, \dots, n$, 设 $A_k \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ 是 A 删去第 k 行第 k 列之后得到的子矩阵. 证明

$$\det A_k, k = 1, 2, \dots, n$$

是相等的.

注 回顾命题??.

证明 [Show/Hide Proof](#)

记 $\alpha = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则由条件知

$$A^T \alpha = O, \quad (16)$$

故 $|A| = |A^T| = 0$. 因此 $r(A) < n$. 若 $r(A) \leq n-2$, 则 $A^* = O$, 此时 $\det A_k = 0, k = 1, 2, \dots, n$. 下设 $r(A) = n-1$. 此时 $\dim \ker A = 1$, 再结合(16)式知 $Ax = O$ 的解都形如 $k\alpha, k \in \mathbb{C}$. 又注意到

$$A \begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix} = O, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

其中 A_{ij} 为 A 的 (i, j) 元的代数余子式. 故

$$\begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix} = k\alpha \implies A_{i1} = A_{i2} = \cdots = A_{in}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

又因为 A 是对称阵, 所以 A^* 也是对称阵, 再结合上式可知 A^* 的元素全相同. 因此 $\det A_k = A_{kk}, k = 1, 2, \dots, n$ 都相等.

□

例题 0.33 设 Q 为 n 阶对称正定矩阵, P 为 m 阶实对称正定矩阵, B 为 $n \times m$ 实矩阵, 则

$$0 \leq |B^T(Q + BPB^T)^{-1}B| < \frac{1}{|P|}.$$

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $P = P^{\frac{1}{2}} P^{\frac{1}{2}}, Q = Q^{\frac{1}{2}} Q^{\frac{1}{2}}$. 记 $A = (Q^{\frac{1}{2}})^{-1} B P^{\frac{1}{2}}$, 则

$$\begin{aligned} 0 &\leq |B^T(Q + B P B^T)^{-1} B| < \frac{1}{|P|} \\ \iff 0 &\leq \left| P^{\frac{1}{2}} \left| B^T (Q^{\frac{1}{2}} Q^{\frac{1}{2}} + B P^{\frac{1}{2}} P^{\frac{1}{2}} B^T)^{-1} B \right| P^{\frac{1}{2}} \right| < 1 \\ \iff 0 &\leq \left| P^{\frac{1}{2}} B^T (Q^{\frac{1}{2}})^{-1} \left(I_n + (Q^{\frac{1}{2}})^{-1} B P^{\frac{1}{2}} P^{\frac{1}{2}} B^T (Q^{\frac{1}{2}})^{-1} \right)^{-1} (Q^{\frac{1}{2}})^{-1} B P^{\frac{1}{2}} \right| < 1 \\ \iff 0 &\leq \left| A^T (I_n + A A^T)^{-1} A \right| < 1. \end{aligned}$$

由降阶公式可得

$$\left| \lambda I_m - A^T (I_n + A A^T)^{-1} A \right| = \lambda^m \left| I_n - A (\lambda I_m)^{-1} A^T (I_n + A A^T)^{-1} \right| = \lambda^{m-n} \left| \lambda I_n - A A^T (I_n + A A^T)^{-1} \right|.$$

故 $A^T (I_n + A A^T)^{-1} A$ 的非零特征值与 $A A^T (I_n + A A^T)^{-1}$ 相同. 由命题??知 $A A^T$ 是半正定阵, 任取 $A A^T$ 的特征值 λ , 则 $\lambda \geq 0$. 再由矩阵的逆可以用其多项式表示以及命题??和命题??知 $A A^T (I_n + A A^T)^{-1}$ 的特征值为

$$\frac{\lambda}{1 + \lambda} \in [0, 1).$$

因此 $A^T (I_n + A A^T)^{-1} A$ 的特征值也都属于 $[0, 1)$. 又因为矩阵行列式为其全体特征值乘积, 所以

$$0 \leq \left| A^T (I_n + A A^T)^{-1} A \right| < 1.$$

结论得证. □

例题 0.34 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 求证:

- (1) 若 A 正定, 则对任意的 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, 有 $0 \leq |B'(A + B B')^{-1} B| < 1$, 并且左边等号成立的充要条件是 $r(B) < m$;
- (2) 若 A 半正定, 则存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, 使得 $A + B B'$ 正定且 $|B'(A + B B')^{-1} B| = 1$ 的充要条件是 $r(A) = n - m$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) **证法一:** 因为 B 是实矩阵, 所以 $B B'$ 半正定. 又 A 正定, 故 $A + B B'$ 也正定. 由命题??知存在可逆阵 C , 使得 $A + B B' = C' C$, 进而

$$B' (A + B B')^{-1} B = (C B)' C B,$$

其中 $C B$ 是实矩阵. 故由命题??知 $B' (A + B B')^{-1} B$ 是半正定阵. 设 λ 为 $B' (A + B B')^{-1} B$ 的特征值, 则 $\lambda \geq 0$. 考虑如下正定矩阵的初等合同变换

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & I_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} B \cdot r_2 + r_1 \\ B' \cdot j_2 + j_1 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} A + B B' & B \\ B' & I_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} -B'(A + B B')^{-1} \cdot r_1 + r_2 \\ -B'(A + B B')^{-1} \cdot j_1 + j_2 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} A + B B' & O \\ O & I_m - B' (A + B B')^{-1} B \end{pmatrix}$$

由命题知 $I_m - B' (A + B B')^{-1} B$ 也是正定阵. 于是 $I_m - B' (A + B B')^{-1} B$ 的特征值为

$$1 - \lambda > 0 \implies \lambda < 1.$$

因此 $\lambda \in [0, 1)$. 又因为矩阵的行列式等于全体特征值的乘积, 所以

$$0 \leq |B' (A + B B')^{-1} B| < 1.$$

由命题??知上式等号成立的充要条件是 $r(B) < m$.

证法二 (类似例题 0.33): 由 A 正定知 $A = A^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}}$, 记 $C = (A^{\frac{1}{2}})^{-1} B$, 则

$$\begin{aligned} 0 \leq |B' (A + B B')^{-1} B| < 1 &\iff 0 \leq \left| B' (A^{\frac{1}{2}} A^{\frac{1}{2}} + B B')^{-1} B \right| < 1 \\ &\iff 0 \leq \left| B' (A^{\frac{1}{2}})^{-1} \left(I_n + (A^{\frac{1}{2}})^{-1} B B' (A^{\frac{1}{2}})^{-1} \right)^{-1} (A^{\frac{1}{2}})^{-1} B \right| < 1 \\ &\iff 0 \leq |C' (I_n + C C')^{-1} C| < 1. \end{aligned} \tag{17}$$

由降阶公式可得

$$\begin{aligned} \left| \lambda I_m - C^T (I_n + CC')^{-1} C \right| &= \lambda^m \left| I_n - C (\lambda I_m)^{-1} C' (I_n + CC')^{-1} \right| \\ &= \lambda^{m-n} \left| \lambda I_n - CC' (I_n + CC')^{-1} \right|. \end{aligned}$$

故 $C^T (I_n + CC')^{-1} C$ 的非零特征值与 $CC' (I_n + CC')^{-1}$ 相同. 设 CC' 的特征值为 λ , 则由命题??知 CC' 半正定, 故 $\lambda \geq 0$. 再由矩阵的逆可以用其多项式表示以及命题??和命题??知 $CC' (I_n + CC')^{-1}$ 的特征值为

$$\frac{\lambda}{1+\lambda} \in [0, 1).$$

因此 $C^T (I_n + CC')^{-1} C$ 的特征值也都属于 $[0, 1)$. 又因为矩阵的行列式等于其全体特征值的乘积, 所以

$$0 \leq \left| C' (I_n + CC')^{-1} C \right| < 1.$$

由(17)式知

$$0 \leq \left| B' (A + BB')^{-1} B \right| < 1.$$

又由 A 正定和命题??知 $A + BB'$ 也正定, 故由命题??知上式等号成立的充要条件是 $r(B) < m$.

(2) 必要性: 由于 $A + BB'$ 正定, 故由命题??知存在可逆阵 C , 使得 $A + BB' = C'C$, 进而

$$B' (A + BB')^{-1} B = (CB')' CB,$$

其中 CB 是实矩阵. 故由命题??知 $B' (A + BB')^{-1} B$ 是半正定阵. 设 λ 为 $B' (A + BB')^{-1} B$ 的特征值, 则 $\lambda \geq 0$. 考虑如下半正定矩阵的初等合同变换

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & I_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{B \cdot r_2 + r_1 \\ B' \cdot j_2 + j_1}} \begin{pmatrix} A + BB' & B \\ B' & I_m \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-B'(A+BB')^{-1} \cdot r_1 + r_2 \\ -B'(A+BB')^{-1} \cdot j_1 + j_2}} \begin{pmatrix} A + BB' & O \\ O & I_m - B'(A + BB')^{-1} B \end{pmatrix}. \quad (18)$$

由命题知 $I_m - B' (A + BB')^{-1} B$ 也是半正定阵. 于是 $I_m - B' (A + BB')^{-1} B$ 的特征值为

$$1 - \lambda \geq 0 \implies \lambda \leq 1.$$

因此 $\lambda \in [0, 1]$. 又因为 $\left| B' (A + BB')^{-1} B \right| = 1$, 所以 $\lambda = 1$, 即 $B' (A + BB')^{-1} B$ 的特征值全为 1. 又由 $B' (A + BB')^{-1} B$ 是半正定阵知, $B' (A + BB')^{-1} B$ 可对角化, 故 $B' (A + BB')^{-1} B = I_m$. 再利用(18)式和 $A + BB'$ 正定知

$$r(A) + m = r(A + BB') = n \implies r(A) = n - m.$$

充分性: 由 $r(A) = n - m$ 和 A 半正定知, 存在 n 阶正交矩阵 C , 使得

$$A = C \begin{pmatrix} I_{n-m} & O \\ O & O \end{pmatrix} C'.$$

取 $B = C \begin{pmatrix} O \\ I_m \end{pmatrix} \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$, 则

$$A + BB' = C \begin{pmatrix} I_{n-m} & O \\ O & O \end{pmatrix} C' + C \begin{pmatrix} O & O \\ O & I_m \end{pmatrix} C' = CC',$$

从而由命题??知 $A + BB'$ 正定. 并且

$$\begin{aligned} \left| B' (A + BB')^{-1} B \right| &= \left| (O \quad I_m) C' (CC')^{-1} C \begin{pmatrix} O \\ I_m \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| (O \quad I_m) \begin{pmatrix} O \\ I_m \end{pmatrix} \right| = |I_m| = 1. \end{aligned}$$

□

例题 0.35 对于二阶矩阵 $A, B_1, B_2, B_3, B_4, A \neq O$, 若

$$\det(A + B_i) = \det(A) + \det(B_i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

证明: 矩阵 B_1, B_2, B_3, B_4 线性相关.

证明 Show/Hide Proof

设 V 是由全体 4 阶矩阵构成的线性空间. 反证, 假设 B_1, B_2, B_3, B_4 线性无关, 则其构成 V 的一组基. 从而存在一组不全为 0 的数 c_1, c_2, c_3, c_4 , 使得

$$A = c_1 B_1 + c_2 B_2 + c_3 B_3 + c_4 B_4.$$

记

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix}, \quad B_i = \begin{pmatrix} b_1^i & b_2^i \\ b_3^i & b_4^i \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

则

$$a_j = \sum_{i=1}^4 c_i b_j^i, \quad j = 1, 2, 3, 4.$$

根据条件, 将行列式按列拆分可得

$$|A + B_i| = \begin{vmatrix} a_1 + b_1^i & a_2 + b_2^i \\ a_3 + b_3^i & a_4 + b_4^i \end{vmatrix} = |A| + |B_i| + \begin{vmatrix} a_1 & b_2^i \\ a_3 & b_4^i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1^i & a_2 \\ b_3^i & a_4 \end{vmatrix} = |A| + |B_i|.$$

进而

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_2^i \\ a_3 & b_4^i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1^i & a_2 \\ b_3^i & a_4 \end{vmatrix} = 0, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

于是

$$0 = \sum_{i=1}^4 c_i \left(\begin{vmatrix} a_1 & b_2^i \\ a_3 & b_4^i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_1^i & a_2 \\ b_3^i & a_4 \end{vmatrix} \right) = \begin{vmatrix} a_1 & \sum_{i=1}^4 c_i b_2^i \\ a_3 & \sum_{i=1}^4 c_i b_4^i \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^4 c_i b_1^i & a_2 \\ \sum_{i=1}^4 c_i b_3^i & a_4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{vmatrix} = 2|A|.$$

故 $|A| = 0$. 又因为 $A \neq O$, 所以 $r(A) = 1$. 因此 A 的 0 特征值的几何重数为 1, 故 A 的 Jordan 标准型只有两种, 即

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注意条件和结论在同一个相似变换下保持不变, 故可不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(i) 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 时, 由条件可得

$$|A + B_i| = |A| + |B_i| = |B_i| \iff \begin{vmatrix} 1 + b_1^i & b_2^i \\ b_3^i & b_4^i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1^i & b_2^i \\ b_3^i & b_4^i \end{vmatrix} \iff \begin{vmatrix} 1 & b_2^i \\ 0 & b_4^i \end{vmatrix} = 0 \iff b_4^i = 0, i = 1, 2, 3, 4.$$

从而 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 就不可能由 B_1, B_2, B_3, B_4 线性表出, 但 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in V$, 这与 B_1, B_2, B_3, B_4 是 V 的一组基矛盾! (ii) 当

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 时, 由条件可得

$$|A + B_i| = |A| + |B_i| = |B_i| \iff \begin{vmatrix} b_1^i & 1 + b_2^i \\ b_3^i & b_4^i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1^i & b_2^i \\ b_3^i & b_4^i \end{vmatrix} \iff \begin{vmatrix} b_1^i & 1 \\ b_3^i & 0 \end{vmatrix} = 0 \iff b_3^i = 0, i = 1, 2, 3, 4.$$

从而 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 就不可能由 B_1, B_2, B_3, B_4 线性表出, 但 $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in V$, 这与 B_1, B_2, B_3, B_4 是 V 的一组基矛盾! □

例题 0.36 设 α, β, γ 是欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中三个非零向量, 已知它们两两正交. 记矩阵 $A = \alpha\beta' + \beta\gamma' + \gamma\alpha'$.

(1) 证明: $\text{rank}(A) = 3$.

(2) A 是否可以相似对角化? 请证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

(1) 记 $B = (\alpha, \beta, \gamma)$, 则由条件可知 $r(B) = 3$. 由 Sylvester 不等式知

$$3 = r(B) \geq r(A) = r(BB^T) \geq r(B) + r(B^T) - 3 = 3.$$

故 $r(A) = 3$.

(2) 注意到

$$A\alpha = |\alpha|^2\gamma, \quad A\beta = |\beta|^2\alpha, \quad A\gamma = |\gamma|^2\beta.$$

将 $\{\alpha, \beta, \gamma\}$ 扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基 $\mathcal{H}$, 设 A 在基 $\mathcal{H}$ 下的表示阵为

$$\begin{pmatrix} M & N \\ O & P \end{pmatrix},$$

其中 $M = \begin{pmatrix} 0 & |\beta|^2 & 0 \\ 0 & 0 & |\gamma|^2 \\ |\alpha|^2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. 显然 M 可逆, 从而可做实数域上的分块初等变换得

$$\begin{pmatrix} M & N \\ O & P \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} M & O \\ O & P \end{pmatrix}.$$

又由 (1) 知 $r(A) = 3$, 因此

$$3 = r(A) = r \begin{pmatrix} M & O \\ O & P \end{pmatrix} = r(M) + r(P) = 3 + r(P) \implies P = O.$$

故 A 在实数域上相似于

$$\begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

注意到 M 的特征多项式为 $\lambda^3 - |\alpha|^2|\beta|^2|\gamma|^2$, 从而 M 有三个互不相同的特征值, 其中两个为复数. 故 M 在复数域上可对角化, 在实数域上不可对角化. 因此 A 在复数域上可对角化, 但在实数域上不可对角化. □

命题 0.3

设 A 为 n 阶奇异阵, 且 $r(A) = r(A^2)$, 则存在可逆阵 M , 使得

$$A \sim \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

设 A 的 Jordan 标准型为

$$J = \begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & & & \\ & \ddots & & \\ & & J_{r_k}(\lambda_k) & \\ & & & J_{r_0}(0) \end{pmatrix},$$

其中 $J_{r_i}(\lambda_i)$ 表示属于特征值 λ_i 的 r_i 阶根子空间块. 因为 A 不可逆, 所以 $r_0 > 0$. 从而

$$A^2 \sim J^2 = \begin{pmatrix} J_{r_1}^2(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{r_k}^2(\lambda_k) \\ & & & J_{r_0}^2(0) \end{pmatrix}.$$

注意到

$$r(A) = r(J) = r(J_{r_0}(0)) + \sum_{i=1}^k r(J_{r_i}(\lambda_i)),$$

$$r(A^2) = r(J^2) = r(J_{r_0}^2(0)) + \sum_{i=1}^k r(J_{r_i}^2(\lambda_i)).$$

若 $J_{r_0}(0) \neq O$, 则 $r(J_{r_0}^2(0)) < r(J_{r_0}(0))$. 从而 $r(A^2) < r(A)$ 矛盾! 故 $J_{r_0}(0) = O$. 记

$$M = \begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{r_k}(\lambda_k) \end{pmatrix},$$

于是

$$A \sim J = \begin{pmatrix} J_{r_1}(\lambda_1) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{r_k}(\lambda_k) \\ & & & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

□

例题 0.37 设 A, B 为 n 阶矩阵, 且 $r(A) = r(B)$, 证明: $A^2B = A$ 的充要条件是 $B^2A = B$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

当 A 或 B 可逆时, 结论显然成立. 下设 A, B 均不可逆.

必要性: 注意到

$$r(A^2) \leq r(A) = r(A^2B) \leq r(A^2),$$

故 $r(A) = r(A^2)$. 因此由 [命题 0.3](#) 可知, 存在可逆阵 M , 使得

$$A \sim \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

因为条件和结论在相似变换下不变, 所以不妨设

$$A = \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

由 $A^2B = A$ 可得

$$\begin{pmatrix} M^2 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} M(MB_1 - I) & M^2B_2 \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

再结合 M 可逆知 $B_2 = O, B_1 = M^{-1}$, 故 $B = \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}$. 于是

$$\begin{aligned} B^2A = B &\iff \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} O & O \\ B_4B_3M & -B_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\iff B_4 = O. \quad (19)$$

又 $r(A) = r(B)$, 故由矩阵秩的基本公式知

$$r(A) = r(B) = r \left(\begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix} \right) \geq r(M^{-1}) + r(B_4) = r(A) + r(B_4).$$

从而 $r(B_4) = 0$, 进而 $B_4 = O$. 再由 (19) 知必要性成立.

充分性: 注意到

$$r(B^2) \leq r(B) = r(B^2 A) \leq r(B^2),$$

故 $r(B) = r(B^2)$. 因此由命题 0.3 可知, 存在可逆阵 M , 使得

$$B \sim \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

因为条件和结论在相似变换下不变, 所以不妨设

$$B = \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}.$$

由 $B^2 A = B$ 可得

$$\begin{pmatrix} M^2 & O \\ O & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} M(MA_1 - I) & M^2 A_2 \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

再结合 M 可逆知 $A_2 = O, A_1 = M^{-1}$, 故 $A = \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}$. 于是

$$\begin{aligned} A^2 B = A &\iff \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} M & O \\ O & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} O & O \\ A_4 A_3 M & -A_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & O \\ O & O \end{pmatrix} \\ &\iff A_4 = O. \end{aligned} \quad (20)$$

又 $r(A) = r(B)$, 故由矩阵秩的基本公式知

$$r(A) = r(B) = r \left(\begin{pmatrix} M^{-1} & O \\ A_3 & A_4 \end{pmatrix} \right) \geq r(M^{-1}) + r(A_4) = r(A) + r(A_4).$$

从而 $r(A_4) = 0$, 进而 $A_4 = O$. 再由 (20) 知充分性成立. □

例题 0.38 证明: 一个 n 元实二次型可以分解成两个实系数 1 次齐次多项式的乘积当且仅当它的秩等于 2 且符号差为 0, 或者它的秩等于 1.

 **笔记** Show/Hide Note

根据必要性条件, 不能直接由 $X^T A X = (X^T \alpha)(\beta^T X) = X^T (\alpha \beta^T) X$ 推出 $A = \alpha \beta^T$, 因为 $\alpha \beta^T$ 不一定是对称阵. 不过我们可以根据多项式的可交换性, 将右式中矩阵转变成对称阵, 具体操作见下述必要性证明.

本题关键就是注意到必要性条件等价于

$$A = \frac{\alpha \beta^T + \beta \alpha^T}{2}.$$

然后验证即可.

证明 Show/Hide Proof

设 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

充分性: 若 $r(A) = 1$, 则存在非零实向量 α, β , 使得

$$A = \alpha \beta^T \implies X^T A X = X^T (\alpha \beta^T) X = (X^T \alpha)(\beta^T X).$$

若 $r(A) = 2$ 且 A 的符号差为 0, 注意到条件和结论在相似变换下不改变, 故不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix},$$

此时

$$X^T A X = x_1^2 - x_2^2 = (x_1 + x_2)(x_1 - x_2).$$

必要性: 设 $0 \neq \alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T, \beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 且满足 $X^T A X = (X^T \alpha)(\beta^T X)$, 则

$$X^T A X = (X^T \alpha)(\beta^T X) = X^T(\alpha \beta^T)X,$$

$$X^T A X = (X^T \beta)(\alpha^T X) = X^T(\beta \alpha^T)X,$$

故

$$X^T A X = \frac{X^T A X + X^T A X}{2} = \frac{X^T(\alpha \beta^T)X + X^T(\beta \alpha^T)X}{2} = X^T \frac{\alpha \beta^T + \beta \alpha^T}{2} X.$$

注意到 $\frac{\alpha \beta^T + \beta \alpha^T}{2}$ 是实对称阵, 故由上式可得

$$\begin{aligned} A &= \frac{\alpha \beta^T + \beta \alpha^T}{2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

于是由降阶公式可得

$$\begin{aligned} |\lambda I_n - A| &= \lambda^{n-2} \left| \lambda I_2 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & b_n \end{pmatrix} \right| = \lambda^{n-2} \left| \begin{pmatrix} \lambda - \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{2} & -\frac{\sum_{i=1}^n b_i^2}{2} \\ -\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{2} & \lambda - \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{2} \end{pmatrix} \right| \\ &= \frac{1}{4} \lambda^{n-2} \left(4\lambda^2 - 4\lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i + \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) \right). \end{aligned}$$

当 α 与 β 线性相关时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right),$$

于是

$$|\lambda I_n - A| = \lambda^{n-2} \left(\lambda^2 - \lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i \right) = \lambda^{n-1} \left(\lambda - \sum_{i=1}^n a_i b_i \right).$$

注意到 $\sum_{i=1}^n a_i b_i \neq 0$, 否则 $(\alpha, \beta) = 0$, 即 α, β 正交, 因此 α 与 β 线性无关, 矛盾! 故此时 A 只有一个非零特征值, 从而 $r(A) = 1$.

当 α 与 β 线性无关时, 同理由 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 < \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right),$$

于是

$$|\lambda I_n - A| = \frac{1}{4} \lambda^{n-2} \left(4\lambda^2 - 4\lambda \sum_{i=1}^n a_i b_i + \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \right).$$

此时 A 必有两个特征值 λ_1, λ_2 满足

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)}{4} < 0 \implies \lambda_1, \lambda_2 \neq 0 \text{ 且异号}.$$

故 A 只有两个异号的非零特征值. 又 A 是实对称阵, 故 A 必可对角化, 即

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & 0 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

此时 $r(A) = 2$ 且 A 的符号差为 0.

□

例题 0.39 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, E 为单位矩阵. 求证 $A^4 = E$ 当且仅当 $\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 $x - 1$ 和 $1 + x + x^2 + x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上互素, 故存在 $f, g \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$(x - 1)f(x) + g(x)(1 + x + x^2 + x^3) = 1.$$

于是对如下分块矩阵做初等分块变换得

$$\begin{pmatrix} E - A & O \\ O & E + A + A^2 + A^3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{j_1 \cdot f(A) + j_2 \\ g(A) \cdot r_2 + r_1}]{\substack{j_1 \cdot f(A) + j_2 \\ g(A) \cdot r_2 + r_1}} \begin{pmatrix} E - A & E \\ O & E + A + A^2 + A^3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow[\substack{j_2 \cdot (-E + A) + j_1}]{\substack{j_2 \cdot (-E + A) + j_1}} \begin{pmatrix} O & E \\ A^4 - E & E + A + A^2 + A^3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{j_1 \longleftrightarrow j_2}]{\substack{j_1 \longleftrightarrow j_2}} \begin{pmatrix} E & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

故 $\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n$.

□

例题 0.40 设 2025 阶方阵 A 的对角线元素都是 0, 其它元素均为 1 或 -1, 已知 A 的每一行所有元素相加都是 0. 请判断 A 的秩, 并说明理由.

证明 Show/Hide Proof

首先注意到

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \implies |A| = 0 \implies r(A) < 2025.$$

在 $\mathbb{Z}_2$ 上考虑, 则 A 的 $(2, 1)$ 元的余子式为

$$A_{21} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = -1 = 1.$$

故 $A_{21} \equiv 1 \pmod{2}$. 因此 $A_{21} \neq 0$, 即 A 存在一个 2024 阶满秩子阵. 故 $r(A) = 2024$. □

例题 0.41 设 A 为 $n(n \geq 3)$ 阶实可逆矩阵, 且 A^k 相似于 A 对 $k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$ 成立, 证明: 对一切正整数 k 皆有 A^k 相似于 A .

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 为 A 的 s 个互异的特征值, 则 A^k 的全体特征值为

$$\lambda_1^k, \dots, \lambda_s^k, \quad k = 1, 2, \dots, n!.$$

因为 $A^k \sim A$, 所以 λ_i^k ($k = 1, 2, \dots, n!$) 都是 A 的特征值, 进而

$$\lambda_i, \lambda_i^2, \dots, \lambda_i^{s+1}, \quad i = 1, 2, \dots, s$$

都是 A 的特征值. 但 A 只有 s 个互异的特征值, 故存在 $1 \leq q_i < p_i \leq s+1$, 使得

$$\lambda_i^{p_i} = \lambda_i^{q_i}, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

由 A 可逆知 $\lambda_i \neq 0$, 故记 $m_i = p_i - q_i \in [1, s] \cap \mathbb{N}$, 则

$$\lambda_i^{m_i} = \lambda_i^{p_i - q_i} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

再记 $m = [m_1, \dots, m_s]$ (最小公倍数), 则 $m \in [1, s!] \cap \mathbb{N}$, 并且

$$\lambda_i^m = 1, \quad i = 1, 2, \dots, s.$$

因此 A^m 的特征值全为 1. 又因为 $m \in [1, s!] \cap \mathbb{N}$, 所以 $m \in [1, n!] \cap \mathbb{N}$. 于是由条件知 $A^m \sim A$, 故 A 的特征值也全为 1. 从而可设

$$A \sim J = \begin{pmatrix} J_{r_1}(1) & & & \\ & J_{r_2}(1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{r_l}(1) \end{pmatrix},$$

$$J_{r_i}(1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & & \\ & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$A^k \sim J^k = \begin{pmatrix} J_{r_1}^k(1) & & & \\ & J_{r_2}^k(1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_{r_l}^k(1) \end{pmatrix},$$

$$J_{r_i}^k(1) = \begin{pmatrix} 1 & k & \cdots & * \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & k \\ & & & 1 \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, \dots, l.$$

故只需证 $J_{r_i}(1) \sim J_{r_i}^k(1), i = 1, 2, \dots, l$.

注意到 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的 r_i 阶行列式因子为 $(\lambda - 1)^{r_i}$, $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的前 $n-1$ 行, 后 $n-1$ 列构成的子式为 k^{r_i-1} , 故 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的 r_i-1 阶行列式因子为 1, 进而 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的行列式因子组为 $1, \dots, 1, (\lambda - 1)^{r_i}$, 因此 $\lambda I - J_{r_i}^k(1)$ 的不变因子组也为 $1, \dots, 1, (\lambda - 1)^{r_i}$. 而 $\lambda I - J_{r_i}(1)$ 的不变因子组也为 $1, \dots, 1, (\lambda - 1)^{r_i}$. 故 $J_{r_i}(1) \sim J_{r_i}^k(1)$.

□

例题 0.42 设 A, B 均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = Bx (x \in \mathbb{R}^{2020})$ 的解空间维数为 3. 问: 矩阵 A, B 是否可能相似? 证明你的结论.

证明 Show/Hide Proof

由条件及降秩公式可知

$$r(I - A^{-1}B) = r(A - B) = 2020 - 3 = 2017.$$

因此 $A^{-1}B$ 的特征值 1 的几何重数为 3. 由 A, B 为正交阵知 $A^{-1}B$ 也是正交矩阵, 进而也是复正规矩阵, 从而 $A^{-1}B$ 酉相似于对角矩阵. 故 $A^{-1}B$ 的特征值的几何重数与代数重数相等. 由定理??知 $A^{-1}B$ 的实特征值只有 ± 1 , 复特征值的模长都为 1, 又因为复特征值成对出现, 所以 $A^{-1}B$ 的特征值 -1 的代数重数必是奇数. 由于矩阵行列式等于其所有特征值的乘积, 故

$$|A||B| = |A^{-1}B| = -1 \implies |A| \neq |B|.$$

因此 A, B 不可能相似.

□

例题 0.43 称非常值一元 n 次多项式 (合并同类项后) 的 $n-1$ 次项 (可能为 0) 为第二项. 求所有 2020 次复系数首一多项式 $f(x)$, 满足对 $f(x)$ 的每个复根 x_k , 都存在非常值复系数首一多项式 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$, 使得 $f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x)$, 且 $g_k(x)$ 和 $h_k(x)$ 的第二项系数相等.

证明 Show/Hide Proof

设 $f(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n)$, 其中 $n = 2020$. 则由条件可知, 对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 都存在 $g_k, h_k \in \mathbb{C}[x]$, 使得

$$f(x) = (x - x_k)g_k(x)h_k(x).$$

对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 不妨设

$$g_k(x) = \prod_{r=1}^s (x - x_{i_r}), \quad h_k(x) = \prod_{r=1}^l (x - x_{j_r}),$$

其中 $i_1, i_2, \dots, i_s, j_1, j_2, \dots, j_l \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{k\}$ 且 $l_k + s_k = n - 1$. 由于 g_k, h_k 的第二项系数相同, 再由 Vieta 定理可得关于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性方程组如下

$$\sum_{r=1}^{s_k} x_{i_r} = \sum_{r=1}^{l_k} x_{j_r} \implies \sum_{r=1}^{s_k} x_{i_r} - \sum_{r=1}^{l_k} x_{j_r} = 0, \quad \forall k \in \{1, 2, \dots, n\}. \quad (21)$$

上述线性方程组的系数矩阵 A 的行列式为

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & 0 & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

其中 $a_{ij} \in \{-1, 1\}, i \neq j$. 把 A 视为 $\mathbb{Z}_2$ 上的矩阵, 则

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2019 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix} = 2019 = 1.$$

故 $|A| \equiv 1 \pmod{2}$, 因此 $|A|$ 为奇数, 从而 $|A| \neq 0$. 于是线性方程组(21)只有零解, 即 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$. 故 $f(x) = x^{2020}$.

□

例题 0.44 已知 A, B 分别为 $n \times r, r \times n$ 矩阵, 其中 $r < n$, 记 $AB = C, BA = D$, 若 $r(C) = r$, 证明

$$m_1(x) = xm_2(x).$$

其中 $m_1(x), m_2(x)$ 分别为 C, D 的最小多项式.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证法一: 由 $r(AB) = r$ 且 A 为 $n \times r$ 矩阵, B 为 $r \times n$ 矩阵知

$$r = r(AB) \leq r(A), r(B) \leq r \implies r(A) = r(B) = r.$$

故 A 为列满秩矩阵, B 为行满秩矩阵. 从而存在 $r \times n$ 行满秩矩阵 P 和 $n \times r$ 列满秩矩阵 Q , 使得

$$PA = BQ = I_r.$$

由 Sylvester 不等式和矩阵秩基本不等式知

$$r = r(B) + r(A) - r \leq r(BA) \leq r(A) = r \implies r(BA) = r.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 都有

$$AB(AB)^k = ABA(AB)^{k-1}B = A(BA)^k B,$$

$$(BA)^k = PA(BA)^k BQ = PAB(AB)^k Q.$$

故

$$ABm_2(AB) = Am_2(BA)B = 0,$$

$$m_1(BA) = PABm_1(AB)Q = 0.$$

因此 $xm_2(x)$ 是 AB 的零化多项式, $m_1(x)$ 是 BA 的零化多项式. 从而

$$m_1(x) \mid xm_2(x), \quad m_2(x) \mid m_1(x).$$

又 $m_1(x), m_2(x)$ 都是首一多项式, 故存在首一多项式 $p(x), q(x)$, 使得

$$xm_2(x) = p(x)m_1(x), \quad m_2(x) = q(x)m_1(x). \quad (22)$$

进而

$$xm_2(x) = p(x)m_1(x) = p(x)q(x)m_1(x) \implies (x - p(x)q(x))m_1(x) = 0.$$

又 $m_1(x) \neq 0$, 故 $x = p(x)q(x)$. 再结合 $p(x), q(x)$ 都首一知

$$\text{要么 } p(x) = 1, q(x) = x, \text{ 要么 } p(x) = x, q(x) = 1.$$

若 $p(x) = x, q(x) = 1$. 则由(22)式知 $m_1(x) = m_2(x)$. 但是, 因为 $r(AB) = r < n, r(BA) = r$, 所以 AB 不可逆, BA 可逆. 因此 0 是 AB 的特征值, 不是 BA 的特征值. 故 $m_1(0) = 0 \neq m_2(0)$, 这与 $m_1(x) = m_2(x)$ 矛盾! 因此 $p(x) = 1, q(x) = x$. 再由(22)式可知 $m_1(x) = xm_2(x)$.

证法二: 由 $r(AB) = r$ 且 A 为 $n \times r$ 矩阵, B 为 $r \times n$ 矩阵知

$$r = r(AB) \leq r(A), r(B) \leq r \implies r(A) = r(B) = r.$$

故 A 为列满秩矩阵, B 为行满秩矩阵. 从而存在 $r \times n$ 行满秩矩阵 P 和 $n \times r$ 列满秩矩阵 Q , 使得

$$PA = BQ = I_r. \quad (23)$$

不妨设

$$AB \sim \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_{r_1}(0) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{r_s}(0) \end{pmatrix}, \quad BA \sim \begin{pmatrix} J_2 & & \\ & J_{t_1}(0) & \\ & & \ddots \\ & & & J_{t_l}(0) \end{pmatrix}. \quad (24)$$

其中 J_1, J_2 分别为 AB, BA 的所有非零特征值的 Jordan 块构成的分块对角阵, r_s, t_l 分别为 AB, BA 的 0 特征值的 Jordan 块中最大块的阶数. 由降阶公式知

$$|\lambda I - AB| = \lambda^{n-r} |\lambda I - BA|.$$

从而 AB, BA 的非零特征值的代数重数相同. 于是 J_1, J_2 的阶数相同, 都记为 k . 由 (23)(24) 式可得

$$k = r((AB)^{r_s}) = r(A(BA)^{r_s-1}B) \leq r((BA)^{r_s-1}),$$

$$k = r((BA)^{t_l}) = r(PA(BA)^{t_l}BQ) \leq r(A(BA)^{t_l}B) = r((AB)^{t_l+1}).$$

因此

$$k \leq r((BA)^{r_s-1}) \implies r_s - 1 \geq t_l \implies r_s - t_l \geq 1,$$

$$k \leq r((AB)^{t_l+1}) \implies t_l + 1 \geq r_s \implies r_s - t_l \leq 1.$$

故 $r_s - t_l = 1$. 由命题??知, r_s, t_l 分别为 $m_1(x), m_2(x)$ 中 x 的幂次. 又由定理??知 AB, BA 非零 Jordan 块相同, 故再由命题??知 $m_1(x), m_2(x)$ 的因子除 x 外全相同. 因此 $m_1(x) = xm_2(x)$. □

例题 0.45 设 m 为给定的正整数, 证明: 对任意的正整数 n, l , 存在 m 阶实方阵 X , 使得

$$X^n + X^l = I_m + \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 1 \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

$$\text{记 } f(x) = x^n + x^l,$$

$$B = I_m + \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & \cdots & m \\ & 2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2 \\ & & & 2 \end{pmatrix}.$$

将 Jordan 块 $J_m(1)$ 代入 $f(x)$ 中, 经计算可得

$$f(J_m(1)) = \begin{pmatrix} 2 & n+l & \cdots & * \\ & 2 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & n+l \\ & & & 2 \end{pmatrix},$$

这是一个上三角矩阵, 且主对角元全为 2, 上次对角元全为 $n+l$. 从而 $f(J_m(1))$ 的特征值全为 2, 其几何重数为

$$m - r(f(J_m(1)) - 2I_m) = m - (m-1) = 1.$$

因此, $f(J_m(1))$ 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_m(2)$, 即 $f(J_m(1)) \sim J_m(2)$.

另一方面, 矩阵 B 也是一个上三角矩阵, 主对角元 2, 上次对角元全为 2, 从而 B 的特征值也全为 2, 其几何重数为

$$m - r(B - 2I_m) = m - (m-1) = 1.$$

因此, B 的 Jordan 标准型中只有一个 Jordan 块 $J_m(2)$, 即 $B \sim J_m(2)$. 综上, $f(J_m(1)) \sim B$. 由于矩阵的相似在基域扩张下不改变, 故 $f(J_m(1))$ 和 B 在实数域上相似, 即存在可逆实矩阵 P , 使得

$$B = P^{-1} f(J_m(1)) P = f(P^{-1} J_m(1) P).$$

令 $X = P^{-1} J_m(1) P$, 则 $X \in \mathbb{R}^{m \times m}$, 且满足

$$X^n + X^l = f(X) = B.$$

□

例题 0.46 设 V 是 n 维复线性空间, $n \geq 2$, A, B 是 V 的线性变换, 假设 A 可对角化, B 是幂零变换, 且 $AB = BA$. 证明: B 与 $A + B$ 的最小多项式的次数相等当且仅当 A 为数乘变换.

 **笔记** Show/Hide Note

实际上, 必要性也可以用代数语言证明, 即不妨设 A 是对角阵, 由 A, B 可交换知 B 此时就是对应的分块准对角阵 (对应 A 的根子空间块), 后续证明类似.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 由 A 可对角化知,

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_n,$$

其中 V_i 为 A 的特征值 λ_i 的特征子空间. 注意到 $B|_{V_i}$ 仍是幂零变换, 记

$$k_i = \min \{k \in \mathbb{N} \mid (B|_{V_i})^k = O\}, i = 1, 2, \dots, n.$$

则 B 的极小多项式为 $x^{\max\{k_1, \dots, k_n\}}$. 又

$$(A + B)|_{V_i} = \lambda_i I + B|_{V_i}, i = 1, 2, \dots, n.$$

故 $(A + B)|_{V_i}$ 的极小多项式为 $(x - \lambda_i)^{k_i}$. 从而 $A + B$ 的极小多项式为

$$[(x - \lambda_1)^{k_1}, (x - \lambda_2)^{k_2}, \dots, (x - \lambda_n)^{k_n}].$$

若 A 不是数乘变换, 则 A 至少存在两个不同的特征值, 不妨设 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则此时 $A + B$ 的极小多项式为

$$\deg [(x - \lambda_1)^{k_1}, (x - \lambda_2)^{k_2}, \dots, (x - \lambda_n)^{k_n}] \geq k_1 + k_2 > \max \{k_1, \dots, k_n\}.$$

而由 B 与 $A + B$ 的极小多项式次数相等知

$$\deg [(x - \lambda_1)^{k_1}, (x - \lambda_2)^{k_2}, \dots, (x - \lambda_n)^{k_n}] = \max \{k_1, \dots, k_n\},$$

矛盾! 故 A 的特征值全都相同, 即 A 为数乘变换.

充分性: 设 $A = aI, k = \min \{k \in \mathbb{N} \mid B^k = O\}$, 则 B 的极小多项式为 x^k . 注意到 $A + B = aI + B$ 的极小多项式为 $(x - a)^k$, 故 $\deg x^k = \deg (x - a)^k$.

□

例题 0.47 设 $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 是二阶复矩阵, V 是复数域上所有 2 级对称矩阵构成的线性空间, 定义 V 上的线性变换 φ 为 $\varphi(X) = M'XM, X \in V$. 证明: M 可对角化的充要条件是 φ 可对角化.

证明 Show/Hide Proof

取 V 的一组基

$$E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

必要性: 设 M 可对角化, 则可不妨设 $M = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$, 从而

$$\varphi(E_1, E_2, E_3) = (E_1, E_2, E_3) \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 0 \\ 0 & d^2 & 0 \\ 0 & 0 & ad \end{pmatrix}.$$

故 φ 可对角化.

充分性: 假设 M 不可对角化, 则 M 相似于其 Jordan 标准型, 从而可不妨设 $M = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$, 再设 $X = \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_3 & x_2 \end{pmatrix}$. 于是

$$\varphi(X) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_3 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 x_1 & \lambda x_1 + \lambda^2 x_3 \\ \lambda x_1 + \lambda^2 x_3 & x_1 + 2\lambda x_3 + \lambda^2 x_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $X, \varphi(X)$ 在基 (E_1, E_2, E_3) 下的坐标分别为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda^2 x_1 \\ x_1 + 2\lambda x_3 + \lambda^2 x_2 \\ \lambda x_1 + \lambda^2 x_3 \end{pmatrix}.$$

记 φ 在基 (E_1, E_2, E_3) 下的表示矩阵为 A , 则

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 x_1 \\ x_1 + 2\lambda x_3 + \lambda^2 x_2 \\ \lambda x_1 + \lambda^2 x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 1 & \lambda \\ 0 & \lambda^2 & 0 \\ 0 & 2\lambda & \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

注意到 A 的特征多项式为 $(x - \lambda^2)^3$, 又

$$r(\lambda^2 I - A) = r \begin{pmatrix} 0 & -1 & -\lambda \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2\lambda & 0 \end{pmatrix} = 1 \text{ 或 } 2.$$

故 A 的特征值 λ^2 的几何重数为 1 或 2, 一定不等于其代数重数. 因此 A 不可对角化, 这与 A 可对角化矛盾!

□

例题 0.48 设 $A, B \in \mathbb{Q}^{n \times n}$ 满足 $(A - B)^2 = AB$. 证明: $\det(AB - BA) = 0$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由条件可知

$$A^2 + B^2 = 2AB + BA.$$

待定 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得 $ab = 1$, 这样就有

$$\begin{aligned} (A + aB)(A + bB) &= A^2 + abB^2 + bAB + aBA = A^2 + B^2 + bAB + aBA \\ &= 2AB + BA + bAB + aBA = (2 + b)AB + (1 + a)BA. \end{aligned}$$

再要求 $(2 + b)AB + (1 + a)BA = k(AB - BA)$, $k \in \mathbb{R}$, 即

$$\begin{cases} 2 + b = k \\ 1 + a = -k \end{cases} \Rightarrow a + b = -3.$$

由 $ab = 1, a + b = -3$ 可知 a, b 是方程 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 的根, 故可取

$$a = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}, \quad b = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}.$$

此时 $k = 2 + b = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, 于是就有

$$\left(A - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}B\right) \left(A + \frac{\sqrt{5} - 3}{2}B\right) = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}(AB - BA).$$

从而

$$|AB - BA| = \left(\frac{2}{1 + \sqrt{5}}\right)^n \left|A - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}B\right| \cdot \left|A + \frac{\sqrt{5} - 3}{2}B\right|. \quad (25)$$

记 $A - \frac{3}{2}B = C = (c_{ij})$, $\frac{1}{2}B = D = (d_{ij})$, 则由行列式的组合定义得

$$\left| A - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}B \right| \cdot \left| A + \frac{\sqrt{5} - 3}{2}B \right| = \left| A - \frac{3}{2}B - \frac{\sqrt{5}}{2}B \right| \cdot \left| A - \frac{3}{2}B + \frac{\sqrt{5}}{2}B \right| = |C - \sqrt{5}D| \cdot |C + \sqrt{5}D|.$$

由于矩阵的行列式计算只涉及乘法、加法、减法运算, 且 $C, D \in \mathbb{Q}$, 故存在 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Q}$, 使得

$$|C + \lambda D| = a_0 \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n = f(\lambda) \in \mathbb{Q}[x].$$

于是存在 $u, v \in \mathbb{Q}$, 使得

$$|C + \sqrt{5}D| = f(\sqrt{5}) = a_0 (\sqrt{5})^n + a_1 (\sqrt{5})^{n-1} + \dots + a_n = u + v\sqrt{5}.$$

从而

$$|C - \sqrt{5}D| = f(-\sqrt{5}) = a_0 (-\sqrt{5})^n + a_1 (-\sqrt{5})^{n-1} + \dots + a_n = u - v\sqrt{5}.$$

故

$$\left| A - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}B \right| \cdot \left| A + \frac{\sqrt{5} - 3}{2}B \right| = |C - \sqrt{5}D| \cdot |C + \sqrt{5}D| = (u + v\sqrt{5})(u - v\sqrt{5}) = u^2 - 5v^2 \in \mathbb{Q}. \quad (26)$$

注意到 $|AB - BA| \in \mathbb{Q}$, $\left(\frac{2}{1 + \sqrt{5}}\right)^n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, 若 $|AB - BA| \neq 0$, 则结合 (25)(26) 式可知

$$|AB - BA| = \left(\frac{2}{1 + \sqrt{5}}\right)^n \left| A - \frac{3 + \sqrt{5}}{2}B \right| \cdot \left| A + \frac{\sqrt{5} - 3}{2}B \right| \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

这与 $|AB - BA| \in \mathbb{Q}$ 矛盾! 故 $|AB - BA| = 0$.

□

例题 0.49 设 A, B 都为 n 阶方阵.

- (1) 证明: AB, BA 有相同的特征值.
- (2) 证明: 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由打洞原理可知

$$\begin{vmatrix} \lambda I & A \\ B & I \end{vmatrix} = |\lambda I - AB| = |\lambda I| \left| I - \frac{1}{\lambda} BA \right| = |\lambda I - BA|.$$

故 AB, BA 有相同特征值.

- (2) 反证, 假设存在正交矩阵 A, B , 满足 $A^2 = AB + B^2$. 进而 AB, BA 也是正交阵, 且

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2 + BA - AB = BA.$$

由命题??知

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |(A + B)(A - B)| = |BA| = \pm 1. \quad (27)$$

注意到 $A^T B$ 也是正交阵, 故由定理??知 $(A^T B)^2$ 的特征值全为 1, 因此

$$|A - BA^T B| = |A| \left| I - (A^T B)^2 \right| = 0.$$

从而

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} \begin{vmatrix} r_1 - BA^{-1} \cdot r_2 \\ j_1 - j_2 \cdot A^{-1} B \end{vmatrix} \begin{vmatrix} A - BA^T B & O \\ O & A \end{vmatrix} = |A| \cdot \left| I - (A^T B)^2 \right| = 0,$$

这与 (27) 式矛盾!

□

例题 0.50 设 A, C 为 n 阶复矩阵, $r(C) = 1$, 且

$$A^2 = CA - AC.$$

证明: $A^2C = O$.

证明 Show/Hide Proof

(i) 当 $\text{tr}C \neq 0$ 时, 由 $r(C) = 1$ 知, C 相似于对角矩阵 $\text{diag}\{\lambda, 0, \dots, 0\}, \lambda \neq 0$. 故可不妨设

$$C = \text{diag}\{\lambda, 0, \dots, 0\}, \quad A = \begin{pmatrix} a & \alpha^T \\ \beta & B \end{pmatrix}.$$

从而

$$\begin{pmatrix} a^2 + \alpha^T \beta & a\alpha^T + \alpha^T B \\ (aI + B)\beta & \beta\alpha^T + B^2 \end{pmatrix} = A^2 = CA - AC = \begin{pmatrix} 0 & \lambda\alpha^T \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix}.$$

于是

$$a^2 + \alpha^T \beta = 0, \quad (aI + B)\beta = -\lambda\beta; \quad (28)$$

$$A^2C = \begin{pmatrix} 0 & \lambda\alpha^T \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\lambda\beta & O \end{pmatrix}.$$

因此只需证 $\beta = 0$. 由题设可知

$$\begin{aligned} \text{tr}(A^{2n}) &= \text{tr}(A^{n-1}(CA - AC)A^{n-1}) = \text{tr}(A^{n-1}CA^n) - \text{tr}(A^nCA^{n-1}) \\ &= \text{tr}(A^{2n-1}C) - \text{tr}(A^{2n-1}C) = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

于是由幂零矩阵关于迹的充要条件知 A^2 是幂零矩阵, 进而 A^2 的特征值全为 0, 故 A 的特征值也全为 0, 即 A 也是幂零矩阵. 又注意到

$$A^4 = \begin{pmatrix} -\lambda^2\alpha^T\beta & 0 \\ 0 & -\lambda^2\alpha^T\beta \end{pmatrix},$$

故

$$-2\lambda^2\alpha^T\beta = \text{tr}(A^4) = 0 \implies \alpha^T\beta = 0.$$

再结合(28)式知

$$a^2 + \alpha^T\beta = 0 \implies a = 0,$$

$$B\beta = (aI + B)\beta = -\lambda\beta.$$

进而

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \alpha^T \\ \beta & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha^T\beta \\ B\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\lambda\beta \end{pmatrix}.$$

若 $\beta \neq 0$, 则 $-\lambda$ 为 A 的非零特征值, 与 A 幂零矛盾!

(ii) 当 $\text{tr}C = 0$ 时, 由 $r(C) = 1$ 知, 存在可逆阵 P , 使得

$$P^{-1}CP = \begin{pmatrix} C_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}, \quad C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

故可不妨设 $C = \begin{pmatrix} C_1 & O \\ O & O \end{pmatrix}, A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$A^2C = CAC = a_{21}C.$$

进而若 $CA - AC = A^2 = O$, 则显然 $A^2C = O$. 若 $CA - AC \neq O$, 则

$$A^4 = A^2(CA - AC) = (A^2C)A - A(A^2C) = a_{21}(CA - AC).$$

故 a_{21} 为 A^2 的特征值, 由 (i) 可知 A^2 为幂零矩阵, 故 $a_{21} = 0$. 因此

$$A^2C = a_{21}C = O.$$

□

例题 0.51 设 $A \in \mathbb{R}^{r \times r}, B \in \mathbb{R}^{r \times n}, C \in \mathbb{R}^{n \times r}$, 且 $r(A \ B) = r \begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = r$, 证明 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & O \end{pmatrix}$ 相似.

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\begin{vmatrix} \lambda I - A & B \\ O & \lambda I \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda I - A & O \\ C & \lambda I \end{vmatrix},$$

故 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & O \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & O \\ C & O \end{pmatrix}$ 的特征值相同. 由命题??知, 只需证

$$r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right) = r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ C & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right), \quad 1 \leq k \leq r+n.$$

当 $\lambda \neq 0$ 时, 对 $\forall k \in [1, r+n] \cap \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right) &= r \left[\left(\begin{pmatrix} I & \frac{1}{\lambda} B \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix} \right)^k \right] = r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right), \\ r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ C & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right) &= r \left[\left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & O \\ \frac{1}{\lambda} C & I \end{pmatrix} \right)^k \right] = r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right), \end{aligned}$$

故

$$r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right) = r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ C & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right), \quad 1 \leq k \leq r+n.$$

当 $\lambda = 0$ 时, 对 $\forall k \in [1, r+n] \cap \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} r \left(\begin{pmatrix} A & B \\ O & O \end{pmatrix}^k \right) &= r \begin{pmatrix} A^k & A^{k-1}B \\ O & O \end{pmatrix} = r(A^{k-1}(A \ B)), \\ r \left(\begin{pmatrix} A & O \\ C & O \end{pmatrix}^k \right) &= r \begin{pmatrix} A^k & O \\ CA^{k-1} & O \end{pmatrix} = r \left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} A^{k-1} \right). \end{aligned}$$

由条件知 $(A \ B)$ 行满秩, $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$ 列满秩. 故存在可逆阵 P, Q , 使得

$$(A \ B)P = Q \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = I_{r \times r}.$$

于是

$$\begin{aligned} r(A^{k-1}(A \ B)) &= r(A^{k-1}(A \ B)P) = r(A^{k-1}), \\ r \left(\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} A^{k-1} \right) &= r \left(Q \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} A^{k-1} \right) = r(A^{k-1}). \end{aligned}$$

故

$$r \left(\begin{pmatrix} A & B \\ O & O \end{pmatrix}^k \right) = r \left(\begin{pmatrix} A & O \\ C & O \end{pmatrix}^k \right), \quad 1 \leq k \leq r+n.$$

综上所述可知

$$r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ O & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right) = r \left(\begin{pmatrix} A - \lambda I & O \\ C & -\lambda I \end{pmatrix}^k \right), \quad 1 \leq k \leq r+n.$$

由命题??知结论成立.

□

命题 0.4 (复矩阵行列式模长平方等于其实化后实矩阵的行列式)

设 V 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维线性空间, A 是 V 上的线性变换, A 在 V 的某组基下的矩阵记为 A_C . V 关于向量加法以及实数的数乘构成实数域 $\mathbb{R}$ 上 $2n$ 维线性空间, 记为 V_R , A 也为 V_R 的一个线性变换, 设 A 在 V_R 的某组基下的矩阵记为 A_R , 证明: $|A_R| = |\det A_C|^2$.

▲

证明 Show/Hide Proof

见清疏公众号.

□

例题 0.52 设 G 是一个有限群, V 是一个 n 维酉空间 (其中的内积用 $(\cdot, \cdot)$ 表示), $\rho: G \rightarrow GL(V)$ 是一个群同态, 其中 $GL(V)$ 代表 V 上的全体可逆线性变换构成的群 (称为 V 的一般线性群). 对每个 $g \in G$, $\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换. 一般来说, $\rho(g)$ 未必保持 V 上的内积, 即 $\rho(g)$ 未必是酉变换. 现把 V 上的内积改造为

$$\{v, w\} = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv, gw).$$

其中 gv 代表 $\rho(g)(v)$, $|G|$ 代表群 G 所含元素的个数. 证明:

- (1) $\{, \}$ 定义了 V 上的一个新的内积.
- (2) 在新的内积下, 所有的线性变换 $\rho(g) (g \in G)$ 成为 V 上的酉变换, 即

$$\{gv, gw\} = \{v, w\}$$

对一切 $g \in G$ 及一切 $v, w \in V$ 都成立.

- (3) 在新的内积下, 酉空间 V 可以写成一些不可约 G -不变子空间的直和. (注: V 的子空间 W 称为 G -不变的, 如果对每个 $g \in G$, W 是 V 的 $\rho(g)$ -不变子空间; V 的 G -不变子空间 W 称为不可约的, 如果 W 没有真的 G -不变子空间.)

证明 Show/Hide Proof

设 V 的数域是 $\mathbb{K}$, G 的单位元是 e .

- (1) 由 $(\cdot, \cdot)$ 是 V 中的内积知对 $\forall v_1, v_2, w_1, w_2 \in V, a, b \in \mathbb{K}$, 有

$$\begin{aligned} \{av_1 + bv_2, w_1\} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (g(av_1 + bv_2), gw_1) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (agv_1 + bgv_2, gw_1) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [a(gv_1, gw_1) + b(gv_2, gw_1)] = \frac{a}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_1) + \frac{b}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_2, gw_1) \\ &= a\{v_1, w_1\} + b\{v_2, w_1\}; \\ \{v_1, aw_1 + bw_2\} &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, g(aw_1 + bw_2)) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, agw_1 + bgw_2) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} [\bar{a}(gv_1, gw_1) + \bar{b}(gv_1, gw_2)] = \frac{\bar{a}}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_1) + \frac{\bar{b}}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gw_2) \\ &= \bar{a}\{v_1, w_1\} + \bar{b}\{v_1, w_2\}. \end{aligned}$$

并且

$$\{v_1, v_1\} = 0 \iff \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} (gv_1, gv_1) = 0 \iff (gv_1, gv_1) = 0, \forall g \in G \iff gv_1 = 0, \forall g \in G \iff v_1 = 0.$$

故 $\{, \}$ 定义了 V 的一个新内积.

- (2) 由 G 是有限群知 $Gg = G, \forall g \in G$, 即 $\{hg \mid h \in G\} = G$. 于是对 $\forall g \in G, v, w \in V$, 有

$$\{gv, gw\} = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} (hgv, hgw) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} (hv, hw) = \{v, w\}.$$

(3) 若 $\dim V = 1$, 则 V 自身不可约, 结论显然成立. 设结论对 $\dim V < n$ 的情形都成立, 现在考虑 $\dim V = n$ 的情形.

若 V 中无非平凡的真 G -不变子空间, 则 V 不可约, 结论平凡成立. 下设 V 中存在一个真 G -不变子空间 W . 记 W 在内积空间 $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 中的正交补空间为 $W^\perp$, 则

$$V = W \oplus W^\perp. \quad (29)$$

对 $\forall g \in G, v \in W, w \in W^\perp$, 则由 W 是 G -不变子空间知 $g^{-1}v \in W$. 再由 (2) 和 $W \perp W^\perp$ 可得

$$\{v, gw\} = \{g^{-1}v, g^{-1}gw\} = \{g^{-1}v, w\} = 0.$$

故由 v 的任意性知 $\rho(g)w \in W^\perp$. 由 g, w 的任意性知 $W^\perp$ 是 G -不变子空间.

由 W 是 V 的真子空间和 (29) 式知

$$\dim W < n, \quad \dim W^\perp = n - \dim W < n.$$

故由归纳假设知 $W, W^\perp$ 都可以写成一些不可约 G -不变子空间的直和, 不妨设

$$W = W_1 \oplus \cdots \oplus W_m, \quad W^\perp = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

于是再结合 (29) 式和命题 ?? 可得

$$V = W \oplus W^\perp = W_1 \oplus \cdots \oplus W_m \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_s.$$

因此由数学归纳法知结论成立. □

例题 0.53 记 V 是线性空间, $\text{End}(V)$ 为 V 上全体线性变换, σ 和 $\tau \in \text{End}(V)$, 且对于 $\forall u \in V$, 有 $\sigma(u)$ 与 $\tau(u)$ 线性相关.

证明: σ 和 τ 线性无关的充要条件是 $\ker \sigma \not\subseteq \ker \tau$ 且 $\ker \tau \not\subseteq \ker \sigma$.

证明 Show/Hide Proof

充分性: 反证. 设 σ 和 τ 线性相关, 不妨设 $\tau = \lambda\sigma, \lambda \in \mathbb{C}$, 则显然 $\ker \sigma \subseteq \ker \tau$, 这与充分性假设矛盾!

必要性: 反证. 不妨设 $\ker \sigma \subseteq \ker \tau$. 若 σ 是零变换, 则 $\ker \sigma = \ker \tau = V$. 从而 σ 和 τ 都是零变换, 显然线性相关, 这与必要性假设矛盾!

下设 σ 不是零变换, 则存在 $x_0 \in V$, 使得 $\sigma(x_0) \neq 0$. 由题设知, 存在 $\lambda_0 \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(x_0) = \lambda_0 \sigma(x_0). \quad (30)$$

对 $\forall u \in V$, 下证 $\tau(u) = \lambda_0 \sigma(u)$.

(i) 若 $\sigma(u) = 0$, 则由 $\ker \sigma \subseteq \ker \tau$ 知 $\tau(u) = 0 = \lambda_0 \sigma(u)$.

(ii) 若 $\sigma(x_0)$ 与 $\sigma(u)$ 线性相关, 不妨设 $\sigma(u) = a\sigma(x_0), a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 则

$$\sigma(u - ax_0) = 0 \implies u - ax_0 \in \ker \sigma \subseteq \ker \tau. \quad (31)$$

由题设知存在 $\lambda_u \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(u) = \lambda_u \sigma(u) = a\lambda_u \sigma(x_0). \quad (32)$$

再结合 (30)、(31) 式知

$$0 = \tau(u - ax_0) = a(\lambda_u - \lambda_0)\sigma(x_0).$$

又因为 $a \neq 0, \sigma(x_0) \neq 0$, 所以由上式知 $\lambda_u = \lambda_0$, 再由 (32) 式知 $\tau(u) = \lambda_0 \sigma(u)$.

(iii) 若 $\sigma(u)$ 与 $\sigma(x_0)$ 线性无关, 则由题设知, 存在 $\lambda_u, \lambda_1 \in \mathbb{C}$, 使得

$$\tau(u) = \lambda_u \sigma(u), \quad \tau(u + x_0) = \lambda_1 \sigma(u + x_0) = \lambda_1 \sigma(u) + \lambda_1 \sigma(x_0). \quad (33)$$

从而

$$\tau(u + x_0) = \lambda_u \sigma(u) + \lambda_0 \sigma(x_0) = \lambda_1 \sigma(u) + \lambda_1 \sigma(x_0) \implies (\lambda_u - \lambda_1)\sigma(u) + (\lambda_0 - \lambda_1)\sigma(x_0) = 0.$$

由 $\sigma(u)$ 与 $\sigma(x_0)$ 线性无关知 $\lambda_u = \lambda_1 = \lambda_0$, 再结合 (33) 式知 $\tau(u) = \lambda_0 \sigma(u)$.

综上, 无论如何都有

$$\tau(u) = \lambda_0 \sigma(u), \quad \forall u \in V.$$

即 σ 和 τ 线性相关, 这与必要性假设矛盾!

□