

0.1 覆盖定理

命题 0.1

设 V_0 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 的真子空间, 则 V_0 至多包含 $n-1$ 个 V 中的基向量.

证明 Show/Hide Proof

反证法, 若 V_0 包含 n 个 V 中的基向量, 则 V_0 就包含了 V 的一组基. 不妨设 V_0 中的这组基向量为 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 则 $\forall \alpha \in V$, 有 $\alpha = k_1 e_1 + k_2 e_2 + \dots + k_n e_n \in V_0$, 其中 $k_i \in \mathbb{F}, i = 1, 2, \dots, n$. 故 $V_0 \supset V$, 又 $V_0 \subset V$, 因此 $V_0 = V$. 这与 V_0 是 V 的真子空间矛盾.

□

定理 0.1 (覆盖定理)

- (1) 数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间之并.
- (2) 域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间之并.
- (3) 域 $\mathbb{F}$ 上无限维线性空间 V 不能分解为有限个 (大于等于 2 个) 非平凡子空间之并.

♥

注 这个定理表明: 有限个真子空间不能覆盖全空间. 下述证明要用到任意一个数域都有无穷个元素这一事实. 因此, 对于有限域上的向量空间, 上例结论不一定成立.

证明 Show/Hide Proof

- (1) **证法一:** 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则只需证明在 V 中必存在一个向量 α , 它不属于任何一个 V_i . 对个数 m 进行归纳, 当 $m=1$ 时结论显然成立. 设 $m=k$ 时结论成立, 现要证明 $m=k+1$ 时结论也成立. 由归纳假设, 存在向量 α , 它不属于任何一个 $V_i (1 \leq i \leq k)$. 若 α 也不属于 V_{k+1} , 则结论已成立, 因此可设 $\alpha \in V_{k+1}$. 在 V_{k+1} 外选一个向量 β , 作集合

$$M = \{t\alpha + \beta | t \in \mathbb{F}\}.$$

事实上, 我们可将 M 看成是通过 β 的终点且平行于 α 的一根“直线”, 现要证明它和每个 V_i 最多只有一个交点. 首先, M 和 V_{k+1} 无交点, 因为若 $t\alpha + \beta \in V_{k+1}$, 则从 $t\alpha \in V_{k+1}$ 可推出 $\beta \in V_{k+1}$, 与假设矛盾. 又若对某个 $V_i (i < k+1)$, 存在 $t_1 \neq t_2$, 使得 $t_1\alpha + \beta \in V_i, t_2\alpha + \beta \in V_i$, 则 $(t_1 - t_2)\alpha \in V_i$, 从而导致 $\alpha \in V_i$, 与假设矛盾. 因此, M 和每个 V_i 最多只有一个交点, 从而 M 中只有有限个向量属于 $\bigcup_{i=1}^{k+1} V_i$, 而 t 有无穷多个选择, 即 M 中

有无穷多个向量. 故必存在 $\gamma \in M \setminus \bigcup_{i=1}^{k+1} V_i$, 由此即得结论.

证法二: 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 则只需证明在 V 中必存在一个向量 α , 它不属于任何一个 V_i . 任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 对任意的正整数 k , 构造 V 中向量

$$\alpha_k = e_1 + k e_2 + \dots + k^{n-1} e_n.$$

设向量族 $S = \{\alpha_k | k = 1, 2, \dots\}$. 由例题??可知, S 中任意 n 个不同的向量都构成 V 的一组基. 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 所以每个 V_i 至多包含 S 中 $n-1$ 个向量. 因此 $\bigcup_{i=1}^m V_i$ 至多包含 S 中 $m(n-1)$ 个向量. 又由于 S 是无限集合, 故存在某个向量 α_k , 使得 α_k 不属于任何一个 V_i .

证法三: 设 $V = \bigcup_{i=1}^m V_i$, 其中 $m \geq 2, V_i$ 都是非平凡子空间. 考虑 V 的基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 和一组向量

$$\alpha_i = e_1 + i e_2 + i^2 e_3 + \dots + i^{n-1} e_n, \quad i = 1, 2, \dots.$$

从而

$$(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_n}) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ i_1^{n-1} & i_2^{n-1} & \dots & i_n^{n-1} \end{pmatrix}, i_1, \dots, i_n \in \mathbb{N}.$$

由 Vandermonde 行列式的性质, 上面这组向量 $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$ 中任何 n 个都线性无关. 而其中必有无有限个 α_i 落入某个题设 V 的某个非平凡子空间 V_i 中, 否则, $V = \bigcup_{i=1}^n V_i$ 中只包含 $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$ 中有限个向量, 这与 $\{\alpha_i\}_{i=1}^\infty \subset V$ 矛盾! 从而这个子空间至少是 n 维的, 这和其是非平凡子空间矛盾!

(2) 设 $V = V_1 \cup V_2$, V_1, V_2 都是 V 的非平凡不变子空间. 则存在 $v_1 \in V_1 \setminus V_2, v_2 \in V_2 \setminus V_1$. 注意到

$$v_1 + v_2 \in V_1 \Rightarrow v_2 \in V_1, v_1 + v_2 \in V_2 \Rightarrow v_1 \in V_2,$$

从而

$$v_1 + v_2 \notin V_1 \cup V_2,$$

这就是一个矛盾! 因此我们证明了域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 不能分解为两个非平凡子空间之并.

(3) 若 $V_i \subset V, i = 1, 2, \dots, n$ 是非平凡子空间. 我们归纳证明

$$V \neq \bigcup_{i=1}^n V_i. \quad (1)$$

当 $n = 1$ 显然有 (1) 成立. 假设对 n 有 (1) 成立, 当 $n + 1$ 时, 由归纳假设取 $\alpha \in V \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n V_i\right)$.

如果 $\alpha \notin V_{n+1}$, 则 (1) 对 $n + 1$ 已经成立. - 若 $\alpha \in V_{n+1}$, 由 V_{n+1} 非平凡, 存在 $\beta \in V \setminus V_{n+1}$. 注意到

$$S = \{t\alpha + \beta : t \in \mathbb{F}\} \subset V \setminus V_{n+1},$$

这是因为若某个 $t\alpha + \beta \in V_{n+1}$ 可推出 $\beta \in V_{n+1}$ 而矛盾!. 现在若有 $t_1\alpha + \beta, t_2\alpha + \beta$ 属于同一个 $V_j, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 则

$$t_1\alpha + \beta - (t_2\alpha + \beta) = (t_1 - t_2)\alpha \in V_j,$$

即 $t_1 = t_2$. 现在 S 中向量有无穷多个, 所以必然有一个不落在 $\bigcup_{j=1}^n V_j$, 自然也不落在 $\bigcup_{j=1}^{n+1} V_j$, 这就证明了 (1) 对 $n + 1$ 也成立!. 至此我们完成了证明.

□

推论 0.1

设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上向量空间 V 的 m 个真子空间, 证明: V 中必有一组基, 使得每个基向量都不在诸 V_i 的并中.



证明 Show/Hide Proof

证法一: 由覆盖定理可知, 存在非零向量 $e_1 \in V$, 使得 $e_1 \notin \bigcup_{i=1}^m V_i$. 定义 $V_{m+1} = L(e_1)$, 再由覆盖定理可知, 存在

向量 $e_2 \in V$, 使得 $e_2 \notin \bigcup_{i=1}^{m+1} V_i$. 由推论??可知, $e_2 \notin L(e_1)$ 意味着 e_1, e_2 线性无关. 重新定义 $V_{m+1} = L(e_1, e_2)$, 再由覆

盖定理可知, 存在向量 $e_3 \in V$, 使得 $e_3 \notin \bigcup_{i=1}^{m+1} V_i$. 再由推论??可知, $e_3 \notin L(e_1, e_2)$ 意味着 e_1, e_2, e_3 线性无关. 不断重复上述讨论, 即添加线性无关的向量重新定义 V_{m+1} , 并反复利用覆盖定理和推论??的结论, 最后可以得到 n 个线性无关的向量 $e_1, e_2, \dots, e_n$, 它们构成 V 的一组基, 且满足 $e_j \notin \bigcup_{i=1}^m V_i (1 \leq j \leq n)$.

证法二: 任取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 对任意的正整数 k , 构造 V 中向量 $\alpha_k = e_1 + ke_2 + \dots + k^{n-1}e_n$, 设向

量族 $S = \{\alpha_k | k = 1, 2, \dots\}$. 由例??可知, S 中任意 n 个不同的向量都构成 V 的一组基. 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 所以每个 V_i 至多包含 S 中 $n-1$ 个向量. 因此 $\bigcup_{i=1}^m V_i$ 至多包含 S 中 $m(n-1)$ 个向量. 又由于 S 是无限集合, 故存在某个向量 α_k , 使得 α_k 不属于任何一个 V_i . 进一步, 在 S 中一定还存在 n 个不同的向量 $\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, \dots, \alpha_{k_n}$, 使得每个 α_{k_j} 都不属于任何一个 V_i , 此时 $\{\alpha_{k_1}, \alpha_{k_2}, \dots, \alpha_{k_n}\}$ 就构成了 V 的一组基.

□

例题 0.1 设 V 是复数域上线性空间且 $V_i, i = 1, 2, \dots, k$ 是 V 真子空间. 若 $\alpha_i \in V, i = 1, 2, \dots, k$, 证明: $V \neq \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i)$.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 选取特殊向量 v_1 : 因为 V_i 都是 V 的真子空间, 根据覆盖定理, 我们知道存在向量 $v_1 \in V$, 使得 $v_1 \notin V_i$ 对所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ 都成立. 任取一个固定的向量 $v_0 \in V$, 构造直线

$$L = \{v_0 + tv_1 | t \in \mathbb{C}\}.$$

因为 $\mathbb{C}$ 是无限域, 所以直线 L 上有无穷多个点. 下证直线 L 与 $\alpha_i + V_i$ 的交点至多只有一个. 假设存在 $t_1 \neq t_2$, 使得

$$v_0 + t_1 v_1, v_0 + t_2 v_1 \in \alpha_i + V_i.$$

从而 $(t_1 - t_2)v_1 \in V_i$. 故 $v_1 \in V_i$. 这与 v_1 的取法矛盾! 因此, 对于每一个 i , 直线 L 与 $\alpha_i + V_i$ 的交点最多只有一个. 又因为直线 L 包含了无穷多个点, 所以一定存在 $t_0 \in \mathbb{C}$, 使得

$$v_0 + t_0 v_1 \in L \setminus \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i) \subset V \setminus \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

因此

$$V \neq \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

证法二: 考虑线性空间

$$\tilde{V} \triangleq V \oplus \mathbb{C}, \quad \tilde{V}_i \triangleq \{(\beta + t\alpha_i, t) : \beta \in V_i, t \in \mathbb{C}\}, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

对 $i = 1, 2, \dots, k$, 注意到对 $\alpha \in V \setminus V_i$, 我们有 $(\alpha, 0) \notin \tilde{V}_i$, 即 $\tilde{V}_i$ 都是 $\tilde{V}$ 的真子空间. 由覆盖定理得

$$\tilde{V} \neq (V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k \tilde{V}_i \right).$$

故存在

$$(x, t) \in \tilde{V} \setminus \left((V \times \{0\}) \cup \left(\bigcup_{i=1}^k \tilde{V}_i \right) \right),$$

从而

$$t \neq 0, \quad (x, t) = \left(t \left(\frac{x}{t} - \alpha_i \right) + t\alpha_i, t \right) \notin \tilde{V}_i, \quad i = 1, 2, \dots, k.$$

现在就有

$$\frac{x}{t} - \alpha_i \notin V_i, \quad i = 1, 2, \dots, k,$$

即

$$\frac{x}{t} \in V \setminus \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

因此

$$V \neq \bigcup_{i=1}^k (\alpha_i + V_i).$$

□

例题 0.2 设 V 是有限维线性空间, $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是 V 上两两不同线性变换, 则 $\exists \alpha \in V$, 使 $A_1\alpha, A_2\alpha, \dots, A_s\alpha$ 两两

不同.

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \text{Ker}(A_j - A_i)$, 显然 $\text{Ker}(A_j - A_i) \neq V, \emptyset$. 故由覆盖定理知, 我们有 $\bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \text{Ker}(A_j - A_i) \neq V$. 因此 $\exists \alpha \in V \setminus \bigcup_{1 \leq i < j \leq n} \text{Ker}(A_j - A_i)$, 此时

$$(A_j - A_i)\alpha \neq 0 \iff A_i\alpha \neq A_j\alpha, 1 \leq i < j \leq n.$$

□

例题 0.3 设 T 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的线性变换且 $T(AB) = T(A)T(B), T(AB) = T(B)T(A)$ 必有一个成立. 证明: 要么对所有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(A)T(B)$, 要么对所有 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 都有 $T(AB) = T(B)T(A)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 考虑

$$V_A = \{B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(B)T(A)\};$$

$$V'_A = \{B \in \mathbb{R}^{n \times n} : T(AB) = T(A)T(B)\},$$

则有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A \cup V'_A$. 由覆盖定理, 我们有 $\mathbb{R}^{n \times n} = V_A$ 或者 $\mathbb{R}^{n \times n} = V'_A$. 再由 A 的任意性可知结论成立.

□

定义 0.1

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $v \in V, A$ 是 V 上线性变换. 记 $m_v \in \mathbb{F}[x]$ 是 $m_v(A)v = 0$ 成立的最低次的首一多项式, 我们叫 m_v 为 v 的极小多项式.

♣

命题 0.2

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $v \in V, A$ 是 V 上线性变换, m_v 为 v 的极小多项式. 若 $m \in \mathbb{F}[x]$, 且 $m(A)v = 0$, 则必有 $m_v \mid m$.

♠

证明 Show/Hide Proof

由带余除法可知, 存在 $q, r \in \mathbb{F}[x]$, 且 $\deg r < \deg m_v$, 使得 $m = qm_v + r$. 从而

$$0 = m(A)v = q(A)m_v(A)v + r(A)v = r(A)v.$$

于是 $r \equiv 0$, 否则与 m_v 是 v 的极小多项式矛盾! 故 $m_v \mid m$.

□

例题 0.4 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $v \in V, A$ 是 V 上线性变换. 记 $m_v \in \mathbb{F}[x]$ 是 $m_v(A)v = 0$ 成立的最低次的首一多项式, 我们叫 m_v 为 v 的极小多项式. 证明: 存在 $v \in V$ 使得 v 的极小多项式恰好是 A 的极小多项式.

证明 Show/Hide Proof

设 $m \in \mathbb{F}[x]$ 是 A 的极小多项式, 那么

$$m(A)v = 0, \forall v \in V$$

证法一: 反证, 假设对 $\forall v \in V$, 都有 $m_v(x) \neq m(x)$. 又由命题 0.2 知 $m_v \mid m$. 因此 $m_v(x) (v \in V)$ 都是 $m(x)$ 的首一真因式. 考虑 m 的所有首一真因式

$$m_1, m_2, \dots, m_N \in \mathbb{F}[x], N \in \mathbb{N},$$

则对 $\forall v \in V$, 都有 $m_v \in \{m_1, m_2, \dots, m_N\}$. 考虑

$$V_i \triangleq \{v \in V : m_i(A)v = 0\}, i = 1, 2, \dots, N.$$

对 $\forall v_0 \in V$, 由于 $m_{v_0}(x)$ 都是 $m(x)$ 的首一真因式, 故存在 $i_0 \in [1, N] \cap \mathbb{N}$, 使得 $m_{v_0} = m_{i_0}$. 从而 $m_{i_0}(A)v_0 = 0$, 于是

$v_0 \in V_{i_0}$. 因此 $V \subset \bigcup_{i=1}^N V_i$. 故 $V = \bigcup_{i=1}^N V_i$, 于是由覆盖定理, 我们有某个 i 使得 $V_i = V$, 故

$$m_i(A)v = 0, \forall v \in V.$$

因此 $m_i(A) = 0$. 这意味着 $m|m_i$, 故 $m = m_i$. 这与 m_i 是 m 的真因式矛盾!

证法二: 设 $m(x) = (x - \lambda_1)^{k_1}(x - \lambda_2)^{k_2} \cdots (x - \lambda_t)^{k_t}$, 则由定理??知

$$\mathbb{F}^n = \text{Ker}(A - \lambda_1 I)^{k_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(A - \lambda_t I)^{k_t}. \quad (2)$$

对 $\forall i \in \{1, 2, \dots, t\}$, 若 $\text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1}$, 则

$$\mathbb{F}^n = \text{Ker}(A - \lambda_1 I)^{k_1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1} \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(A - \lambda_t I)^{k_t}.$$

从而对 $\forall \alpha \in \mathbb{F}^n$, 都存在 $\beta_j \in \text{Ker}(A - \lambda_j I)^{k_j}, j \in \{1, 2, \dots, t\} \setminus \{i\}, \beta_i \in \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1}$, 使得

$$\alpha = \beta_1 + \cdots + \beta_i + \cdots + \beta_t.$$

令 $g(x) = (x - \lambda_1)^{k_1} \cdots (x - \lambda_i)^{k_i-1} \cdots (x - \lambda_t)^{k_t}$, 则 $\deg g(x) < \deg m(x)$ 且

$$g(A)\alpha = g(A)\beta_1 + \cdots + g(A)\beta_i + \cdots + g(A)\beta_t = 0.$$

由 α 的任意性知 $g(x)$ 是 A 的零化多项式, 因此 $m(x) | g(x)$, 但 $\deg g(x) < \deg m(x)$, 矛盾! 故

$$\text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \supset \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1} \implies \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \setminus \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1} \neq \emptyset.$$

现在任取 $\alpha_i \in \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i} \setminus \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1}$, 记 $m_i(x) = (x - \lambda_i)^{k_i}$, 则

$$m_i(A)\alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, t.$$

故由命题 0.2 知, $m_{\alpha_i}(x) | m_i(x)$, 再由首一性可设 $m_{\alpha_i}(x) = (x - \lambda_i)^{m_i}, m_i \leq k_i$. 若 $m_i < k_i$, 则

$$0 = m_{\alpha_i}(A)\alpha_i \implies \alpha_i \in \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{m_i} \subseteq \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i-1},$$

这与 α_i 的取法矛盾! 故 $m_i = k_i$, 即 $m_{\alpha_i}(x) = (x - \lambda_i)^{k_i}$. 进而

$$[m_{\alpha_1}(x), m_{\alpha_2}(x), \dots, m_{\alpha_t}(x)] = m(x).$$

令 $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_t$, 则由命题 0.2 知 $m_\alpha(x) | m(x)$, 并且

$$0 = m_\alpha(A)\alpha = m_\alpha(A)\alpha_1 + m_\alpha(A)\alpha_2 + \cdots + m_\alpha(A)\alpha_t.$$

又因为 $\text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i}$ 都是 A 的不变子空间, 所以 $m_\alpha(A)\alpha_i \in \text{Ker}(A - \lambda_i I)^{k_i}$. 由(2)式和直和的充要条件知

$$m_\alpha(A)\alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, t.$$

由命题 0.2 知 $m_{\alpha_i}(x) | m_\alpha(x), i = 1, 2, \dots, t$. 进而 $[m_{\alpha_1}(x), m_{\alpha_2}(x), \dots, m_{\alpha_t}(x)] | m_\alpha(x)$, 即 $m(x) | m_\alpha(x)$. 因此 $m(x) = m_\alpha(x)$. □

命题 0.3

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, $\{V_\alpha\}_{\alpha \in \Lambda}$ 是 V 的子空间. 证明存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha$$

证明 Show/Hide Proof

若 $|\Lambda| < \infty$, 则已经得证明. 若 $|\Lambda| = \infty$, 取 V_{α_1} , 若

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha$$

这已经得证.

若

$$\dim V_{\alpha_1} > \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_\alpha$$

先证存在 $\alpha_2 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 使得

$$V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2} \subset V_{\alpha_1}.$$

假设对任何 $\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 我们有

$$V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha} = V_{\alpha_1} \implies \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha} = V_{\alpha_1} \cap \left(\bigcap_{\alpha \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}} V_{\alpha} \right) = V_{\alpha_1}.$$

则

$$\dim V_{\alpha_1} = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha}$$

矛盾! 故存在 $\alpha_2 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1\}$, 使得

$$V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2} \subset V_{\alpha_1}.$$

从而

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) < \dim(V_{\alpha_1})$$

此时要么

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) > \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha}$$

要么

$$\dim(V_{\alpha_1} \cap V_{\alpha_2}) = \dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha}$$

因此我们可以继续讨论 $\alpha_3 \in \Lambda \setminus \{\alpha_1, \alpha_2\}$, 依次下去. 可以得到一个严格递减正整数列 $\left\{ \dim \bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} \right\}$, 满足

$$\dim \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha_i} \leq \dim \bigcap_{i=1}^m V_{\alpha_i} \leq \dim V_{\alpha_1}, \dim \bigcap_{i=1}^m V_{\alpha_i} \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}.$$

因此严格递减正整数列 $\left\{ \dim \bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} \right\}$ 只能有限项, 因此这样的操作会经过有限次而停止. 于是我们知道存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \Lambda$ 使得

$$\bigcap_{i=1}^n V_{\alpha_i} = \bigcap_{\alpha \in \Lambda} V_{\alpha}.$$

□

例题 0.5 设 P 为数域, τ 为 $P^{n \times n}$ 上的线性变换, 满足条件: 对任意固定的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$ 或 $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$ 至少有一个成立, 证明: 要么对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$, 要么对所有的 $A, B \in P^{n \times n}$, $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对 $\forall A \in P^{n \times n}$, 记

$$U_A \triangleq \{B : \tau(AB) = \tau(A)\tau(B)\}, \quad U'_A \triangleq \{B : \tau(AB) = \tau(B)\tau(A)\},$$

则由条件知

$$P^{n \times n} = U_A \cup U'_A.$$

从而 U_A, U'_A 都不是非平凡子空间, 否则与覆盖定理矛盾! 因此对 $\forall A \in P^{n \times n}$, 要么 $U_A = P^{n \times n}$, 要么 $U'_A = P^{n \times n}$. 再记

$$W_1 = \{A : U_A = P^{n \times n}\}, \quad W_2 = \{A : U'_A = P^{n \times n}\},$$

则

$$P^{n \times n} = W_1 \cup W_2.$$

于是 W_1, W_2 都不是非平凡子空间, 否则与覆盖定理矛盾! 故要么 $W_1 = P^{n \times n}$, 要么 $W_2 = P^{n \times n}$. 即

要么对 $\forall A \in P^{n \times n}$, 都有 $U_A = P^{n \times n}$;

要么对 $\forall A \in P^{n \times n}$, 都有 $U'_A = P^{n \times n}$.

也即

要么对 $\forall A, B \in P^{n \times n}$, 都有 $\tau(AB) = \tau(A)\tau(B)$;

要么对 $\forall A, B \in P^{n \times n}$, 都有 $\tau(AB) = \tau(B)\tau(A)$.

□