

0.1 实数基本定理

0.1.1 定理介绍

定理 0.1 (实数基本定理)

1. 确界存在定理: 有上界的非空数集一定有上确界.
2. 单调有界原理: 单调有界数列一定收敛.
3. 柯西收敛准则: 数列 $\{x_n\}$ 收敛当且仅当任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得任意 $m, n > N$ 都有 $|x_m - x_n| < \varepsilon$.
4. 闭区间套定理: 闭区间套 $I_n = [a_n, b_n]$ 满足 $I_{n+1} \subset I_n$ 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$, 则存在唯一的 ξ , 使得 ξ 属于每一个 I_n .
5. 聚点定理: 有界数列必有收敛子列.
6. 有限覆盖定理: 有界闭集的任意一族开覆盖, 都存在有限子覆盖.

定义 0.1 (点集相关概念)

1. 如果存在 $r > 0$ 使得 $(a - r, a + r) \subset A$, 则称 a 是集合 A 的内点 (高维改为开球即可).
2. 如果一个集合 A 中的每一个点都是内点, 则称 A 是开集.
3. 如果集合 A 中的任意一个收敛序列 x_n 的极限点 x , 都有 $x \in A$, 则称 A 是闭集.
4. 设 $B \subset A$, 如果对任意 $r > 0$ 和任意 $x \in A$, 都有 $(x - r, x + r) \cap B \neq \emptyset$, 则称 B 在 A 中稠密.

0.1.2 综合应用

命题 0.1

设 E 是非空集合且 $m = \inf E, M = \sup E \notin E$, 则存在 $\{x_n\} \subseteq E$ 严格递减趋于 $m, \{y_n\} \subseteq E$ 严格递增趋于 M .

 **笔记** 对 $\forall \varepsilon > 0$, 若 $m, M \in E$, 那么 m, M 始终满足 $m < m + \varepsilon, M > M - \varepsilon$, 这样就无法利用上、下确界的定义取出严格单调趋于 m, M 的数列.

证明 由上、下确界的定义易证. □

命题 0.2

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上非常数的周期函数, 且 f 在某一点 x_0 处存在单侧极限 (有限或无穷), 则 f 必有最小正周期.

 **笔记** 若条件改为 f 是 $\mathbb{R}$ 上非常数的连续周期函数, 与下述证明一样定义 μ, T_n , 那么可以直接利用连续性得到

$$f(x + \mu) = f\left(x + \lim_{n \rightarrow \infty} T_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x).$$

进而 μ 就是 f 的周期, 若 $\mu = 0$, 则 f 为常函数, 矛盾! 即证.

证明 不妨设 $f(x)$ 在 x_0 处存在左侧极限 (有限或无穷). 记

$$E = \{T > 0 \mid f(x) = f(x + T), \forall x \in \mathbb{R}\},$$

显然 E 有下界 0, 由确界原理知 E 存在下确界, 记 $\inf E = \mu$. 下面先证 $\mu > 0$.

- (i) 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ 或 $-\infty$ 时, 由 f 在 $\mathbb{R}$ 上非常数知, 存在 $x \in \mathbb{R}$, 使得 $|f(x)| \neq 0$. 此时存在 $\delta > 0$, 使得

$$|f(y)| > |f(x)|, \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0).$$

故此时必有 $\mu \geq \delta > 0$.

(ii) 当 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a < +\infty$ 时, 若 $\mu = 0 \notin E$, 则由命题 0.1 知, 存在 $\{T_n\} \subseteq E$ 严格递减趋于 0. 对 $\forall n \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{R}$, 取

$$m_n = \lfloor \frac{y - x_0}{T_0} \rfloor + 1, \quad x_n = y - m_n T_n,$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (y - m_n T_n) = x_0, \text{ 且 } x_n = y - m_n T_n \leq x_0.$$

于是由 Henie 归结原则和 f 的周期性知

$$f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(y - m_n T_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a.$$

由 y 的任意性知 $f(y) = a (\forall y \in \mathbb{R})$, 这与 f 在 $\mathbb{R}$ 上非常数矛盾! 故 $\mu > 0$.

再证明 $\mu \in E$. 若 $\mu \notin E$, 则由命题 0.1 知, 存在 $\{T_n\} \subseteq E$ 严格递减趋于 μ . 于是由 Cauchy 收敛准则知, 存在 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m > n$, 使得

$$0 < T_n - T_m < \mu.$$

显然 $T_n - T_m \in E$, 这与 $\mu = \inf E$ 矛盾! 故 $\mu \in E$. □

例题 0.1 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 中, 且对任意 x , 都存在与 x 有关的 $r > 0$ 使得 $f(x)$ 在区间 $(x - r, x + r)$ 中恒等于某个多项式, 证明: $f(x)$ 是一个多项式.

证明 任取 $x_0 \in \mathbb{R}$, 则存在 $r_{x_0} > 0, P_{x_0} \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(t) = P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (x_0 - r_{x_0}, x_0 + r_{x_0}).$$

令

$$A = \{x \in \mathbb{R} : f(t) = P_{x_0}(t), \forall t \in (x_0 - r_{x_0}, x)\},$$

显然 $x_0 + r_{x_0} \in A$, 进而 $A \neq \emptyset$. 由确界原理知, A 存在上确界. 设 $\sup A = M < +\infty$, 则由条件知, 存在 $r_M \in (0, M - x_0 + r_{x_0}), P_M \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(t) = P_M(t), \quad \forall t \in (M - r_M, M + r_M).$$

又 $M - r_M \in (M - r_{x_0}, M)$, 故 $M - r_M \in A$, 即

$$f(t) = P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (x_0 - r_{x_0}, M - \frac{r_M}{2}).$$

从而

$$P_{x_0}(t) = P_M(t) \iff P_{x_0}(t) - P_M(t) = 0, \quad \forall t \in (M - r_M, M - \frac{r_M}{2}).$$

由多项式根的有限性知 $P_{x_0}(t) - P_M(t) = 0, \forall t \in \mathbb{R}$. 即 $P_{x_0}(t) = P_M(t), \forall t \in \mathbb{R}$. 于是

$$f(t) = P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (M - r_{x_0}, M + r_M).$$

而 $M + r_M > M$, 这与 $M = \sup A$ 矛盾! 故 $\sup A = +\infty$. 再令

$$B = \{x \in \mathbb{R} : f(t) = P_{x_0}(t), \forall t \in (x, x_0 - r_{x_0})\},$$

显然 $x_0 - r_{x_0} \in B$, 进而 $B \neq \emptyset$. 由确界原理知, A 存在下确界. 同理可证 $\inf B = -\infty$. 综上所述可知

$$f(t) = P_{x_0}(t), \quad \forall t \in (-\infty, +\infty).$$

□

例题 0.2 设 $f(x) : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 单调递增且 $f(0) > 0, f(1) < 1$, 证明: 存在 x 使得 $f(x) = x$.

 **笔记** 因为题目条件中的函数 f 只是一个实值函数, 并没有其他更进一步的性质 (连续性、可微性、凸性等). 所以我们只能利用最基本的实数基本定理证明. 证明存在性, 考虑反证法会更加简便.

注 f 并不是连续函数, 不能用介值定理.

证明 (反证法) 假设对 $\forall x \in [0, 1]$, 都有 $f(x) \neq x$. 将闭区间 $[0, 1]$ 记作 $[a_1, b_1]$, 且由条件可知 $f(a_1) > a_1, f(b_1) <$

b_1 . 令 $c_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$, 若 $f(c_1) > c_1$, 则取 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$; 若 $f(c_1) < c_1$, 则取 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$. 从而得到闭区间 $[a_2, b_2] \subset [a_1, b_1]$, 并且 $f(a_2) > a_2, f(b_2) < b_2$. 以此类推, 可得到一系列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$, 并且 $[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) > a_n, f(b_n) < b_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

根据闭区间套定理, 可知存在唯一 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 且 $\xi \in [a_n, b_n], \forall n \in \mathbb{N}$. 又由 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递增及 $f(a_n) > a_n, f(b_n) < b_n, \forall n \in \mathbb{N}$, 可知 $a_n < f(a_n) \leq f(\xi) \leq f(b_n) < b_n$. 令 $n \rightarrow \infty$ 可得 $\xi \leq f(\xi) \leq \xi$, 即 $f(\xi) = \xi$. 这与假设矛盾. □

引理 0.1 (Lebesgue 数引理)

如果 $\{O_\alpha\}$ 是区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 则存在一个正数 $\delta > 0$, 使得对于区间 $[a, b]$ 中的任何两个点 x', x'' , 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就存在开覆盖中的一个开区间, 它覆盖 x', x'' . (称这个数 δ 为开覆盖的 Lebesgue 数.) ♥

 **笔记** 本题谢惠民上的证明是利用有限覆盖定理, 而 CMC 红宝书上通过直接构造出 δ 进行证明. 这里我们采用的是聚点定理进行证明.

证明 (反证法) 假设对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 取 $\delta = \frac{1}{n} > 0$, 都存在相应的 $x_n, y_n \in [a, b]$ 且 $|x_n - y_n| < \delta$, 使得对 $\forall I \in \{O_\alpha\}$, 要么 $x_n \notin I$, 要么 $y_n \notin I$. 由聚点定理可知, 有界数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 一定存在收敛子列. 设 $\{x_{n_k}\}, \{y_{m_k}\}$ 为相应的收敛子列, 则由 $|x_n - y_n| < \delta = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$ 可知 x_{n_k}, y_{m_k} 收敛于同一个极限点. 故设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{m_k} = x_0 \in [a, b]$.

因为 $\{O_\alpha\}$ 是区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 所以存在 $I_0 \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x_0 \in I_0$. 又由于 I_0 是开集, 因此存在 $\eta > 0$, 使得 $(x_0 - \eta, x_0 + \eta) \subset I_0$. 从而由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{m_k} = x_0 \in [a, b]$ 可知, 存在充分大的 K , 使得 $|x_{n_K} - x_0| < \eta, |y_{m_K} - x_0| < \eta$. 于是 $x_{n_K}, y_{m_K} \in (x_0 - \eta, x_0 + \eta) \subset I_0$. 即开区间 $I_0 \in \{O_\alpha\}$ 同时覆盖了 x_{n_K}, y_{m_K} 这两个点, 与假设矛盾. □

注 注意对于两个收敛子列 $\{x_{n_k}\}, \{y_{m_k}\}$, 此时 $n_k = m_k$ 并不一定对 $\forall k \in \mathbb{N}$ 都成立, 即这两个收敛子列的指标集 $\{n_k\}_{k=1}^\infty, \{m_k\}_{k=1}^\infty$ 不相同也不一定有交集, 故无法利用聚点定理反复取子列的方法取到两个指标相同且同时收敛的子列 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty, \{y_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ (取 $\{x_n\}$ 为一个奇子列收敛, 偶子列发散的数列; 取 $\{y_n\}$ 为一个奇子列发散, 偶子列收敛的数列就能得到反例.).

例题 0.3

1. 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 中且对任意 x , 都存在与 x 有关的 $r > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(x - r, x + r)$ 中为常值函数, 证明: $f(x)$ 是常值函数.
2. 设 $f(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 中的实值函数, 如果对任意 $x \in [a, b]$, 均存在 $\delta_x > 0$ 以及 M_x , 使得 $|f(y)| \leq M_x, \forall y \in (x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a, b]$, 证明: $f(x)$ 是有界的.
3. 设 $f(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上, 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ 均存在与 x_0 有关的 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 是单调递增的, 证明: f 在整个 $\mathbb{R}$ 上也是单调递增的.

 **笔记** 这个结果说明: 局部常值函数就是常值函数, 闭区间上局部有界的函数都是有界函数, 局部单调递增函数在整个区间上也是单调递增的, **实数基本定理能够将局部性质扩充为整体性质.**

证明

1. **证法一 (有限覆盖定理)(不建议使用):** 对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $r_x > 0$ 使得 $f(t)$ 在区间 $(x - r_x, x + r_x)$ 为常值函数, 则 $\bigcup_{x \in [a, b]} (x - r_x, x + r_x) \supset [a, b]$, 故存在其中有限个区间 $(x_k - r_k, x_k + r_k), 1 \leq k \leq n$ 使得他们的并集包含 $[a, b]$.

直观来看只需要将这些区间“从小到大”排列, 就可以依次推出每一个区间上都是相同的一个常值函数, 但是所谓“从小到大”排列目前是无法准确定义的, 所以这样说不清楚, 优化如下:

方案 1: 选择其中个数尽可能少的区间, 使得它们的并集可以覆盖 $[a, b]$ 但是任意删去一个都不可以 (这是能够准确定义的一个操作), 此时区间具备性质“任意一个不能被其余的并集盖住”, 接下来将这些区间按照左端点的大小关系来排序, 去论证它们确实是如你所想的那样“从小到大”排列的 (关注右端点), 进而得证.

方案 2: 利用 **Lebesgue 数引理**, 将区间 $[a, b]$ 分为有限个 $[a, a + \delta], [a + \delta, a + 2\delta], \dots, [a + n\delta, b]$, 其中 δ 是 Lebesgue 数. 则每一个闭区间都可以被开覆盖中的某一个开区间覆盖住, 于是分段常值函数, 并且还能拼接起来, 所以是常值函数.

证法二 (确界存在定理):(反证法) 假设存在 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) \neq f(b)$. 构造数集

$$E = \{x \in [a, b] \mid f(t) = f(a), \forall t \in [a, x]\}.$$

从而 $E \neq \emptyset$ 且 $E \in [a, b]$. 于是由确界存在定理, 可知数集 E 存在上确界, 设 $x_0 = \sup E$.

如果 $f(a) \neq f(x_0)$, 则由条件可知, 存在 $r_0 > 0$, 使得 $f(t) = f(x_0), \forall t \in (x_0 - r_0, x_0 + r_0)$. 由 $x_0 = \sup E$ 可知, 存在 $x_1 \in (x_0 - r_0, x_0)$ 且 $x_1 \in E$. 于是 $f(t) = f(a), \forall t \in [a, x_1]$. 从而 $f(t) = f(a) = f(x_0), \forall t \in (x_0 - r_0, x_1)$. 这与 $f(x_0) \neq f(a)$ 矛盾.

如果 $f(a) = f(x_0)$, 则由条件可知, 存在 $r_1 > 0$, 使得 $f(t) = f(x_0) = f(a), \forall t \in (x_0 - r_1, x_0 + r_1)$. 又由 $x_0 = \sup E$ 可知, 存在 $x_2 \in (x_0 - r_1, x_0)$ 且 $x_2 \in E$. 于是 $f(t) = f(a), \forall t \in [a, x_2]$. 进而对 $\forall t \in [a, x_2] \cup (x_0 - r_1, x_0 + \frac{r_1}{2}] = [a, x_0 + \frac{r_1}{2}]$, 有 $f(t) = f(a)$. 从而 $x_0 + \frac{r_1}{2} \in E$, 这与 $x_0 = \sup E$ 矛盾.

故假设不成立, 命题得证.

证法三 (闭区间套定理):(反证法) 假设存在 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) \neq f(b)$. 不妨设 $f(a) < f(b)$, 则记闭区间 $[a, b] = [a_1, b_1]$. 若 $f(\frac{a_1 + b_1}{2}) > f(a_1)$, 则记闭区间 $[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}] = [a_2, b_2]$; 若 $f(\frac{a_1 + b_1}{2}) < f(b_1)$, 则记闭区间 $[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1] = [a_2, b_2]$. 以此类推, 可以得到一系列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足 $[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) < f(b_n), \forall n \in \mathbb{N}$. 由闭区间套定理, 可知存在唯一 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 且 $\xi \in [a_n, b_n]$. 又由条件可知, 存在 $r > 0$, 使得 $f(t) = f(\xi), \forall t \in (\xi - r, \xi + r)$. 从而存在充分大的 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $|a_N - \xi| < r, |b_N - \xi| < r$, 即 $a_N, b_N \in (\xi - r, \xi + r)$. 于是 $f(a_N) = f(b_N)$, 这与 $f(a_N) < f(b_N)$ 矛盾.

2. **(聚点定理):**(反证法) 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则对 $\forall n > 0$, 都存在 $x_n \in [a, b]$, 使得 $|f(x_n)| > n$. 从而得到一个有界数列 $\{x_n\}$. 由聚点定理, 可知其存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$. 由条件可知, 存在 $\delta_{x_0} > 0$ 以及 M_{x_0} , 使得 $|f(y)| \leq M_{x_0}, \forall y \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$. 又由 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ 可知, 存在 $K > M_{x_0}$, 使得 $|x_{n_K} - x_0| < \delta_{x_0}$, 即 $x_{n_K} \in (x_0 - \delta_{x_0}, x_0 + \delta_{x_0})$. 于是 $|f(x_{n_K})| \leq M_{x_0}$. 而 $|f(x_{n_K})| > n_K \geq K > M_{x_0}$ 矛盾.

3. **(闭区间套定理):**(反证法) 假设存在 $a, b \in \mathbb{R}$, 使得 $f(a) \geq f(b)$. 记闭区间 $[a, b] = [a_1, b_1]$. 若 $f(\frac{a_1 + b_1}{2}) \leq f(a_1)$, 则记闭区间 $[a_1, \frac{a_1 + b_1}{2}] = [a_2, b_2]$; 若 $f(\frac{a_1 + b_1}{2}) \geq f(b_1)$, 则记闭区间 $[\frac{a_1 + b_1}{2}, b_1] = [a_2, b_2]$. 以此类推, 可以得到一系列闭区间 $\{[a_n, b_n]\}$, 满足 $[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) \geq f(b_n), \forall n \in \mathbb{N}$. 由闭区间套定理, 可知存在唯一 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$, 且 $\xi \in [a_n, b_n]$. 由条件可知, 存在 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在区间 $(\xi - \delta, \xi + \delta)$ 上单调递增. 又由 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 可知, 存在 $N > 0$, 使得 $|a_N - \xi| < \delta, |b_N - \xi| < \delta$, 即 $a_N, b_N \in (\xi - \delta, \xi + \delta)$, 且 $a_N < b_N$. 于是 $f(a_N) \leq f(b_N)$. 而 $f(a_N) \geq f(b_N)$, 这就产生了矛盾.

□

引理 0.2

设 $f(x)$ 定义在区间 I 中, 则 $f(x)$ 的全体极值构成的集合是至多可数集.



证明 极值只有极大值和极小值, 因此只要证明极大值全体与极小值全体都是至多可数的即可.

设 $f(x)$ 的全体极小值构成的集合为 A , 则

$$A = \{f(x) \mid \exists \delta > 0, \forall t \in (x - \delta, x + \delta), f(t) \geq f(x)\}.$$

故对 $\forall y \in A$, 都存在 $x \in I$, 使得 $y = f(x)$, 并且 $\exists \delta > 0, \forall t \in (x - \delta, x + \delta), f(t) \geq f(x)$. 由有理数的稠密性可知, 存在 $r \in (x - \delta, x) \cap \mathbb{Q}, s \in (x, x + \delta) \cap \mathbb{Q}$. 从而 $(r, s) \subset (x - \delta, x + \delta)$, 于是对 $\forall t \in (r, s)$, 同样有 $f(t) \geq f(x)$.

再设全体有理开区间构成的集合为 B , 现在定义一个映射

$$\varphi: A \longrightarrow B; \quad y \longmapsto (r, s).$$

任取 $y_1, y_2 \in A$ 且 $y_1 \neq y_2$, 则存在 $x_1, x_2 \in I$, 使得 $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$. 假设 $\varphi(y_1) = \varphi(y_2) = (r_0, s_0)$, 则

对 $\forall t \in (r_0, s_0)$, 都有 $f(t) \geq y_1, y_2$. 于是 $y_1 = f(x_1) \geq y_2, y_2 = f(x_2) \geq y_1$, 从而 $y_1 = y_2$, 这产生了矛盾. 故 $\varphi(y_1) \neq \varphi(y_2)$, 因此 φ 是单射.

而由全体有理开区间构成的集合 B 是至多可数的, 因此 $f(x)$ 的全体极小值构成的集合 A 也是至多可数的. 同理, $f(x)$ 的全体极大值构成的集合也是至多可数的.

□

注 由全体有理开区间构成的集合 B 是可数集的原因:

构造一个映射

$$\phi: B \longrightarrow \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}; \quad (r, s) \longmapsto (r, s).$$

显然 ϕ 是一个双射, 而 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ 是可数集, 故 B 也是可数集.

例题 0.4 设 $f(x)$ 在区间 I 中连续, 并且在每一点 $x \in I$ 处都取到极值, 证明: $f(x)$ 是常值函数.

注 连续这一条件不可删去, 也不可减弱为至多在可数个点不连续. 反例: 考虑黎曼函数即可, 它处处取极值, 并且在有理点不连续, 无理点连续.

证明 证法一 (引理 0.2): (反证) 假设 $f(x)$ 不是常值函数, 则存在 $a, b \in I$, 使得 $f(a) \neq f(b)$. 由 f 的连续性及其介值性可知, $f(x)$ 可以取到 $f(a), f(b)$ 中的一切值. 故 $f(x)$ 的值域是不可数集 (区间都是不可数集). 又由条件可知, $f(x)$ 的值域就是由 $f(x)$ 的全体极值构成的. 于是根据引理 0.2 可得, $f(x)$ 的值域是至多可数集. 这与 $f(x)$ 的值域是不可数集矛盾.

证法二 (闭区间套定理): 假设 $f(x)$ 不是常值函数, 则存在 $a_1, b_1 \in I$, 使得 $f(a_1) \neq f(b_1)$. 不妨设 $f(a_1) < f(b_1)$. 因为 f 在 I 上连续, 所以由介值定理可知, 存在 $c_1 \in [a_1, b_1]$, 使得 $f(a_1) < f(c_1) = \frac{f(a_1) + f(b_1)}{2} < f(b_1)$. 若 $b_1 - c_1 \leq \frac{b_1 - a_1}{2}$, 则令 $[a_2, b_2] = [c_1, b_1]$; 若 $c_1 - a_1 \leq \frac{b_1 - a_1}{2}$, 则令 $[a_2, b_2] = [a_1, c_1]$. 无论哪种情况, 都有 $f(a_2) < f(b_2)$.

在 $[a_2, b_2]$ 上重复上述操作, 并依次类推下去, 得到一列闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足

$$[a_n, b_n] \subset [a_{n+1}, b_{n+1}], f(a_n) < f(b_n), \forall n \in \mathbb{N}.$$

由闭区间套定理可知, 存在唯一 $x_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$, 使得 $x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. 再由 f 的连续性以及 Heine 归结原则可知, $f(a_n)$ 严格递增收敛于 $f(x_0)$, $f(b_n)$ 严格递减收敛于 $f(x_0)$. 故 $f(a_n) < f(x_0) < f(b_n), \forall n \in \mathbb{N}$. 因此对 $\forall \delta > 0$, 都存在 $N > 0$, 使得 $|a_N - x_0| < \delta, |b_N - x_0| < \delta$, 并且 $f(a_N) < f(x_0) < f(b_N)$. 从而 $x_0 \in I$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 这与 f 在 I 上处处取极值矛盾.

□

定理 0.2 (Baire 纲定理)

1. 设 $A_n \subset \mathbb{R}$ 是一列没有内点的闭集, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也没有内点.
2. 设 $A_n \subset \mathbb{R}$ 是一列开集并且都在 $\mathbb{R}$ 稠密, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ 也在 $\mathbb{R}$ 中稠密.
3. 设 $A_n \subset \mathbb{R}$ 是一列闭集, 并且 $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也是闭集, 则存在开区间 (a, b) (可以无穷区间) 和正整数 N 使得 $(a, b) \cap A \subset A_N$.
4. 设 A_n 是一列无处稠密集 (闭包没有内点), 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 也没有内点.

♡

证明

1. 用反证法. 设 $x_0 \in A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 为内点, 则存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $[x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0] \subset A$. 因为 A_1 没有内点, 故存在 $x_1 \in (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) - A_1$. 由于 A_1 为闭集, 故存在 $\delta_1 > 0$, 使得

$$[x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1] \subset (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0), \quad [x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1] \cap A_1 = \emptyset$$

不妨设 $\delta_1 < 1$. 因为 A_2 没有内点, 故存在 $x_2 \in (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1) - A_2$. 由于 A_2 为闭集, 故存在 $\delta_2 > 0$, 使得

$$[x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2] \subset (x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1), \quad [x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2] \cap A_2 = \emptyset$$

不妨设 $\delta_2 < \frac{1}{2}$. 如此继续, 我们得到闭区间套

$$[x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1] \supset [x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2] \supset \cdots \supset [x_n - \delta_n, x_n + \delta_n] \supset \cdots,$$

使得 $[x_n - \delta_n, x_n + \delta_n] \cap A_n = \emptyset, \delta_n < \frac{1}{n} (n \geq 1)$. 根据闭区间套原理, 存在 $\xi \in [x_n - \delta_n, x_n + \delta_n], \forall n \geq 1$. 因此 $\xi \notin \bigcup_{n \geq 1} A_n = A$, 这和 $\xi \in [x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1] \subset (x_0 - \delta_0, x_0 + \delta_0) \subset A$ 相矛盾.

2.

3.

4.

□

例题 0.5 设数列 a_n 单调递增趋于正无穷, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$, 函数 $f(x)$ 定义在 $(0, +\infty)$ 中且对任意 $x \geq 1$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n x) = 0$.

1. 若 $f(x)$ 是连续函数, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$;

2. 若删去连续这一条件, 或者虽然连续, 但是 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 则上述结论均不成立.

证明

1. 对 $\forall \varepsilon > 0, n \in \mathbb{N}$, 令

$$E_n = \{x \geq 1 : \forall k \geq n, |f(a_k x)| \leq \varepsilon\},$$

由 f 的连续性知 E_n 是一列闭集, 根据条件有 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = [1, +\infty)$. 于是由 Baire 纲定理知, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 及 $(u, v) \subseteq [1, +\infty)$, 使得 $(u, v) \subseteq E_N$. 即对 $\forall k \geq N, \forall x \in (u, v)$ 有

$$|f(a_k x)| \leq \varepsilon.$$

从而对 $\forall k \geq N, \forall x \in (a_k u, a_k v)$ 有

$$|f(x)| \leq \varepsilon. \quad (1)$$

由 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = 1 < \frac{v}{u}$ 知, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k \geq N_1$ 有

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \frac{v}{u} \iff a_{k+1}u < a_k v. \quad (2)$$

取 $N' = \max\{N, N_1\}$, 则由(2)式知, 对 $\forall k \geq N'$ 有

$$\bigcup_{k=N'}^{\infty} (a_k u, a_k v) = (a_{N'} u, +\infty).$$

进而对 $\forall x \in (a_{N'} u, +\infty) = \bigcup_{k=N'}^{\infty} (a_k u, a_k v)$, 都存在 $n \geq N'$, 使得 $x \in (a_n u, a_n v)$. 再结合(1)式知

$$|f(x)| \leq \varepsilon.$$

此即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. 例如考虑 $a_n = n$, 定义 $f(x)$ 为: 当 $x = m \cdot 2^{\frac{1}{k}}, m \in \mathbb{N}^+$ 时候取 1, 其余情况都取 0, 则对任意的 $x > 0$, 数列 $f(nx)$ 中都至多只有一项为 1, 因此极限总是 0, 但是很明显 $f(x)$ 的极限并不存在. 另外一个反例, 可以考虑 $a_n = e^n$, 现在有连续性, 条件为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(e^n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(e^{n+\ln x}) = 0$$

将 $\ln x \in \mathbb{R}$ 看成一个变量, 相应的考虑 $g(x) = f(e^x)$, 则连续函数 $g(x)$ 定义在 $\mathbb{R}$ 上且满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} g(y+n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(e^{y+n}) = 0, \forall y \in \mathbb{R}$, 我们构造一个例子使得 $g(x)$ 在无穷处极限非零或者不存在即可. 这与经典的命题有关: 设 $f(x)$ 一致连续且 $f(x+n) \rightarrow 0$ 对任意 x 成立, 则 $f(x) \rightarrow 0$, 现在删去了一致连续性命题自然是错的,

具体构造留作习题.

□

注 通常, 点态收敛 (上题) 或者数列极限 (本题) 这种非一致性的条件, 描述起来是 “任意 $x \in (0, 1)$, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得任意 $n > N$ 都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ ” 或者 “任意 $x > 0$, 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得任意 $n > N$ 都有 $|f(a_n x)| < \varepsilon$ ”, 很明显这里的 N 是与 x, ε 都有关系的, 如果我们事先取定 $\varepsilon > 0$, 那么这个过程可以说是 “给定 x , 去找对应的 N ”. 而 baire 纲定理的想法就是反过来找: 不同的 x 对应的 N 确实可以不一样, 那就先取好 N , 我们看都有哪些 x 对应到这一个 N , 也就是说事先取定 $\varepsilon > 0$, 然后对每一个 n 去定义集合, 反找 x . 所有 baire 纲定理相关的问题, 思想都是如此, 根据定理便能得到一个一致的东西, 拿来做事情.

例题 0.6 设 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 中可导, 证明: $f'(x)$ 在 $(0, 1)$ 中的一个稠密子集中连续.

证明

□

命题 0.3

f 在区间 I 上递增, 且有

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{h} = 0, \quad \forall x \in I.$$

证明: f 在 I 上恒为常数.

◆

证明 反证, 假设存在 $a, b \in I$ 且 $a < b$, 使得 $f(a) < f(b)$. 取 $\varepsilon = \frac{f(b) - f(a)}{2(b-a)}$, 由条件知, 对 $\forall x \in (a, b)$, 存在 $h_x > 0$, 当 $0 < h < h_x$ 时, 有

$$\frac{f(x+h_x) - f(x-h_x)}{h_x} < \varepsilon \iff f(x+h_x) - f(x-h_x) < \varepsilon h_x.$$

注意到 $(a, b) \subseteq \bigcup_{x \in (a, b)} (x - h_x, x + h_x)$, 由有限覆盖定理知, 存在 $n \in \mathbb{N}$, 使得

$$(a, b) \subseteq \bigcup_{i=1}^n (x_i - h_{x_i}, x_i + h_{x_i}).$$

不妨设 $a = x_1 < x_2 < \cdots < x_n < b < x_n + h_{x_n} = x_{n+1}$, 且 (a, b) 中任意点不会同时属于三个区间 $(x_k - h_{x_k}, x_k + h_{x_k})$. 容易验证 $(x_i, x_{i+1}) \subseteq (x_i - h_{x_i}, x_i + h_{x_i})$. 于是由 f 的递增性知

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &\leq \sum_{k=1}^{n+1} [f(x_{k+1}) - f(x_k)] \leq \sum_{k=1}^n [f(x_k + h_{x_k}) - f(x_k - h_{x_k})] < \varepsilon \sum_{k=1}^n h_{x_k} \\ &\leq \varepsilon \left[\sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+2} - x_k) + (x_{n+1} - x_n) \right] < 2\varepsilon(b-a) = \frac{f(b) - f(a)}{2}. \end{aligned}$$

显然矛盾! 故 f 在 I 上恒为常数.

□

例题 0.7 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, \infty)$ 上非常数的递增函数, 则存在实数 a 与 $c > 0$, 使得

$$f(a+x) - f(a-x) \geq cx \quad (0 \leq x \leq 1).$$

 **笔记** 也可以用闭区间套定理证明 (对递增的区间进行二分), 可见周民强 P12(例 1.2.13).

注 注意到

$$2\chi_{J(t)} = \sum_{i=1}^n \chi_{(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})}(t), \quad \forall t \in J,$$

于是

$$2|J| = \int_J 2\chi_{J(t)} dt = \sum_{i=1}^n \int_J \chi_{(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})}(t) dt = \sum_{i=1}^n |(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})|.$$

证明 证法一: 当 $x = 0$ 时, 结论显然成立. 只需证明 $x \in (0, 1]$ 的情形. 反证, 假设对 $\forall a > 0, n \in \mathbb{N}$, 都存在 $x_n \in (0, 1]$,

使得

$$f(a+x_n) - f(a-x_n) < \frac{x_n}{n} \implies \frac{f(a+x_n) - f(a-x_n)}{x_n} < \frac{2}{n}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(a+x_n) - f(a-x_n)}{x_n} = 0, \quad \forall a > 0.$$

由命题 0.3 知 f 恒为常数, 这与题设矛盾!

证法二: 设 $r_0 < s_0$ 使得 $f(r_0) < f(s_0)$. 定义

$$c \triangleq \frac{f(s_0) - f(r_0)}{2(s_0 - r_0 + 2)} > 0.$$

若对任何 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $x_a \in (0, 1]$ 使得

$$f(a+x_a) - f(a-x_a) < cx_a.$$

注意到

$$[r_0, s_0] \subseteq \bigcup_{a \in [r_0, s_0]} (a - x_a, a + x_a),$$

由有限覆盖定理得

$$[r_0, s_0] \subseteq J \triangleq \bigcup_{i=1}^n (a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i}).$$

不妨设 n 是实现上述覆盖最小的自然数且 a_i 严格递增, 于是这些区间依次两两相交且不会出现三个同时相交的情况. 显然有

$$|J| = |(a_1 - x_{a_1}, a_n + x_{a_n})| \leq s_0 + 1 - (r_0 - 1) = s_0 - r_0 + 2,$$

从而注意到 J 中任意一个点至多只被上述区间覆盖两次知 (见注)

$$\sum_{i=1}^n 2x_{a_i} = \sum_{i=1}^n |(a_i - x_{a_i}, a_i + x_{a_i})| \leq 2(s_0 - r_0 + 2).$$

现在就有

$$\begin{aligned} f(s_0) - f(r_0) &\leq f(a_n + x_{a_n}) - f(a_1 - x_{a_1}) \\ &\leq \sum_{k=1}^n [f(a_k + x_{a_k}) - f(a_k - x_{a_k})] < c \sum_{k=1}^n x_{a_k} \\ &\leq f(s_0) - f(r_0), \end{aligned}$$

这就是一个矛盾! 于是我们证明了存在 $a \in \mathbb{R}, c > 0$ 使得

$$f(a+x) - f(a-x) \geq cx, \quad \forall x \in [0, 1].$$

□