

集合论

作者: 实空
组织: 无
时间:October 12, 2026
版本:ElegantBook-4.5
全局显示/隐藏证明/解/笔记:**Show/Hide**

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第 1 章 集合与点集 **1**

1.1 集合及其运算 1

1.2 映射 13

1.3 集合的基数 (势) 21

1.4 可列集与不可列集 25

1.5 集类. 环、σ 环、代数、σ 代数、单调类 31

1.6 关系 44

1.7 其他 48

第 1 章 集合与点集

1.1 集合及其运算

定义 1.1 (集合)

具有确定内容或满足一定条件的事物的全体称为**集合** (或**集**), 通常用大写字母如 A, B, C 等表示. 构成一个集合的那些事物称为集合的**元素** (或**元**).

若 a 是集合 A 的元素, 则称 a **属于** A, 记为 $a \in A$; 若 a 不是集合 A 的元素, 则称 a **不属于** A, 记为 $a \notin A$. 对于给定的集合, 任一元素要么属于它, 要么不属于它, 二者必居其一.

不含任何元素的集合称为**空集**, 记为 $\varnothing$.

我们用 $\mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 分别表示整数集、自然数集 (不包含 0)、有理数集和实数集. 特别地, 我们用 $\mathbb{N}_0$ 表示 $\mathbb{N} \cup 0$. ♣

注 集合的表示方法:

(1) 列举法——列出给定集合的全部元素. 例如

$$A = \{a, b, c\}, \quad B = \{1, 3, \cdots, 2n-1\}.$$

(2) 描述法——$A = \{x : x \text{ 具有性质} P\}$. 例如

$$\ker f = \{x : f(x) = 0\} = \{x \mid f(x) = 0\}.$$

定义 1.2

若集合 A 和 B 具有完全相同的元素, 则称 A 与 B **相等**, 记为 $A = B$.

若 A 中的每个元素都是 B 的元素, 则称 A 为 B 的**子集**, 记为 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$.

若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 为 B 的**真子集**, 记为 $A \subset B$.

集合 A 的所有子集的全体, 称为 A 的**幂集**, 记为 2^A 或 $\mathcal{P}(A)$. ♣

注 $A = B \Longleftrightarrow A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$.

由 n 个元素形成的集合 E 的幂集 $\mathcal{P}(E)$ 共有 2^n 个元素.

定义 1.3

设 $\forall \alpha \in \Gamma, A_\alpha$ 都是集合, 则 $\{A_\alpha : \alpha \in \Gamma\} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 称为**集族**或集合族, 称 Γ 为**指标集**,α 为**指标**. 特别地, 当 $\Gamma = \mathbb{N}$ 时, 集族称为**集列**或**集合列**, 记为 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 或 $\{A_n\}$. ♣

定义 1.4

设有集合族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in I}$, 我们定义其并集与交集如下:

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \exists \alpha \in I, \text{ s.t. } x \in A_\alpha\},$$

$$\bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \{x : \forall \alpha \in I, x \in A_\alpha\}.$$

设 A, B 为两个集合, 若 $A \cap B = \varnothing$, 则称 A 与 B **互不相交**. ♣

定义 1.5

设 A, B 是两个集合, 称 $\{x : x \in A, x \notin B\}$ 为 A 与 B 的**差集**, 记作 $A - B$ 或 $A \setminus B$.

在上述定义中, 当 $B \subset A$ 时, 称 $A \setminus B$ 为集合 B 相对于集合 A 的**补集**或**余集**.

通常, 在我们讨论问题的范围内, 所涉及的集合总是某个给定的“大”集合 X 的子集, 我们称 X 为**全集**. 此

时, 集合 B 相对于全集 X 的补集就简称为 B 的**补集**或**余集**, 并记为 B^c 或 $\complement B$, 即

$$B^c = X \setminus B.$$

今后, 凡没有明显标出全集 X 时, 都表示取补集运算的全集 X 预先已知, 而所讨论的一切集合皆为其子集. 于是 B^c 也记为

$$B^c = \{x \in X : x \notin B\}.$$

♣

定义 1.6 (笛卡尔积/直积集)

设 $n \in \mathbb{N}, \{A_i\}_{i=1}^n$ 为集族, 称

$$\{(x_1, \cdots, x_n) : x_i \in A_i, i = 1, \cdots, n\}$$

为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 的**笛卡尔积**, 记为 $A_1 \times \cdots \times A_n$.

若 $(x_1, \cdots, x_n), (x_1', \cdots, x_n') \in A_1 \times \cdots \times A_n$, 则 $(x_1, \cdots, x_n) = (x_1', \cdots, x_n')$ 当且仅当 $x_i = x_i', i = 1, 2, \cdots, n$.

特别地, 记 $\underbrace{A_1 \times \cdots \times A_1}_{n个} = A_1^n$.

♣

定理 1.1 (集合的运算及性质)

设 A, B, E 为全集 X 中的子集,$\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 为一集族, 则

(1) **广义交换律和结合律**: 当一个集合族被分解 (以任何方式) 为许多子集合族时, 那么先作子集合族中各集合的并集, 然后再作各并集的并集, 仍然得到原集合族的并, 而且作并集时与原有的顺序无关. 当然, 对于交的运算也是如此.

(2) $A \cup A = A, A \cap A = A$.

(3) $A \cup \varnothing = A, A \cap \varnothing = \varnothing$.

(4) $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$.

(5) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

(6) $A \cup A^c = X, A \cap A^c = \varnothing$,
$A \cap (\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha) = \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} (A \cap B_\alpha), \quad A \cup (\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha) = \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} (A \cup B_\alpha)$.

(7) $X^c = \varnothing, \varnothing^c = X$.

(8) $A \setminus B = A \cap B^c$.

(9) 若 $A \supseteq B$, 则 $A^c \subseteq B^c$; 若 $A \cap B = \varnothing$, 则 $A \subseteq B^c$.

(10) $A \setminus B^c = B \setminus A^c$.

(11) $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} (A_\alpha \setminus B_\alpha)$.

(12) $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} (A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \cap \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha$.

(13) $B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \Leftrightarrow B^c = E$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) $x \in A \setminus B^c \Longleftrightarrow x \in A$且$x \notin B^c \Longleftrightarrow x \in A$且$x \in B \Longleftrightarrow x \in B$且$x \notin A^c \Longleftrightarrow x \in B \setminus A^c$.

(11) 对 $\forall x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha$, 存在 $\alpha_x \in \Gamma$, 使 $x \in A_{\alpha_x}$, 并且 $x \notin B_\alpha, \forall \alpha \in \Gamma$. 从而 $x \in A_{\alpha_x} \setminus B_{\alpha_x} \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}(A_\alpha \setminus B_\alpha)$. 故 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \setminus \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}(A_\alpha \setminus B_\alpha)$.

(12) 对 $\forall x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}(A_\alpha \cap B_\alpha)$, 都存在 $\alpha_x \in \Gamma$, 使得 $x \in A_{\alpha_x} \cap B_{\alpha_x}$. 于是 $x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$ 且 $x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha$, 即 $x \in \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \cap \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha$. 故 $\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma}(A_\alpha \cap B_\alpha) \subseteq \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha \cap \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} B_\alpha$.

(13) 证法一:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= E^c \cup (A^c \cap A) = E^c \cup \varnothing = E^c \\ &\Longleftrightarrow B^c = E. \end{aligned}$$

证法二:显然 $B = (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) \Longleftrightarrow B^c = ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c$, 故

$$\begin{aligned} B^c &= ((E \cap A)^c \cap (E^c \cup A))^c \\ &= (E \cap A) \cup (E^c \cup A)^c = (E \cap A) \cup (E \cap A^c) \\ &= E \cap (A \cup A^c) = E \cap X = E. \end{aligned}$$

证法三:

$$\begin{aligned} B &= (E \cap A)^c \cap (E^c \cup A) = (E^c \cup A^c) \cap (E^c \cup A) \\ &= (E^c \cap E^c) \cup (A^c \cap E^c) \cup (A^c \cap A) \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c \cup \varnothing \cup (E^c \cap A) \\ &= E^c \cup (A \cup E)^c = (E \cap (A \cup E))^c = E^c \\ &\Longleftrightarrow B^c = E. \end{aligned}$$

□

定理 1.2 (De Morgan 定律)

设 $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\Gamma}$ 为一集族, 则

(i) $(\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c = \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$; (ii) $(\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c = \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x \in (\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c$, 则 $x \notin \bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha$, 故对 $\forall \alpha \in \Gamma, x \notin A_\alpha$, 即 $\forall \alpha \in \Gamma, x \in A_\alpha^c$. 从而 $x \in \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$, 因此,$(\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c \subset \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$. 上述推理反过来也成立, 故 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c \subset (\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c$. 因此,$(\bigcup\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha)^c = \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} A_\alpha^c$.

(ii) 类似可证.

□

定义 1.7 (对称差集)

设 A, B 为两个集合, 称集合 $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$ 为 A 与 B 的**对称差集**, 记为 $A \triangle B$.

♣

笔记 Show/Hide Note

对称差集是由既属于 A, B 之一但又不同时属于两者的一切元素构成的集合.

定理 1.3 (集合对称差的性质)

(1) $A\triangle B=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$.

(2) 交换律:$A\triangle\varnothing=A, A\triangle A=\varnothing, A\triangle A^c=X, A\triangle X=A^c$.

(3) 结合律:$A\triangle B=B\triangle A$.

(4) 交与对称差满足分配律:$(A\triangle B)\triangle C=A\triangle(B\triangle C)$.

(5) $A\cap(B\triangle C)=(A\cap B)\triangle(A\cap C)$.

(6) $A^c\triangle B^c=A\triangle B; A=A\triangle B$ 当且仅当 $B=\varnothing$.

(7) 对任意的集合 A 与 B, 存在唯一的集合 E, 使得 $E\triangle A=B$(实际上 $E=B\triangle A$).

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由对称差集的定义及定理 1.1(6)可得

$$\begin{aligned}A\bigtriangleup B&=(A\cap B^c)\cup(B\cap A^c)=\left[(A\cap B^c)\cup B\right]\cap\left[(A\cap B^c)\cup A^c\right]\\&=(A\cup B)\cap(A^c\cap B^c)=(A\cup B)\cap(A\cap B)^c\\&=(A\cup B)\setminus(A\cap B).\end{aligned}$$

(2) 证明是显然的.

(3) 证明是显然的.

(4) $x\in A\backslash B\triangle C\Leftrightarrow x\in A; x\notin B\triangle C=(B\backslash C)\cup(C\backslash B)\Leftrightarrow x\in A; x\in B\cap C$, 或$x\notin B$且$x\notin C\Leftrightarrow x\in A\backslash B\backslash C$或$x\in A\cap B\cap C\Leftrightarrow x\in(A\backslash B\backslash C)\cup(A\cap B\cap C)$, 即

$$A\backslash B\triangle C=(A\backslash B\backslash C)\cup(A\cap B\cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}A\triangle(B\triangle C)&=(A\backslash B\triangle C)\cup(B\triangle C\backslash A)\\&=(A\backslash B\backslash C)\cup(A\cap B\cap C)\cup(B\backslash C\backslash A)\cup(C\backslash B\backslash A)\\&=(A\backslash B\backslash C)\cup(B\backslash A\backslash C)\cup(C\backslash A\backslash B)\cup(A\cap B\cap C)\\&=((A\backslash B)\cup(B\backslash A)\backslash C)\cup(C\backslash A\triangle B)\\&=(A\triangle B\backslash C)\cup(C\backslash A\triangle B)\\&=(A\triangle B)\triangle C.\end{aligned}$$

即

$$A\triangle(B\triangle C)=(A\triangle B)\triangle C.$$

(5) $x\in A\cap(B\backslash C)\Leftrightarrow x\in A$且$x\in B\backslash C\Leftrightarrow x\in A$且$x\in B, x\notin C\Leftrightarrow x\in A\cap B$且$x\notin A\cap C\Leftrightarrow x\in(A\cap B)\backslash(A\cap C)$, 即

$$A\cap(B\backslash C)=(A\cap B)\backslash(A\cap C).$$

于是

$$\begin{aligned}A\cap(B\triangle C)&=A\cap((B\backslash C)\cup(C\backslash B))\\&=(A\cap(B\backslash C))\cup(A\cap(C\backslash B))\\&=(A\cap B\backslash A\cap C)\cup(A\cap C\backslash A\cap B)\\&=(A\cap B)\triangle(A\cap C).\end{aligned}$$

(6) $x\in A^c\backslash B^c\Leftrightarrow x\in A^c, x\notin B^c\Leftrightarrow x\notin A, x\in B\Leftrightarrow x\in B\backslash A$, 即

$$A^c\backslash B^c=B\backslash A.$$

于是

$$A^c\triangle B^c=(A^c\backslash B^c)\cup(B^c\backslash A^c)=(B\backslash A)\cup(A\backslash B)=(A\backslash B)\cup(B\backslash A)=A\triangle B.$$

(7) 若 $E\triangle A=B$, 则

$$E=E\triangle\varnothing=E\triangle(A\triangle A)=(E\triangle A)\triangle A=B\triangle A.$$

反之, 令 $E=B\triangle A$, 则

$$E\triangle A=(B\triangle A)\triangle A=B\triangle(A\triangle A)=B\triangle\varnothing=B.$$

所以, $\exists E$, s.t. $E\triangle A=B$.

□

定义 1.8 (递增、递减集合列)

设 $\{A_k\}$ 是一个集合列. 若

$$A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots\supseteq A_k\supseteq\cdots,$$

则称此集合列为**递减集合列**, 此时称其交集 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_k$ 为集合列 $\{A_k\}$ 的极限集, 记为 $\lim\limits_{k\to\infty}A_k$; 若 $\{A_k\}$ 满足

$$A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots\subseteq A_k\subseteq\cdots,$$

则称 $\{A_k\}$ 为**递增集合列**, 此时称其并集 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_k$ 为 $\{A_k\}$ 的极限集, 记为 $\lim\limits_{k\to\infty}A_k$.

♣

命题 1.1

设 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\}(n=1,2,\cdots)$ 为两个集列.

(1) 当 $\{A_n\}$ 为递减集合列时, $\lim\limits_{k\to\infty}A_n=\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n(\forall N\in\mathbb{N})$.

当 $\{A_n\}$ 为递增集合列时, $\lim\limits_{k\to\infty}A_n=\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n(\forall N\in\mathbb{N})$.

(2) 令 $B_1=A_1, B_n=A_n\setminus\bigcup\limits_{i=1}^{n-1}A_i(n\geqslant 2)$. 证明:$\{B_n\}(n=1,2,\cdots)$ 为一个彼此不相交的集列, 并且

$$\bigcup_{i=1}^{n}A_i=\bigcup_{i=1}^{n}B_i,\quad n=1,2,\cdots;$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i.$$

(3) 如果 $\{A_n\}(n=1,2,\cdots)$ 为单调减 (即 $A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots\supseteq A_n\supseteq\cdots$) 的集列, 证明:

$$A_1=(A_1-A_2)\cup(A_2-A_3)\cup\cdots(A_n-A_{n+1})\cup\cdots\cup\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}A_i\right).$$

并且其中各项互不相交.

(4) 证明: $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(A_n\cap B_n)\subseteq\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n\right)\cap\left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}B_n\right)$. 反之并不成立, 并举例说明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n\cap B_n)\not\supseteq\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right).$$

特别地, 如果 $\{A_n\}$ 和 $\{B_n\}(n=1,2,\cdots)$ 都是单调增的集列, 证明:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n\cap B_n)=\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n\right)\cap\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right).$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题 (2) 给出了一种构造互不相交集列 (不改变其并集) 的方法.

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 一方面, 由 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcap\limits_{k=1}^{N-1}A_n\cap\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n$ 可知 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_n\subset\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n$. 另一方面, 由 $\{A_n\}$ 为递减集合列可得

$$A_1\supseteq A_2\supseteq\cdots\supseteq A_{N-1}\supseteq A_n,\forall k=N,N+1,\cdots.$$

因此 $\bigcap\limits_{k=1}^{N-1}A_n\supseteq\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n$, 故再根据 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcap\limits_{k=1}^{N-1}A_n\cap\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n$ 可知 $\bigcap\limits_{k=1}^{\infty}A_n\supseteq\bigcap\limits_{k=N}^{\infty}A_n$.

对 $\forall N\in\mathbb{N}$, 一方面, 由 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcup\limits_{k=1}^{N-1}A_n\cup\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n$ 可知 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_n\supseteq\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n$. 另一方面, 由 $\{A_n\}$ 为递增集合列可得

$$A_1\subseteq A_2\subseteq\cdots\subseteq A_{N-1}\subseteq A_N.$$

因此 $\bigcup\limits_{k=1}^{N-1}A_n\subseteq A_N\subseteq\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n$, 故再根据 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_n=\bigcup\limits_{k=1}^{N-1}A_n\cup\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n$ 可知 $\bigcup\limits_{k=1}^{\infty}A_n\subseteq\bigcup\limits_{k=N}^{\infty}A_n$.

(2) 证法一: 显然, $B_i=A_i\setminus\bigcup\limits_{j=1}^{i-1}A_j\subseteq A_i$, 故 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$.

反之, 若 $x\in\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i$, ①$x\in A_1$, 则 $x\in A_1=B_1\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i$; ②$x\notin A_i, i=1,2,\cdots,m, x\in A_{m+1}$, 则 $x\in A_{m+1}\setminus\bigcup\limits_{i=1}^{m}A_i=B_{m+1}\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i$. 因此, $\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i$. 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^{n}A_i=\bigcup_{i=1}^{n}B_i.$$

易见, 由 $B_i=A_i\setminus\bigcup\limits_{j=1}^{i-1}A_j\subseteq A_i$ 知 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$.

反之, 若 $x\in\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i$, ①$x\in A_1$, 则 $x\in A_1=B_1\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$; ②$x\notin A_i, i=1,2,\cdots,m, x\in A_{m+1}$, 则 $x\in A_{m+1}\setminus\bigcup\limits_{i=1}^{m}A_i=B_{m+1}\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$. 因此, $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i\subseteq\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$. 综上得到

$$\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i=\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i.$$

证法二 (归纳法):当 $n=1$ 时, 有

$$\bigcup_{i=1}^{1}A_i=A_1=B_1=\bigcup_{i=1}^{1}B_i.$$

假设 $n=k$ 时, 有 $\bigcup\limits_{i=1}^{k}A_i=\bigcup\limits_{i=1}^{k}B_i$, 则

$$\bigcup_{i=1}^{k+1}B_i=B_{k+1}\cup\left(\bigcup_{i=1}^{k}B_i\right)=\left(A_{k+1}\setminus\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)\cup\left(\bigcup_{i=1}^{k}A_i\right)=\bigcup_{i=1}^{k+1}A_i.$$

因此, 对 $\forall n\in\mathbb{N}$, 有 $\bigcup\limits_{i=1}^{n}A_i=\bigcup\limits_{i=1}^{n}B_i$.

再证 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}A_i=\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$. 事实上, 由

$$A_i\subseteq\bigcup_{j=1}^{i}A_j=\bigcup_{j=1}^{i}B_j\subseteq\bigcup_{j=1}^{\infty}B_j=\bigcup_{i=1}^{\infty}B_i,$$

故 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i$. 同理, $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i$. (或者由 $B_i = A_i \setminus \bigcup\limits_{j=1}^{i} A_j \subseteq A_i$ 推得上式). 于是

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i.$$

(3) 因为 $A_1 \setminus A_2 \subseteq A_1, A_2 \setminus A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1, \cdots, A_n \setminus A_{n+1} \subseteq A_n \subseteq A_{n-1} \subseteq \cdots \subseteq A_1, \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq A_1$, 所以

$$(A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \subseteq A_1.$$

反之, 对 $\forall x \in A_1$, 有两种情形:

①$x \in \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i$;

②$x \notin \bigcap\limits_{i=1}^{\infty} A_i$, 则存在 $i_0 \in \mathbb{N}$, 使 $x \notin A_{i_0}$, 且 $x \in A_i, i = 1, 2, \cdots, i_0 - 1$, 则 $x \in A_{i_0-1} \setminus A_{i_0}$. 于是

$$x \in (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right),$$

$$A_1 \subseteq (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

综合上述得到

$$A_1 = (A_1 \setminus A_2) \cup (A_2 \setminus A_3) \cup \cdots \cup (A_n \setminus A_{n+1}) \cup \cdots \cup \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right).$$

(4) 因为 $A_n \cap B_n \subseteq A_n \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} A_i$; $A_n \cap B_n \subseteq B_n \subseteq \bigcup\limits_{i=1}^{\infty} B_i$, 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n) \subseteq \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right). \tag{1.1}$$

反之, 设 $A_n = \{n\}, n \in \mathbb{N}$; $B_1 = \varnothing$, $B_n = \{n-1\}, n = 2, 3, \cdots$. 则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \varnothing = \varnothing \not\supseteq \mathbb{N} = \mathbb{N} \cap \mathbb{N} = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right).$$

特别地, 由(1.1)式知

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n) \subseteq \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right).$$

另一方面, 对 $\forall x \in \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n\right)$, 即 $x \in \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} A_n$, 且 $x \in \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} B_n$. 则必有 $x \in A_{n_1}, x \in B_{n_2}$, 不妨设 $n_1 \leqslant n_2$. 又因 $\{A_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为递增集列, 故

$$x \in A_{n_1} \subseteq A_{n_2},$$

于是

$$x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n),$$

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n).$$

综合上述, 有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(A_n \cap B_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right).$$

□

定义 1.9 (上、下极限集)

设 $\{A_k\}$ 是一集合列, 令

$$B_j = \bigcup_{k=j}^{\infty} A_k \quad (j = 1, 2, \cdots),$$

显然有 $B_j \supset B_{j+1} (j = 1, 2, \cdots)$. 我们称

$$\lim_{k\to\infty} B_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} B_j = \bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} A_k$$

为集合列 $\{A_k\}$ 的**上极限集**, 简称为**上限集**, 记为

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} A_k.$$

类似地, 称集合 $\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=j}^{\infty} A_k$ 为集合列 $\{A_k\}$ 的**下极限集**, 简称为**下限集**, 记为

$$\underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=j}^{\infty} A_k.$$

若上、下限集相等, 则说 $\{A_k\}$ 的极限集存在并等于上限集或下限集, 记为 $\lim\limits_{k\to\infty} A_k$.

♣

命题 1.2

设 $\{A_k\}$ 是一个集合列, 我们有

1. 若 $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \cdots \supseteq A_k \supseteq \cdots$, 则

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} A_k = \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k.$$

2. 若 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_k \subseteq \cdots$, 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} A_k = \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

1. 由于 $\{A_k\}$ 为递减集合列, 故

$$\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1可知

$$\lim_{k\to\infty} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} A_k.$$

$$\underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j\to\infty} A_j.$$

2. 由于 $\{A_k\}$ 为递增集合列, 故

$$\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = A_k, \forall k \in \mathbb{N}.$$

又由命题 1.1可知

$$\lim_{k\to\infty} A_k = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j, \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \lim_{j\to\infty} A_j.$$

$$\underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{j=k}^{\infty} A_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \lim_{k\to\infty} A_k.$$

□

命题 1.3 (上、下极限集的性质)

设 $\{A_k\}$ 是一集合列,E 是一个集合则

$$\text{(i)} E \setminus \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \underline{\lim_{k\to\infty}} (E \setminus A_k); \quad \text{(ii)} E \setminus \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \overline{\lim_{k\to\infty}} (E \setminus A_k).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

□

定理 1.4

若 $\{A_k\}$ 为一集合列, 则

$$\text{(i)} \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcap_{j=1}^{\infty}\bigcup_{k=j}^{\infty} A_k = \{x : x \text{ 属于无穷多个} A_k\} = \{x : \forall j \in \mathbb{N}, \exists k \geqslant j \text{且} k \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x \in A_k\}$$

$$\text{(ii)} \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \{x : \text{除有限个} A_k \text{ 外, 都含有} x\} = \{x : \exists j_0 \in \mathbb{N}, \forall k \geqslant j_0 \text{且} k \in \mathbb{N}, x \in A_k\}$$

并且我们有

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} A_k \supseteq \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(i) 设 $x \in \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k = \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$, 则对 $n = 1$, 有 $x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, 故 $\exists n_1 \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in A_{n_1}$; 对 $n = n_1 + 1$, 有 $x \in \bigcup_{k=n_1+1}^{\infty} A_k$, 故 $\exists n_2 > n_1$, 使得 $x \in A_{n_2}$; 以此类推, 得到一列 $\{n_k\}$ 满足 $n_1 < n_2 < \cdots$, 且 $x \in A_{n_k}, \forall k$. 因此 x 属于无穷多个 A_n.

反之, 若 x 属于无穷多个 A_n, 不妨设 $x \in A_{n_k}, k = 1, 2, \cdots$, 且 $n_1 < n_2 < \cdots$, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都存在 $n_k > n$. 从而 $x \in A_{n_k} \subset \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. 因此 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \overline{\lim_{k\to\infty}} A_k$.

(ii) 若 $x \in \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k$, 则存在自然数 j_0, 使得

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k,$$

从而当 $k \geqslant j_0$ 时, 有 $x \in A_k$. 自然除了 $A_1, \cdots, A_{j_0-1}$ 这有限个集合外, 其他 $A_k (k \geqslant j_0)$ 都含有 x.

反之, 若除有限个 A_k 外, 都含有 x, 则存在自然数 j_0, 当 $k \geqslant j_0$ 时, 有 $x \in A_k$, 从而得到

$$x \in \bigcap_{k=j_0}^{\infty} A_k.$$

由此可知 $x \in \bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcap_{k=j}^{\infty} A_k = \underline{\lim}_{k\to\infty} A_k$.

由 (i)(ii) 可知,$\{A_k\}$ 的上限集是由属于 $\{A_k\}$ 中无穷多个集合的元素所形成的;$\{A_k\}$ 的下限集是由只不属于 $\{A_k\}$ 中有限多个集合的元素所形成的. 从而立即可知

$$\overline{\lim_{k\to\infty}} A_k \supseteq \underline{\lim_{k\to\infty}} A_k.$$

□

例题 1.1 设 $A_{2k-1} = \left(0, \frac{1}{k}\right), A_{2k} = (0, k), k = 1, 2, \cdots$, 求 $\overline{\lim}_{n\to+\infty} A_n$ 和 $\underline{\lim}_{n\to+\infty} A_n$.

解 Show/Hide Solution

解法一: 由定理 1.4可得

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} A_n = \{x \mid \exists\text{无穷个 } n, \text{s. t. } x \in A_n\} = (0, +\infty).$$

$$\underline{\lim_{n\to+\infty}} A_n = \{x \mid \text{只有有限个 } n, \text{s. t. } x \notin A_n\} = \varnothing.$$

解法二: 根据上、下限集的定义知

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcap_{k=1}^{\infty}(0, +\infty) = (0, +\infty).$$

$$\underline{\lim_{n\to+\infty}} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty}\bigcap_{n=k}^{\infty} A_n = \bigcup_{k=1}^{\infty}\varnothing = \varnothing.$$

□

例题 1.2 设 $A_{2n+1} = [0, 2 - 1/(2n+1)], n = 0, 1, 2, \cdots, A_{2n} = [0, 1 + \frac{1}{2}n], n = 1, 2, \cdots$, 求 $\liminf_{n\to\infty} A_n$ 与 $\limsup_{n\to\infty} A_n$.

解 Show/Hide Solution

注意到

$$[0, 1] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \liminf_{n\to\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to\infty} A_n \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq [0, 2)$$

故只需考察 $(1, 2)$ 中的点. 对 $\forall x \in (1, 2)$, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}$(与 x 有关), 使得

$$1 + \frac{1}{2n} < x < 2 - \frac{1}{2n+1}, \quad \forall n \geqslant n_0$$

即当 $n \geqslant n_0$ 时, 有 $x \notin A_{2n}, x \in A_{2n+1}$. 这说明: (i) x 不能“除有限个 A_n 外, 都含有 x”, 即 $x \notin \liminf_{n\to\infty} A_n$; (ii) “$x$ 属于无穷多个 A_n”, 故 $x \in \limsup_{n\to\infty} A_n$. 因此, $\liminf_{n\to\infty} A_n = [0, 1], \limsup_{n\to\infty} A_n = [0, 2)$.

□

命题 1.4

设 $f(x)$ 为 E 上的一个实函数,c 为任何实数,

$$E(f > c) = \{x \in E \mid f(x) > c\}, \quad E(f \leqslant c) = \{x \in E \mid f(x) \leqslant c\}$$

等. 证明:

(1) $E(f > c) \cup E(f \leqslant c) = E$.

(2) $E(f \geqslant c) = E(f > c) \cup E(f = c)$.

(3) 当 $c \leqslant d$ 时,$E(f > c) \cap E(f \leqslant d) = E(c < f \leqslant d)$.

(4) 当 $c \geqslant 0$ 时,$E(f^2 > c) = E(f > \sqrt{c}) \cup E(f < -\sqrt{c})$.

(5) 当 $f \geqslant g$ 时,$E(f > c) \supseteq E(g > c)$.

(6) $E(f \geqslant c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E(c \leqslant f < c + n)$.

(7) $E(f < c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E\left(f \leqslant c - \frac{1}{n}\right)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

$$\begin{aligned} E(f>c)\cup E(f\leqslant c) &= \{x\in E\mid f(x)>c\}\cup\{x\in E\mid f(x)\leqslant c\} \\ &= \{x\in E\mid f(x)>c \text{ 或} f(x)\leqslant c\} = E. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E(f>c)\cup E(f=c) &= \{x\in E\mid f(x)>c\}\cup\{x\in E\mid f(x)=c\} \\ &= \{x\in E\mid f(x)>c \text{ 或} f(x)=c\} = \{x\in E\mid f(x)\geqslant c\} = E(f\geqslant c). \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned} E(f>c)\cap E(f\leqslant d) &= \{x\in E\mid f(x)>c\}\cap\{x\in E\mid f(x)\leqslant d\} \\ &= \{x\in E\mid f(x)>c \text{ 且} f(x)\leqslant d\} = \{x\in E\mid c<f(x)\leqslant d\} \\ &= E(c<f\leqslant d). \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} E(f>\sqrt{c})\cup E(f<-\sqrt{c}) &= \{x\in E\mid f(x)>\sqrt{c}\}\cup\{x\in E\mid f(x)<-\sqrt{c}\} \\ &= \{x\in E\mid f(x)>\sqrt{c} \text{ 或} f(x)<-\sqrt{c}\} = \{x\in E\mid f^2(x)>c\} \\ &= E(f^2>c). \end{aligned}$$

(5) $x\in E(g>c)\Leftrightarrow x\in E$, 且$g(x)>c\Rightarrow x\in E$, 且$f(x)\geqslant g(x)>c\Leftrightarrow x\in E(f>c)$. 等价于

$$E(f>c)\supseteq E(g>c).$$

(6) 显然,$E(c\leqslant f<c+n)\subseteq E(f\geqslant c)$, 故

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}E(c\leqslant f<c+n)\subseteq E(f\geqslant c).$$

另一方面, 对 $\forall x\in E(f\geqslant c)$, 即 $f(x)\geqslant c$. 则必有充分大的 $n_0\in\mathbb{N}$, 使得 $c\leqslant f(x)<c+n_0$, 故 $x\in E(c\leqslant f<c+n_0)$. 于是

$$x\in E(c\leqslant f<c+n_0)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E(c\leqslant f<c+n).$$

这就得到

$$E(f\geqslant c)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E(c\leqslant f<c+n).$$

综合上述, 有

$$E(f\geqslant c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}E(c\leqslant f<c+n).$$

(7) 因为 $f(x)\leqslant c-\dfrac{1}{n}\Rightarrow f(x)\leqslant c-\dfrac{1}{n}<c$, 故

$$E\left(f\leqslant c-\frac{1}{n}\right)\subseteq E(f<c),$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}E\left(f\leqslant c-\frac{1}{n}\right)\subseteq E(f<c).$$

另一方面, 对 $\forall x\in E(f<c)$, 即 $x\in E$ 且 $f(x)<c$. 则必有 $n_0\in\mathbb{N}$, s. t. $f(x)\leqslant c-\dfrac{1}{n_0}$. 即 $x\in E\left(f\leqslant c-\dfrac{1}{n_0}\right)$. 从而

$$x\in\bigcup_{n=1}^{\infty}E\left(f\leqslant c-\frac{1}{n}\right),\quad E(f<c)\subseteq\bigcup_{n=1}^{\infty}E\left(f\leqslant c-\frac{1}{n}\right).$$

综合上述, 有

$$E(f<c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}E\left(f\leqslant c-\frac{1}{n}\right).$$

□

命题 1.5

设 $\{f_n\}(n=1,2,\cdots)$ 为 E 上的实函数列, 且关于 n 单调增, 即

$$f_1(x)\leqslant f_2(x)\leqslant\cdots\leqslant f_n(x)\leqslant f_{n+1}(x)\leqslant\cdots,\quad \forall x\in E,$$

并且 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=f(x)$. 证明: 对任何实数 c, 有

(1) $E(f>c)=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n>c)=\lim\limits_{n\to+\infty}E(f_n>c)$.

(2) $E(f\leqslant c)=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c)=\lim\limits_{n\to+\infty}E(f_n\leqslant c)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 证法一: 设 $x\in E(f>c)$, 则 $\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)=f(x)>c$. 于是,$\exists N\in\mathbb{N}$,s.t. 当 $n_0>N$ 时, 有 $f_{n_0}(x)>c$. 从而,$x\in E(f_{n_0}>c)\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n>c)$,$E(f>c)\subseteq\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n>c)$.

反之, 如果 $x\in\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n>c)$, 则 $\exists n_0\in\mathbb{N}$,s.t.$x\in E(f_{n_0}>c)$. 由于 f_n 关于 n 单调增, 故有 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)\geqslant f_{n_0}(x)>c$,$x\in E(f>c)$. 从而,$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n>c)\subseteq E(f>c)$.

综合上述, 有

$$E(f>c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}E(f_n>c).$$

因为 f_n 单调增, 故 $E(f_n>c)\subseteq E(f_{n+1}>c)$, 从而

$$\lim_{n\to+\infty}E(f_n>c)=\bigcup_{n=1}^{\infty}E(f_n>c).$$

证法二: 如果命题 1.5(2)不是利用命题 1.5(1)的结论证得, 则

$$E(f>c)=E\setminus E(f\leqslant c)\xlongequal{\text{命题 1.5(2)}}E\setminus\bigcap_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c)\xlongequal{\text{De Morgan 公式}}\bigcup_{n=1}^{\infty}(E\setminus E(f_n\leqslant c))=\bigcup_{n=1}^{\infty}E(f_n>c).$$

(2) 证法一: 因为 f_n 关于 n 单调增, 故 $f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)\geqslant f_n(x)$, 从而

$$E(f\leqslant c)\subseteq E(f_n\leqslant c),\quad n=1,2,\cdots,$$

$$E(f\leqslant c)\subseteq\bigcap_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c).$$

另一方面, 如果 $x\in\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c)$, 则 $x\in E(f_n\leqslant c),\forall n\in\mathbb{N}$, 即 $f_n(x)\leqslant c,\forall n\in\mathbb{N}$. 于是,$f(x)=\lim\limits_{n\to+\infty}f_n(x)\leqslant c$,$x\in E(f\leqslant c)$,$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c)\subseteq E(f\leqslant c)$.

综合上述, 有

$$E(f\leqslant c)=\bigcap_{n=1}^{\infty}E(f_n\leqslant c).$$

由于 f_n 关于 n 单调增, 故 $E(f_n \leqslant c)$ 关于 n 单调减, 从而

$$\lim_{n\to+\infty} E(f_n \leqslant c) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leqslant c).$$

证法二: 如果命题 1.5(1)不是利用命题 1.5(2)的结论证得, 则

$$E(f \leqslant c) = E \setminus E(f > c) \xlongequal{\text{命题 1.5(1)}} E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E(f_n > c) \xlongequal{\text{De Morgan 公式}} \bigcap_{n=1}^{\infty} (E \setminus E(f_n > c)) = \bigcap_{n=1}^{\infty} E(f_n \leqslant c).$$

□

例题 1.3 设 $\{f_i(x)\}(i = 1, 2, \cdots)$ 为定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实函数列, 试用点集

$$\left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geqslant \frac{1}{j}\right\}, \quad i, j = 1, 2, \cdots$$

表示点集 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim_{i\to+\infty}} f_i(x) > 0\}$.

解 Show/Hide Solution

$$\begin{aligned}\{x \in \mathbb{R}^n \mid \overline{\lim_{i\to+\infty}} f_i(x) > 0\} &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{存在无穷个 } i, \text{使 } f_i(x) \geqslant \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \overline{\lim_{i\to+\infty}} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geqslant \frac{1}{j}\right\} \\ &= \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{i=N}^{\infty} \left\{x \in \mathbb{R}^n \mid f_i(x) \geqslant \frac{1}{j}\right\}.\end{aligned}$$

□

1.2 映射

定义 1.10 (映射)

设 A, B 为非空集, 若存在对应法则 f, 使得对每个 $x \in A$ 都有唯一确定的 $y \in B$ 与之对应, 则称对应法则 f 为从 A 到 B 的映射. 记为 $f : A \to B$, 其表达形式为 $y = f(x), x \in A$.

A 称为 f 的**定义域**, 记为 $D(f)$.B 称为 f 的**陪域**. A 在 f 下的象称为 f 的**值域**, 记为 $R(f)$, 即

$$R(f) = f(A) = \{f(x) : x \in A\}$$

集合 $B_0 \subseteq B$ 在 f 下的**原象**, 记为 $f^{-1}(B_0)$, 即

$$f^{-1}(B_0) = \{x \in A : f(x) \in B_0\}$$

♣

注 关于映射的定义, 我们作以下几点说明:

(1) f 的一个像可以存在多个原像; 但对每一个 $x \in A$, 只能有唯一的 $y \in B$ 与它对应, 因此今后如果构造映射 $f : A \to B$, 就必须先验证其良定义性, 即 $\forall x_1 = x_2 \in A$, 则 $f(x_1) = f(x_2) \in B$. 也即定义域中的每个元素只能有一个像.

(2) $f(A) \subseteq B$, 不一定有 $f(A) = B$;

(3) 映射是由定义域和对应法则共同确定的, 但对应法则的表达形式可能不唯一. 例如

$$y = |x|, x \in \mathbb{R} \quad \text{和} \quad y = \sqrt{x^2}, x \in \mathbb{R}$$

(4) 值域中的元可以是集合. 例如 $A = \mathbb{N}, B = \{B_n\}_{n=1}^{\infty}, \phi(n) = B_n$;

(5) 定义域中的元也可以是集合. 例如 A 可列, $\mathcal{D} \subseteq 2^A$, 定义 $\phi : \mathcal{D} \to \{0\} \cup \mathbb{N}$ 为

$$\phi(A_0) = A_0 \text{ 中元素个数}, \quad A_0 \in \mathcal{D}.$$

定义 1.11 (单射、满射和双射)

设 $f: A \to B$, 则

1. 若 B 中每个元素最多只有一个原像, 即对 $\forall y \in B, f^{-1}(y)$ 所含元素个数为 0 或 1, 则称 f 为**单射**或**一一映射**或**一一的**.
2. 若 $f(A) = B$, 即 $\forall y \in B$, 都存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$, 亦即 $f^{-1}(y) = \varnothing, \forall y \in B$, 则称 f 为**满射**或**映上的**.
3. 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 为**双射**或**一一对应**.

♣

定义 1.12 (逆映射)

设 $f: A \to B$ 为一一映射, 则对每个 $y \in B$, 都有唯一确定的 $x \in A$ 满足 $y = f(x)$. 定义 $f^{-1}: B \to A$ 为 $f^{-1}(y) = x$, 则称 f^{-1} 为 f 的**逆映射**. 自然 f 也是 f^{-1} 的逆映射, 即 $(f^{-1})^{-1} = f$.

♣

笔记 Show/Hide Note

由逆映射的定义可直接得到

$$f^{-1}(f(x)) = x, \quad x \in A, \quad f(f^{-1}(y)) = y, \quad y \in B.$$

公理 1.1 (选择公理 (AC))

设 $\mathcal{F}$ 是一个非空集合族, 且 $\mathcal{F}$ 中的每个元素都是非空集合. 那么存在一个函数

$$f: \mathcal{F} \to \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$$

使得对任意 $A \in \mathcal{F}$, 有 $f(A) \in A$. 这样的函数 f 称为**选择函数** (choice function).

♡

定理 1.5

设 $f: A \to B$, 其中 $A, B \neq \varnothing$, 则

(1) f 为单射的充要条件是满足下列条件之一.

(i) $f(x_1) = f(x_2) \iff x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$

(ii) $f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2, \quad \forall x_1, x_2 \in A.$

(iii) $x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in A.$

(iv) 存在 $g: B \to A$, 使得 $gf = \mathrm{id}_A$.

(2) f 为满射的充要条件是满足下列条件之一.

(i) $f(A) = B$.

(ii) 存在 $g: B \to A$, 使得 $fg = \mathrm{id}_B$.

(3) f 为双射的充要条件是存在 $g: B \to A$, 使得

$$gf = \mathrm{id}_A, \quad fg = \mathrm{id}_B.$$

此时必有 $g = f^{-1}$. 即有两个交换图, 如图 1.1所示.

♡

笔记 Show/Hide Note




图 1.1

证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.13 (映射的乘积)

设映射 $f : A \to B, g : B \to C$, 定义 $g \circ f : A \to C$ 为

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad x \in A$$

称为 g 与 f 的**复合映射**或**乘积**. $g \circ f$ 也常简记为 gf.

♣

定理 1.6 (映射的乘法满足结合律)

若有 $f : A \to B, g : B \to C, h : C \to D$, 则有

$$h(gf) = (hg)f.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

由映射的乘法满足结合律可知在多个映射相乘时, 可以不加括号. 特别地, $h(gf)$ 与 $(hg)f$ 均可简记作 hgf.

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall x \in A$ 有

$$(h(gf))(x) = h((gf)(x)) = h(g(f(x))) = (hg)(f(x)) = ((hg)f)(x).$$

□

定义 1.14

设映射 $f : A \to B, A_0 \subseteq A$, 定义映射 $i : A_0 \to A$ 满足

$$i(x) = x, \quad \forall x \in A_0.$$

称 i 为 A_0 到 A 中的**自然嵌入映射**. 显然, 自然嵌入映射是单射.

又若映射 $f : A \to B$ 与映射 $g : A_0 \to B$ 满足 $gi = f$, 即

$$g(x) = f(x), \quad \forall x \in A_0.$$

则称 g 为 f 在 A_0 上的**限制**, 记为 $g = f|_{A_0}$, 也称 f 为 g 在 A 上的**延拓**或**开拓**. 即图 1.2为交换图.

♣

笔记 Show/Hide Note




图 1.2: 嵌入映射交换图

命题 1.6

设一列映射 $f_i : A_i \to A_{i+1}$, 其中 $i = 1, 2, \cdots, n$.

(1) 若 f_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是单射, 则 $f_n \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1$ 也是单射.

(2) 若 f_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是满射, 则 $f_n \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1$ 也是满射.

(3) 若 f_i $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是双射, 则 $f_n \circ \cdots \circ f_2 \circ f_1$ 也是双射.

(4) 若 $f_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 都是双射, 则 $(f_n \cdots f_2 f_1)^{-1} = f_1^{-1} f_2^{-1} \cdots f_n^{-1}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

□

命题 1.7 (映射的基本性质)

对于映射 $f: X \to Y, A \subseteq X, B \subseteq Y, \{A_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq X, \{B_\alpha\}_{\alpha\in I} \subseteq Y$, 则下列事实成立:

(1) 若 $A \subseteq B$, 则 $f(A) \subseteq f(B)$; 若 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq Y$, 则 $f^{-1}(B_1) \subseteq f^{-1}(B_2)$.

(2) $f\left(\bigcup\limits_{\alpha\in I} A_\alpha\right) = \bigcup\limits_{\alpha\in I} f(A_\alpha)$; $f^{-1}\left(\bigcup\limits_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcup\limits_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha)$.

(3) $f^{-1}\left(\bigcap\limits_{\alpha\in I} B_\alpha\right) = \bigcap\limits_{\alpha\in I} f^{-1}(B_\alpha)$;

$f\left(\bigcap\limits_{\alpha\in I} A_\alpha\right) \subseteq \bigcap\limits_{\alpha\in I} f(A_\alpha)$, 当且仅当 f 为单射时 "=" 成立.

(4) $f\left(f^{-1}(B)\right) \subseteq B$, 当且仅当 f 为满射时 "=" 成立;

$A \subseteq f^{-1}(f(A))$, 当且仅当 f 为单射时 "=" 成立.

(5) $f(X \setminus B) = f^{-1}(B^c) = \left(f^{-1}(B)\right)^c = Y \setminus f^{-1}(B)$ 成立;

但 $f(X \setminus A) = f(A^c) = f(A)^c = f(X) \setminus f(A)$ 不一定成立, 只有 $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$.

♠

笔记 Show/Hide Note

(4)中第一条的直观理解是:B 中某些元素不一定有原像 (即 f 可能不是满射). (4)中第二条的直观理解是:$X \setminus A$ 中的某些元素的像也可能在 $f(A)$(即 f 可能不是单射).

证明 Show/Hide Proof

(1) 显然.

(2) 显然.

(3) 只证明两个集合的情形. 注意到 $A_1 \cap A_2 \subseteq A_1$, $A_1 \cap A_2 \subseteq A_2$, 由 (i) 知

$$f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1), \quad f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_2)$$

故 $f(A_1 \cap A_2) \subseteq f(A_1) \cap f(A_2)$.

设 $y \in f(A_1) \cap f(A_2)$, 则 $y \in f(A_1)$ 且 $y \in f(A_2)$, 故存在 $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2$ 使得 $y = f(x_1) = f(x_2)$. 由于 f 是单射, 则必有 $x_1 = x_2 = x$. 所以

$$x \in A_1 \cap A_2, \quad y = f(x) \in f(A_1 \cap A_2)$$

故

$$f(A_1) \cap f(A_2) \subseteq f(A_1 \cap A_2)$$

因此, "=" 成立.

反之, 假设 f 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 构造集合 $A_1 = \{x_1\}$, $A_2 = \{x_2\}$, 则 $A_1 \cap A_2 = \varnothing$, 从而 $f(A_1 \cap A_2) = \varnothing$. 而

$$f(A_1) \cap f(A_2) = \{f(x_1)\} \neq \varnothing$$

故 $f(A_1 \cap A_2) \neq f(A_1) \cap f(A_2)$. 矛盾.

(4) (i) 设 $y \in f(f^{-1}(B))$, 则存在 $x \in f^{-1}(B)$ 使得 $y = f(x)$. 故 $y = f(x) \in B$. 因此, $f(f^{-1}(B)) \subseteq B$.

设 $y \in B$, f 为满射, 则存在 $x \in A$ 使得 $y = f(x)$. 故 $x \in f^{-1}(y) \subseteq f^{-1}(B)$, 从而 $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$, 于是 $B \subseteq f(f^{-1}(B))$, 因此, "=" 成立.

反之, 假设 f 不是满射, 则 $f(A) \subsetneq B$. 由于 $f^{-1}(B) \subseteq A$, 故

$$f(f^{-1}(B)) \subseteq f(A) \subsetneq B$$

与 $B = f(f^{-1}(B))$ 矛盾.

(ii) 设 $x \in A$, 则 $f(x) \in f(A)$, 故 $x \in f^{-1}(f(A))$. 因此, $A \subseteq f^{-1}(f(A))$.

设 $x \in f^{-1}(f(A))$, 则 $f(x) \in f(A)$. 再由 f 是单射, 则必有 $x \in A$. 从而 $f^{-1}(f(A)) \subseteq A$. 因此, "=" 成立.

反之, 假设 f 不是单射, 则存在 $x_1 \neq x_2$ 使得 $f(x_1) = f(x_2)$. 构造集合 $A = \{x_1\}$, 则 $f(A) = \{f(x_1)\}$. 故 $\{x_1, x_2\} \subseteq f^{-1}(f(A))$, 从而 $A \neq f^{-1}(f(A))$. 矛盾.

(5) $f^{-1}(Y \setminus B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B)$ 成立.

解法一:

$$\begin{aligned} x \in f^{-1}(Y \setminus B) &\iff f(x) \in Y \setminus B \\ &\iff f(x) \in Y,\ f(x) \notin B \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) = X,\ x \notin f^{-1}(B) \\ &\iff x \in f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法二:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= \{x \in X \mid f(x) \in Y \setminus B\} = X \setminus \{x \in X \mid f(x) \in B\} \\ &= X \setminus f^{-1}(B) = f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

解法三:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus B) &= f^{-1}(Y \cap B^c) = f^{-1}(Y) \cap f^{-1}(B^c) = f^{-1}(Y) \cap (f^{-1}(B))^c \\ &= f^{-1}(Y) \setminus f^{-1}(B). \end{aligned}$$

$f(X \setminus A) = f(X) \setminus f(A)$ 未必成立. 只有 $f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$. 事实上,

$$\begin{aligned} y \in f(X) \setminus f(A) &\iff y \in f(X),\ y \notin f(A) \\ &\Rightarrow \exists x \in X \text{但} x \notin A, \text{s. t.}\ y = f(x) \\ &\iff \exists x \in X \setminus A, \text{s. t.}\ y = f(x) \\ &\iff y \in f(X \setminus A). \end{aligned}$$

因此,$f(X) \setminus f(A) \subseteq f(X \setminus A)$.

但是,$f(X) \setminus f(A) \not\supseteq f(X \setminus A)$. 从而,$f(X \setminus A) \neq f(X) \setminus f(A)$.

反例: 设 X 为多于两点的集合,$A = \{a\} \subset X$, $f : X \to Y$ 为常值映射,$f(x) \equiv y_0 \in Y, \forall x \in X$. 于是

$$f(X) \setminus f(A) = \{y_0\} \setminus \{y_0\} = \varnothing \not\supseteq \{y_0\} = f(X \setminus A).$$

□

命题 1.8 (单调映射的不动点)

设 X 是一个非空集合, 且有 $f : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$. 若对 $\mathcal{P}(X)$ 中满足 $A \subseteq B$ 的任意 A, B, 必有 $f(A) \subseteq f(B)$, 则存在 $T \subset \mathcal{P}(X)$, 使得 $f(T) = T$.

♠

证明 Show/Hide Proof

作集合 S, T:

$$S = \{A : A \in \mathcal{P}(X) \text{ 且} A \subseteq f(A)\}, \quad T = \bigcup_{A \in S} A (\in \mathcal{P}(X)),$$

则有 $f(T) = T$.

事实上, 因为由 $A \in S$ 可知 $A \subseteq f(A)$, 从而由 $A \subseteq T$ 可得 $f(A) \subseteq f(T)$. 根据 $A \in S$ 推出 $A \subseteq f(T)$, 这就导致

$$\bigcup_{A \in S} A \subseteq f(T), \quad T \subseteq f(T).$$

另一方面, 又从 $T \subseteq f(T)$ 可知 $f(T) \subseteq f(f(T))$. 这说明 $f(T) \in S$, 我们又有 $f(T) \subseteq T$.

□

定义 1.15 (特征函数 (示性函数))

集合 E 的**特征函数 (示性函数)** 定义为

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

♣

笔记 Show/Hide Note

特征函数 χ_E 在一定意义上反映出集合 E 本身的特征, 可以通过它来表示各种集合关系.

命题 1.9 (特征函数的基本性质)

设 X 为固定的集合,$A, B \subset X$, 集族 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 和集列 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 都为 X 的子集, 则

(1) $A = B \iff \chi_A(x) = \chi_B(x)$;

$A \neq B \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x)$;

$A \bigtriangleup B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}$.

特别地,$A = X \iff \chi_A(x) \equiv 1$; $A = \varnothing \iff \chi_A(x) \equiv 0$.

(2) $A \subseteq B \iff \chi_A(x) \leqslant \chi_B(x)$.

(3) $\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$.

(4) $\chi_{A \cup B}(x) = \chi_A(x) + \chi_B(x) - \chi_A(x) \cdot \chi_B(x)$.

(5) $\chi_{A \setminus B}(x) = \chi_A(x)[1 - \chi_B(x)]$.

(6) $\chi_{A \triangle B}(x) = |\chi_A(x) - \chi_B(x)|$.

(7) $\chi_{\bigcup_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \max\limits_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$; $\chi_{\bigcap_{\alpha \in \Gamma} A_\alpha}(x) = \min\limits_{\alpha \in \Gamma} \chi_{A_\alpha}(x)$.

(8) $\lim\limits_{n \to +\infty} A_n$ 存在 $\iff$ $\lim\limits_{n \to +\infty} \chi_{A_n}(x)$ 存在. 而且当极限存在时, 有 $\chi_{\lim\limits_{n \to +\infty} A_n}(x) = \lim\limits_{n \to +\infty} \chi_{A_n}(x)$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) $A = B \iff x \in A$ 等价于 $x \in B \iff \chi_A(x) = 1$ 等价于 $\chi_B(x) = 1 \iff \chi_A = \chi_B$.

$\chi_A \neq \chi_B \iff \exists x_0 \in X$, s.t. $\chi_A(x_0) \neq \chi_B(x_0) \iff \exists x_0 \in X$, s.t. $\chi_A(x_0) = 0$ 且 $\chi_B(x_0) = 1$, 或者 $\chi_A(x_0) = 1$ 且 $\chi_B(x_0) = 0 \iff \exists x_0 \in X$, s.t. $x_0 \notin A$ 且 $x_0 \in B$, 或者 $x_0 \in A$ 且 $x_0 \notin B \iff A \neq B$.

$x \in A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) \iff x \in A - B$ 或 $x \in B - A \iff x \in A, x \notin B$, 或 $x \in B, x \notin A$ $\iff \chi_A(x) = 1, \chi_B(x) = 0$, 或 $\chi_B(x) = 1, \chi_A(x) = 0 \iff \chi_A(x) \neq \chi_B(x)$,

即

$$A \triangle B = \{x \mid \chi_A(x) \neq \chi_B(x)\}.$$

(2) $A \subseteq B \iff$ 对 $\forall x \in X, x \in A$ 必有 $x \in B \iff$ 对 $\forall x \in X, \chi_A(x) = 1$ 必有 $\chi_B(x) = 1 \iff \chi_A(x) \leqslant \chi_B(x), \forall x \in X$.

(3) 当 $x \in A \cap B$ 时, 有 $x \in A$ 且 $x \in B$, 故

$$\chi_{A \cap B}(x) = 1 = 1 \cdot 1 = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

当 $x \notin A \cap B$ 时, 必有 $x \notin A$, 则

$$\chi_{A \cap B}(x) = 0 = 0 \cdot \chi_B(x) = \chi_A(x) \cdot \chi_B(x);$$

或 $x \notin B$, 则

$$\chi_{A\cap B}(x) = 0 = \chi_A(x)\cdot 0 = \chi_A(x)\cdot\chi_B(x).$$

(4) 当 $x \in A\cap B \subseteq A\cup B$ 时, 有

$$\chi_A(x)+\chi_B(x)-\chi_{A\cap B}(x) = 1+1-1 = 1 = \chi_{A\cup B}(x).$$

当 $x \in A\setminus B(\Longleftrightarrow\ x\in A, x\notin B \Rightarrow x\notin A\cap B, x\in A\cup B)$ 时, 有

$$\chi_A(x)+\chi_B(x)-\chi_{A\cap B}(x) = 1+0-0 = 1 = \chi_{A\cup B}(x).$$

当 $x \in B\setminus A$ 时, 同理有

$$\chi_A(x)+\chi_B(x)-\chi_{A\cap B}(x) = 0+1-0 = 1 = \chi_{A\cup B}(x).$$

当 $x \in (A\cup B)^c$ 时, 有

$$\chi_A(x)+\chi_B(x)-\chi_{A\cap B}(x) = 0+0-0 = 0 = \chi_{A\cup B}(x).$$

再由命题 1.9(3)可知结论成立.

(5) 当 $x \in A-B$ 时, 即 $x\in A, x\notin B$, 有

$$\chi_{A-B}(x) = 1 = 1\cdot(1-0) = \chi_A(x)[1-\chi_B(x)];$$

当 $x\notin A-B$ 时, 必有 $x\notin A$, 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 0\cdot[1-\chi_B(x)] = \chi_A(x)[1-\chi_B(x)];$$

或 $x\in A$, 且 $x\in B$, 则

$$\chi_{A-B}(x) = 0 = 1\cdot(1-1) = \chi_A(x)[1-\chi_B(x)].$$

(6)

$$\chi_{A\triangle B}(x) = \begin{cases} 0 = |0-0|, & 当 x\in (A\cup B)^c,\\ 0 = |1-1|, & 当 x\in A\cap B,\\ 1 = |1-0|, & 当 x\in A-B,\\ 1 = |0-1|, & 当 x\in B-A \end{cases} = |\chi_A(x)-\chi_B(x)|.$$

(7) 证法一:

$$\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x) = 1 \Longleftrightarrow x\in\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha \Longleftrightarrow \exists\alpha_0\in\Gamma, \text{s.t.} x\in A_{\alpha_0}$$

$$\Longleftrightarrow \exists\alpha_0\in\Gamma, \text{s.t.}\chi_{A_{\alpha_0}}(x) = 1 \Longleftrightarrow \max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x) = 1,$$

再由 $\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)$ 与 $\max\limits_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x)$ 或为 1 或为 0 知

$$\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x) = \max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x). \tag{1.2}$$

或者再从

$$\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x) = 0 \Longleftrightarrow x\notin\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha \Longleftrightarrow \forall\alpha\in\Gamma, x\notin A_\alpha$$

$$\Longleftrightarrow \forall\alpha\in\Gamma, \chi_{A_\alpha}(x) = 0 \Longleftrightarrow \max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x) = 0$$

推出上面等式. 于是

$$\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x) = 1-\chi_{(\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha)^c}(x) \xlongequal{\text{De Morgan 公式}} 1-\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha^c}(x)$$

$$\xlongequal{(1.2)式} 1-\max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha^c}(x) = 1-\max_{\alpha\in\Gamma}(1-\chi_{A_\alpha}(x))$$

$$= 1-(1-\min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x)) = \min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x).$$

证法二:

$$\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)=1 \iff x\in\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha \iff \forall\alpha\in\Gamma, x\in A_\alpha$$

$$\iff \forall\alpha\in\Gamma, \chi_{A_\alpha}(x)=1 \iff \min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x)=1.$$

再由 $\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)$ 与 $\min\limits_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x)$ 或为 1 或为 0 知

$$\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)=\min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x). \tag{1.3}$$

或者再从

$$\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)=0 \iff x\notin\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha \iff \exists\alpha_0\in\Gamma, x\notin A_{\alpha_0}$$

$$\iff \exists\alpha_0\in\Gamma,\ \chi_{A_{\alpha_0}}(x)=0 \iff \min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x)=0$$

推出上面等式. 于是

$$\chi_{\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha}(x)=1-\chi_{(\bigcup_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha)^c}(x)\overset{\text{De Morgan 公式}}{=\!=\!=}1-\chi_{\bigcap_{\alpha\in\Gamma}A_\alpha^c}(x)$$

$$\overset{(1.3)\text{式}}{=\!=\!=}1-\min_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha^c}(x)=1-\min_{\alpha\in\Gamma}(1-\chi_{A_\alpha}(x))$$

$$=1-(1-\max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x))=\max_{\alpha\in\Gamma}\chi_{A_\alpha}(x).$$

(8)

$$\lim_{n\to+\infty}A_n\text{存在}\iff\overline{\lim_{n\to\infty}}A_n=\underline{\lim_{n\to\infty}}A_n\iff\overline{\lim_{n\to\infty}}A_n\subseteq\underline{\lim_{n\to\infty}}A_n$$

$\iff$ 如果$x\in\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n$, 即有无穷个$n$, 使得$x\in A_n$, 则必有$n_0\in\mathbb{N}$, 当$n>n_0$时, $x\in A_n$

$\iff$ 如果$x\in\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n$, 即有无穷个$n$, 使得$\chi_{A_n}(x)=1$, 则必有$n_0\in\mathbb{N}$, 当$n>n_0$时, $\chi_{A_n}(x)=1$

$\iff \forall x\in X$, 若$x\in\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n$, 则$\exists n_0\in\mathbb{N}$, 当$n>n_0$时, $\chi_{A_n}(x)\equiv1$; 若$x\notin\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}A_n$, 则此时$\chi_{A_n}(x)\equiv0$

$\iff$ 对$\forall x\in X$, 都有 $\lim\limits_{n\to+\infty}\chi_{A_n}(x)$存在.

当上述极限存在时, 由上式有

$$\chi_{\lim\limits_{n\to+\infty}A_n}(x)=\begin{cases}1, & x\in\lim\limits_{n\to+\infty}A_n,\\ 0, & x\notin\lim\limits_{n\to+\infty}A_n\end{cases}=\lim_{n\to+\infty}\chi_{A_n}(x).$$

□

例题 1.4 设 $\{f_n\}(n=1,2,\cdots)$ 为定义在 $[a,b]$ 上的实函数列,$E\subseteq[a,b]$, 且有

$$\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=\chi_{[a,b]\setminus E}(x).$$

若令 $E_n=\left\{x\in[a,b]\mid f_n(x)\geqslant\dfrac{1}{2}\right\}$, 求集合 $\lim\limits_{n\to+\infty}E_n$.

解 Show/Hide Solution

解法一:由

$$\overline{\lim_{n\to+\infty}}E_n=\{x\in[a,b]\mid\exists\text{无穷个}n\in\mathbb{N},\text{s. t.}\,x\in E_n\}$$

$$=\left\{x\in[a,b]\mid\exists\text{无穷个}n\in\mathbb{N},\text{s. t.}\,f_n(x)\geqslant\frac{1}{2}\right\}$$

$$=\left\{x\in[a,b]\mid\chi_{[a,b]\setminus E}(x)=\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=1\right\}$$

$$=\{x\in[a,b]\mid x\in[a,b]\setminus E\}=[a,b]\setminus E$$

$$=\{x\in[a,b]\mid x\in[a,b]\setminus E\}=\left\{x\in[a,b]\mid\chi_{[a,b]\setminus E}(x)=\lim_{n\to+\infty}f_n(x)=1\right\}$$

$$=\left\{x\in[a,b]\mid\exists n_0\in\mathbb{N},\text{当 }n>n_0\text{时},f_n(x)\geqslant\frac{1}{2}\right\}$$

$$= \left\{x \in [a,b] \mid \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{时}, x \in E_n\right\} = \underline{\lim}_{n\to+\infty} E_n$$

知, $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n = \overline{\lim\limits_{n\to+\infty}} E_n = \underline{\lim\limits_{n\to+\infty}} E_n = [a,b] \setminus E$.

解法二:

$$\begin{aligned}
x \in [a,b] \setminus E &\iff 1 = \chi_{[a,b]\setminus E}(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x) \\
&\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{时}, f_n(x) \geqslant \frac{1}{2} \\
&\iff \exists n_0 \in \mathbb{N}, \text{当 } n > n_0 \text{时}, x \in E_n \\
&\iff x \in \underline{\lim_{n\to+\infty}} E_n \Rightarrow x \in \overline{\lim_{n\to+\infty}} E_n \\
&\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } x \in E_n \\
&\iff \text{有无穷个 } n \in \mathbb{N}, \text{s. t. } f_n(x) \geqslant \frac{1}{2} \\
&\iff \chi_{[a,b]\setminus E}(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x) \geqslant \frac{1}{2} \\
&\iff \chi_{[a,b]\setminus E}(x) = 1 \iff x \in [a,b] \setminus E.
\end{aligned}$$

由此推出

$$\lim_{n\to+\infty} E_n = \overline{\lim_{n\to+\infty}} E_n = \underline{\lim_{n\to+\infty}} E_n = [a,b] \setminus E.$$

□

1.3 集合的基数 (势)

定义 1.16 (集合的对等)

设 A, B 为非空集, 若存在从 A 到 B 的一一映射, 则称 A 与 B **对等**, 记为 $A \sim B$. 规定 $\varnothing \sim \varnothing$.

♣

笔记 Show/Hide Note

A 与 B 对等就是两个集合的元素可以建立一一对应的关系.

定理 1.7

对等关系也是等价关系, 即具有如下性质:

(1) (反身性)$A \sim A$;

(2) (对称性) 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;

(3) (传递性) 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

♡

证明 Show/Hide Proof

证明是显然的.

□

命题 1.10

(1) 设 A, B, C, D 都是非空集合, 若 $A \sim C, B \sim D$, 则 $A \times B \sim C \times D$.

(2) 设 A_i, B_i 都是非空集合, 其中 $i = 1, 2, \cdots, n$. 若 $A_i \sim B_i$, 则 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n \sim B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_n$.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $A \sim C, B \sim D$ 可知, 存在双射 $f : A \to C$ 和 $g : B \to D$. 于是令

$$\varphi : A \times B \to C \times D, \quad (a,b) \mapsto (f(a), g(b))$$

对 $\forall(a,b)\in A\times B$, 由 $f(a)\in C, g(b)\in D$ 可知 $(f(a),g(b))\in C\times D$. 故 φ 是良定义的. 由 f,g 都是双射易知 φ 也是双射. 故 $A\times B\sim C\times D$.

(2) 根据 (1) 的结论, 再利用数学归纳法不难证明.

□

例题 1.5 自然数集 $\mathbb{N}$ ~ 正偶数集 ~ 正奇数集 ~ 整数集 $\mathbb{Z}$.

证明 Show/Hide Proof

正偶数集 $=\{2n:n\in\mathbb{N}\}$; 正奇数集 $=\{2n-1:n\in\mathbb{N}\}$;

$$\mathbb{Z}=\{(-1)^{n+1}[n/2]:n\in\mathbb{N}\}.$$

□

例题 1.6 $(-1,1)\sim\mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

$f(x)=\tan\dfrac{\pi}{2}x$.

□

例题 1.7 {去掉一点的圆周} ~ $\mathbb{R}$.

笔记 Show/Hide Note

类似地, 球面去掉一点与平面上的点集对等.

证明 Show/Hide Proof

如图 1.3, 设圆周为 C, 从除去的点 P 作过圆心的直线, 取与该直线垂直且与圆周相切 (不过点 P) 的直线表示实轴 $\mathbb{R}$. 对于 $C\backslash\{P\}$ 上的每一点 c, 从点 P 作过点 c 的直线必与实轴相交于某点, 记为 x. 建立一一对应: $s:\mathbb{R}\to C\backslash\{P\}$ 为 $s(x)=c$. (点 P 对应 ∞)




图 1.3: 去掉一点的圆周与实轴对等

□

引理 1.1 (映射分解定理)

设 A,B 为非空集, 若 $f:A\to B, g:B\to A$, 则 A 与 B 存在如下分解:

(i) $A=A_1\cup A_2, B=B_1\cup B_2$;

(ii) $A_1\cap A_2=\varnothing, B_1\cap B_2=\varnothing$;

(iii) $f(A_1)=B_1, g(B_2)=A_2$.

证明 Show/Hide Proof

作集族

$$\Gamma=\{E\subseteq A:E\cap g(B\backslash f(E))=\varnothing\}.$$

令 $A_1=\bigcup_{E\in\Gamma}E$, 则 $A_1\in\Gamma$. 实际上, 对任意的 $E\in\Gamma$, 都有 $E\subseteq A_1$, 再由 $E\cap g(B\backslash f(E))=\varnothing$ 知

$$E\cap g(B\backslash f(A_1))=\varnothing$$

从而

$$A_1 \cap g(B\backslash f(A_1)) = \bigcup_{E\in\Gamma}[E \cap g(B\backslash f(E))] = \varnothing$$

因此, A_1 是 A 中隔离集, 且是 Γ 中的最大元.

现在令 $B_1 = f(A_1)$, $B_2 = B\backslash B_1$, $A_2 = g(B_2)$, 则

$$A_1 \cap A_2 = A_1 \cap g(B\backslash f(A_1)) = \varnothing$$

下面只需验证 $A_1 \cup A_2 = A$.

若不然, 则存在 $x_0 \in A, x_0 \notin A_1 \cup A_2$. 令 $A_0 = A_1 \cup \{x_0\}$, 由于 $B_1 = f(A_1) \subseteq f(A_0)$, 故

$$B\backslash f(A_0) \subseteq B\backslash B_1 = B_2$$

从而

$$g(B\backslash f(A_0)) \subseteq g(B_2) = A_2$$

再由 $A_1 \cap A_2 = \varnothing$ 以及 $x_0 \notin A_2$ 知

$$A_1 \cap g(B\backslash f(A_0)) = \varnothing, \quad x_0 \notin g(B\backslash f(A_0))$$

因此

$$A_0 \cap g(B\backslash f(A_0)) = \varnothing$$

故 $A_0 \in \Gamma$. 这与 A_1 是 Γ 中的最大元矛盾.

□

定义 1.17 (集合的基数 (势))

设 A, B 为两个集合, 若 $A \sim B$, 则称 A 与 B 的**基数**或**势**相同, 记为 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$.

笔记 Show/Hide Note

基数反映了对等集在元素数量级别上的共性.

定理 1.8

(1) 自反性:$\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{A}}$.

(2) 对称性: 若 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 则 $\overline{\overline{B}} = \overline{\overline{A}}$.

(3) 传递性: 若 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{B}} = \overline{\overline{C}}$, 则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{C}}$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.7及集合的基数 (势) 的定义可直接得到.

□

定义 1.18

对于集合 A, B, 若有 $B_0 \subseteq B, A \sim B_0$, 则称 A 的基数小于等于 B 的基数, 记作 $\overline{\overline{A}} \leqslant \overline{\overline{B}}$.

若 $\overline{\overline{A}} \leqslant \overline{\overline{B}}$ 且 A 与 B 不对等, 则称 A 的基数小于 B 的基数, 记作 $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$.

同理可定义 $\overline{\overline{A}} \geqslant \overline{\overline{B}}$ 和 $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$.

命题 1.11 (映射与基数之间的关系)

(1) 若存在从 A 到 B 的单射, 则 $\overline{\overline{A}} \leqslant \overline{\overline{B}}$.

(2) 若存在从 A 到 B 的满射, 则 $\overline{\overline{A}} \geqslant \overline{\overline{B}}$.

(3) 若存在从 A 到 B 的一一映射, 则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$.

证明 Show/Hide Proof

(1)
(2)
(3)

□

定理 1.9 (Cantor - Bernstein 定理)

Cantor - Bernstein 定理的两个等价形式:

(1) 若 A 与 B 的某子集对等, B 与 A 的某子集对等, 则 $A \sim B$.

(2) 若集合 A, B 满足 $\overline{\overline{A}} \leqslant \overline{\overline{B}}, \overline{\overline{B}} \leqslant \overline{\overline{A}}$, 则 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

由题设存在单射 $f : A \to B, g : B \to A$, 利用映射分解定理可得到 A 与 B 的分解

$$A = A_1 \cup A_2, \quad B = B_1 \cup B_2$$

$$f(A_1) = B_1, \quad g(B_2) = A_2$$

其中, $A_1 \cap A_2 = \varnothing, B_1 \cap B_2 = \varnothing$. 注意到 $f : A_1 \to B_1, g^{-1} : A_2 \to B_2$ 是一一映射, 作映射

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A_1 \\ g^{-1}(x), & x \in A_2 \end{cases}$$

则 $F : A \to B$ 是一一映射, 从而 $A \sim B$. 故 (1) 得证. 再由定义 1.17和定义 1.18可知 (2)⇔(1).

□

例题 1.8 $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

由例题 1.6可知, $\mathbb{R} \sim (-1, 1) \subseteq [-1, 1]$; 又 $[-1, 1] \sim [-1, 1] \subseteq \mathbb{R}$. 由Bernstein 定理 (1)可知, $[-1, 1] \sim \mathbb{R}$.

□

定理 1.10

对于集合 A, B,$\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$,$\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$,$\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$ 中的任意两个不会同时成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定义 1.18可知, 若 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 则 A 与 B 对等, 另外两个不会成立; 假设 $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{B}}$ 与 $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$ 同时成立, 则存在 $B_0 \subseteq B$,$A_0 \subseteq A$, 使得 $A \sim B_0$,$B \sim A_0$. 使用Bernstein 定理 (1)得出 $A \subseteq B$, 进而 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$, 显然矛盾, 证毕.

□

定义 1.19 (有限集与无限集)

设 A 是一个非空集合, 若存在自然数 n, 使得 $A \sim \{1, 2, \cdots, n\}$, 则称 A 为**有限集**, 并记 $\overline{\overline{A}} = n$ 或 $|A| = n$. 若 A 不是有限集, 则称 A 为**无限集**. 特别地, 规定 $\overline{\overline{\varnothing}} = 0$.

♣

笔记 Show/Hide Note

由上述定义可知有限集的基数等于该集合元素的个数. 实际上, 集合的基数就是有限集元素个数的推广.

定理 1.11

设 A 是非空集合, 则

(1) A 是有限集的充要条件是 A 不与其任何真子集对等.

(2) A 是无限集的充要条件是 A 与其某个真子集对等.

♡

笔记 Show/Hide Note

这就是有限集与无限集的本质区别.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性**: 设 $\overline{\overline{A}}=n$, 用数学归纳法证明, $n=1$, 显然. 假设 $n=k$ 时, 结论成立.

当 $n=k+1$ 时, 若存在 A 的某个真子集 A_0 使得 $A\sim A_0$, 则存在一一映射 $\varphi: A\to A_0$. 下面分两种情况:

(i) $\exists a\in A$, 使得 $\varphi(a)=a$.

令 $A_1=A\backslash\{a\}$, $A_2=A_0\backslash\{a\}$, 则 A_2 是 A_1 的真子集, $\overline{\overline{A_1}}=k$. 而 $\varphi|_{A_1}$ 是 A_1 到 A_2 的一一映射, 故 $A_1\sim A_2$. 这与假设矛盾.

(ii) $\forall a\in A$, 都有 $\varphi(a)\neq a$.

A_0 是 A 的真子集, 则存在 $x_0\in A, x_0\notin A_0$. 令

$$A_3=A\backslash\{x_0\},\quad A_4=A_0\backslash\{\varphi(x_0)\}$$

注意到 $x_0\notin A_0$ 以及 A_0 是 A 的真子集, 则 A_4 是 A_3 的子集. 又由于

$$\varphi(x_0)\in A_0\subseteq A,\quad \varphi(x_0)\neq x_0$$

故 $\varphi(x_0)\in A\backslash\{x_0\}=A_3$, 而 $\varphi(x_0)\notin A_0\backslash\{\varphi(x_0)\}=A_4$. 从而 A_4 是 A_3 的真子集, 于是 $\overline{\overline{A_3}}=k$, $\varphi|_{A_3}$ 是 A_3 到 A_4 的一一映射, 故 $A_3\sim A_4$. 这与假设矛盾.

充分性: 设 A 不与其任何真子集对等, 假设 A 是无限集, 则与由 (2) 的必要性矛盾! 因此 A 不是无限集, 故 A 是有限集.

(2) 证法一:**必要性**: 设 A 是无限集. 先证明在任一无限集 A 中, 一定能取出一列互不相同的元素 $a_1,a_2,\cdots$. 事实上, 在 A 中任取一个元素, 记为 a_1. 因为 A 是无限集, 集 $A\backslash\{a_1\}$ 显然不空, 这时再从集 $A\backslash\{a_1\}$ 取一个元素 a_2, 同样, $A\backslash\{a_1,a_2\}$ 决不空. 可以继续做下去, 将从 A 中取出一列互不相同的元素 $a_1,a_2,\cdots$, 记余集为 $\hat{A}=A\backslash\{a_n|n=1,2,\cdots\}$. 在 A 中取出一个真子集

$$\{a_2,a_3,\cdots\}\cup\hat{A}=\tilde{A}$$

现作 A 与 $\tilde{A}$ 之间的映射 φ:

$$\varphi(a_i)=a_{i+1},\quad i=1,2,\cdots$$

$$\varphi(x)=x,\quad x\in\hat{A}$$

显然, φ 是 A 到 $\tilde{A}$ 上的一一对应, 证毕.

充分性: 设 A 与其某个真子集对等, 假设 A 是有限集, 则与 (1) 的必要性矛盾! 因此 A 是不是有限集. 故 A 一定是无限集.

证法二:因为有限集是不与其真子集对等的, 所以充分性是成立的. 现在取 A 中一个非空有限子集 B, 则由定理 1.12(6)立即可知

$$\overline{\overline{A}}=\overline{\overline{((A\setminus B)\cup B)}}=\overline{\overline{(A\setminus B)}}.$$

故 $A\sim(A\setminus B)$.

□

1.4 可列集与不可列集

定义 1.20

记自然数集 $\mathbb{N}$ 的基数为 $\aleph_0$(读作阿列夫 (Aleph, 希伯来文) 零). 若集合 A 的基数为 $\aleph_0$, 则 A 叫作**可列集**或**可数集**. 不是可数集的无限集称为**不可列集**或**不可数集**.

♣

命题 1.12

A 是可列集当且仅当 A 可以写成 $A=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

♠

证明 Show/Hide Proof

A 可列, 则存在 $\mathbb{N}$ 到 A 的一一映射 φ, 记为 $\varphi(n)=a_n, n\in\mathbb{N}$, 则 $A=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. 反过来, 若 $A=\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 将每个 a_n 与其下标 n 建立一一对应, 则 A 与 $\mathbb{N}$ 对等, 从而是可列集

□

定理 1.12 (可列集的性质)

(1) 任何无限集必包含一个可列子集.

(2) 可列集的任何无限子集都是可列集.

(3) 有限集与可列集的并集是可列集.

(4) 有限个可列集的并集是可列集.

(5) 可列个可列集的并集是可列集.

(6) 若 A 为无限集, B 为有限集或可列集, 则 $\overline{\overline{A\cup B}}=\overline{\overline{A}}$.

(7) 设 A,B 为可列集, 则 $A\times B$ 是可列集.

(8) 若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 可列, 则 $A_1\times A_2\times\cdots\times A_n$ 可列.

♡

笔记 Show/Hide Note

(1) 也说明, 众多无限集中, 最小的基数是可列集的基数 $\aleph_0$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 A 为无限集. 从 A 中任取一元 a_1; 由于 $A\backslash\{a_1\}\neq\varnothing$, 取 $a_2\in A\backslash\{a_1\}$; 又 $A\backslash\{a_1,a_2\}\neq\varnothing$, 取 $a_3\in A\backslash\{a_1,a_2\}$; ……, 因为 A 是无限集, 这一过程可以一直继续下去, 从而得到 A 的一个可列子集 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$.

(2) 设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n,\cdots\}$. B 是 A 的无限子集. 按照 A 中元素的次序依次寻找 B 中元素, 分别记为 $a_{n_1},a_{n_2},\cdots$, 则 $B=\{a_{n_1},a_{n_2},\cdots,a_{n_k},\cdots\}$ 为可列集.

(3) 设 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$, $B=\{b_1,b_2,\cdots\}$. 不妨设 $A\cap B=\varnothing$, 则

$$A\cup B=\{a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots\}$$

可列.

(4) 设 $A_k=\{a_1^{(k)},a_2^{(k)},a_3^{(k)},\cdots\}$, $k=1,2,\cdots,n$ 为可列集, 则 $\bigcup\limits_{k=1}^{n}A_k$ 的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned}A_1&=\{a_1^{(1)}\quad a_2^{(1)}\quad a_3^{(1)}\quad\cdots\}\\A_2&=\{a_1^{(2)}\quad a_2^{(2)}\quad a_3^{(2)}\quad\cdots\}\\&\vdots\\A_n&=\{a_1^{(n)}\quad a_2^{(n)}\quad a_3^{(n)}\quad\cdots\}\end{aligned}$$

必要时删掉后续的重复元 (实际上, 取集合后就自动删去了重复元, 因为集合内不含重复元), 可得到

$$\bigcup_{k=1}^{n}A_k=\{a_1^{(1)},\cdots,a_1^{(n)},a_2^{(1)},\cdots,a_2^{(n)},a_3^{(1)},\cdots\}$$

可列.

(5) 设 $\{A_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列可列集, 则 $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}A_n$ 的元素可以按下面的方式编号排序

$$\begin{aligned}A_1&=\{a_1^{(1)}\to a_2^{(1)}\to a_3^{(1)}\to a_4^{(1)}\cdots\}\\A_2&=\{a_1^{(2)}\quad a_2^{(2)}\quad a_3^{(2)}\quad a_4^{(2)}\cdots\}\\A_3&=\{a_1^{(3)}\quad a_2^{(3)}\quad a_3^{(3)}\quad a_4^{(3)}\cdots\}\\&\vdots\\A_n&=\{a_1^{(n)}\quad a_2^{(n)}\quad a_3^{(n)}\quad a_4^{(n)}\cdots\}\\&\vdots\end{aligned}$$

必要时删掉后续的重复元 (实际上, 取集合后就自动删去了重复元, 因为集合内不含重复元), 可得到

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{a_1^{(1)}, a_1^{(2)}, a_2^{(1)}, \cdots, a_{2n+1}^{(1)}, a_{2n}^{(2)}, \cdots, a_{2n+1}^{(n)}, \cdots\}$$

(依次是下标之和等于 $2, 3, \cdots, 2n+2, \cdots$) 可列.

(6) 证法一:不妨设 $A \cap B = \varnothing$, 否则用 $B \backslash A$ 代替 B 即可. A 为无限集, 由 (1) 可知, A 包含一个可列子集 A_1. 由于 $A_1 \cup B$ 是可列集, 故 $A_1 \cup B \sim A_1$. 注意到 $(A \backslash A_1) \cap (A_1 \cup B) = \varnothing$, 则有

$$A \cup B = (A \backslash A_1) \cup A_1 \cup B = (A \backslash A_1) \cup (A_1 \cup B) \sim (A \backslash A_1) \cup A_1 = A.$$

因此, $\overline{\overline{A \cup B}} = \overline{\overline{A}}$.

证法二:不妨设 $B = \{b_1, b_2, \cdots\}, A \cap B = \varnothing$, 且

$$A = A_1 \cup A_2, \quad A_1 = \{a_1, a_2, \cdots\}.$$

我们作映射 f 如下:

$$f(a_i) = a_{2i}, \quad a_i \in A_1;$$
$$f(b_i) = a_{2i-1}, \quad b_i \in B;$$
$$f(x) = x, \quad x \in A_2.$$

显然,f 是 $A \cup B$ 到 A 上的双射.

(7) 由命题 1.12可设 $A = \{x_i\}_{i=1}^{\infty}, B = \{y_i\}_{i=1}^{\infty}$, 则

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A, y \in B\} = \bigcup_{x \in A} \{(x, y) : y \in B\}$$
$$= \bigcup_{x \in A} \bigcup_{y \in B} (x, y) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j).$$

由(5)可知, 对 $\forall i \in \mathbb{N}, \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$ 都可列. 于是再由(5)可知 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} (x_i, y_j)$ 也可列.

(8) 利用 (7) 及数学归纳法不难证明.

□

例题 1.9 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

证明 Show/Hide Proof

$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^-$, 其中 $\mathbb{Q}^+, \mathbb{Q}^-$ 分别表示正、负有理数集. 由对称性以及可列集的性质 (3)和可列集的性质 (4), 只需证明 $\mathbb{Q}^+$ 可列.

对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令

$$A_n = \left\{\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \cdots\right\}$$

则 A_n 可列. 又 $\mathbb{Q}^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$(除去重复元), 由可列集性质 (5)知 $\mathbb{Q}^+$ 可列.

□

命题 1.13

实轴 $\mathbb{R}$ 上互不相交的开区间至多有可列个.

证明 Show/Hide Proof

开区间的长度大于 0, 故必含有有理数, 在每一个开区间内取出一个有理数. 因为开区间互不相交, 所以取出的有理数都不相等, 从而这些有理数构成 $\mathbb{Q}$ 的一个子集. 又 $\mathbb{Q}$ 是可列集, 故这样的开区间至多有可列个.

□

例题 1.10 整系数多项式的全体 $\mathbb{P}$ 是可列集.

证明 Show/Hide Proof

对每个 $n \in \{0\} \cup \mathbb{N}$, 令

$$P_n = \{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n : a_i \in \mathbb{Z}, i = 0, 1, \cdots, n, a_0 \neq 0\}$$

则

$$P_n \sim \mathbb{Z} - \{0\} \times \underbrace{\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}}_{n}$$

由命题 1.12(8)知 P_n 可列. 又 $\mathbb{P} = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_n$, 由可列集性质知 $\mathbb{P}$ 可列.

整系数多项式的根称为代数数, 由于每个多项式只有有限个根, 故代数数的全体构成一可列集.

□

命题 1.14

$\mathbb{R}$ 上单调函数的间断点至多有可列个.

♠

证明 Show/Hide Proof

不妨只讨论 f 是开区间 (a, b) 上的单调增加函数, 且有无限多个间断点.

若 $x_0 \in (a, b)$ 是 f 的一个间断点, 则有 $f(x_0^-) < f(x_0^+)$. 这时 f 在点 x_0 的函数值满足不等式 $f(x_0^-) \leqslant f(x_0) \leqslant f(x_0^+)$. 称 $(f(x_0^-), f(x_0^+))$ 为与间断点 x_0 对应的一个跳跃区间. 对 f 的每一个间断点都可以得到一个跳跃区间. 我们要证明, 任何两个不同的间断点所对应的跳跃区间必不相交.

设 x_1 是 f 的另一个间断点, 且 $x_0 < x_1$. 我们要证明

$$(f(x_0^-), f(x_0^+)) \cap (f(x_1^-), f(x_1^+)) = \varnothing. \tag{1.4}$$

为此在 x_0 和 x_1 之间插入 x, x' 如下:

$$x_0 < x < x' < x_1$$

则有不等式

$$f(x) \leqslant f(x')$$

固定 x', 令 $x \to x_0^+$, 由单调函数的单侧极限存在定理和函数极限的保不等式性, 得到

$$f(x_0^+) \leqslant f(x')$$

再令 $x' \to x_1^-$, 又得到

$$f(x_0^+) \leqslant f(x_1^-)$$

于是得到

$$f(x_0^-) < f(x_0^+) \leqslant f(x_1^-) < f(x_1^+)$$

即所要证明的 (1.4). 这样就得到与无限多个间断点一一对应的跳跃区间, 且两两不交. 而由命题 1.13可知这些跳跃区间至多有可列个. 这就证明了单调函数的间断点至多有可列个.

□

定理 1.13

$(0, 1], [0, 1]$ 都是不可列集.

♡

证明 Show/Hide Proof

证法一: 只需讨论 $(0, 1]$. 为此, 采用二进位制小数表示法:

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n},$$

其中 a_n 等于 0 或 1, 且在表示式中有无穷多个 a_n 等于 1. 显然,$(0, 1]$ 与全体二进位制小数一一对应.

若在上述表示式中把 $a_n = 0$ 的项舍去, 则得到 $x = \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-n_i}$, 这里的 $\{n_i\}$ 是严格上升的自然数数列. 再令

$$k_1 = n_1, \quad k_i = n_i - n_{i-1}, \quad i = 2, 3, \cdots,$$

则 $\{k_i\}$ 是自然数子列. 把由自然数构成的数列的全体记为 $\mathscr{H}$, 则 $(0, 1]$ 与 $\mathscr{H}$ 一一对应.

现在假定 $(0, 1]$ 是可数的, 则 $\mathscr{H}$ 是可数的, 不妨将其全体排列如下:

$$\begin{aligned}
&(k_1^{(1)}, k_2^{(1)}, \cdots, k_i^{(1)}, \cdots),\\
&(k_1^{(2)}, k_2^{(2)}, \cdots, k_i^{(2)}, \cdots),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\
&(k_1^{(i)}, k_2^{(i)}, \cdots, k_i^{(i)}, \cdots),\\
&\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots
\end{aligned}$$

但这是不可能的, 因为 $(k_1^{(1)} + 1, k_2^{(2)} + 1, \cdots, k_i^{(i)} + 1, \cdots)$ 属于 $\mathscr{H}$, 而它并没有被排列出来. 这说明 $\mathscr{H}$ 是不可数的, 也就是说 $(0, 1]$ 是不可数集.

证法二:假设 $[0, 1]$ 可列, 则可表示为 $[0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. 把 $[0, 1]$ 三等分为: $[0, 1/3]$, $[1/3, 2/3]$, $[2/3, 1]$, 则其中至少有一个闭区间不包含 x_1, 记该区间为 I_1, 则 $x_1 \notin I_1$; 把 I_1 三等分, 则其中至少有一个闭区间不包含 x_2, 记该区间为 I_2, 则 $x_2 \notin I_2$, $I_2 \subset I_1$; $\cdots\cdots$, 依次做下去, 可得到一列闭区间 $\{I_n\}$ 满足:

(i) $I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$;

(ii) $x_n \notin I_n, n \in \mathbb{N}$;

(iii) I_n 的长度为 $1/3^n \to 0, n \to \infty$.

由闭区间套定理, 存在 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$. 由于 $\xi \in [0, 1] = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则必存在 $n_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $\xi = x_{n_0}$. 而 $x_{n_0} \notin I_{n_0}$, 这与 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 矛盾.

□

定义 1.21 ($\mathbb{R}$ 的基数)

我们称 $(0, 1]$ 的基数为**连续基数**, 记为 c 或 $\aleph_1$ 或 $\aleph$.

♣

定理 1.14

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 都有 $\overline{\overline{[a, b]}} = \overline{\overline{(a, b)}} = \overline{\overline{(a, b]}} = \overline{\overline{\mathbb{R}}} = \aleph$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall a, b \in \mathbb{R}$, 映射 $f(x) = a + (b - a)x$ 建立了 $[0, 1]$ 与 $[a, b]$ 之间的一一对应, 故 $\overline{\overline{[a, b]}} = \aleph$. 又 (a, b) 和 $(a, b]$ 与 $[a, b]$ 分别只差一个点和两个点, 由可列集的性质 (6)知 $\overline{\overline{(a, b)}} = \overline{\overline{(a, b]}} = \overline{\overline{[a, b]}} = \aleph$. 最后, 由例题 1.8以及刚证明的结论可得, $\overline{\overline{\mathbb{R}}} = \overline{\overline{[-1, 1]}} = \aleph$.

□

推论 1.1

无理数的基数为 $\aleph$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记无理数集为 $\mathbf{I}$, 注意到 $\mathbf{I} \cup \mathbb{Q} = \mathbb{R}$, 且 $\mathbb{Q}$ 可列, 由可列集的性质 (6)可得 $\overline{\overline{\mathbf{I}}} = \overline{\overline{\mathbf{I} \cup \mathbb{Q}}} = \overline{\overline{\mathbb{R}}} = \aleph$.

□

定理 1.15

设有集合列 $\{A_n\}$. 若对每个 n 都有 $\overline{\overline{A_n}} = \aleph$, 则 $\overline{\overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n}} = \aleph$.

♡

证明 Show/Hide Proof

不妨假定 $A_i \cap A_j = \varnothing (i \neq j)$, 且 $A_k \sim [n, n+1)$, 我们有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \sim [1, +\infty) \sim \mathbb{R}.$$

□

定义 1.22

设 A 为集合, 记 2^A 为 A 的幂集. 若 A 为含有 n 个元素的有限集, 则 2^A 由 1 个空集, C_n^1 个单元素集, C_n^2 个两元素集, $\cdots\cdots$, C_n^n 个 n 元素集, 所以, 2^A 中元素的个数为

$$1 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n = 2^{\overline{\overline{A}}}$$

更一般地, 设 $\overline{\overline{A}} = \mu$, 定义 $\overline{\overline{2^A}} = 2^{\mu}$.

♣

命题 1.15

设 A, B 都是非空集合, 则 $A \sim B$ 的充要条件是 $2^A \sim 2^B$.

♠

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由 $A \sim B$ 可知 $\overline{\overline{A}} = \overline{\overline{B}}$. 于是 $\overline{\overline{2^A}} = 2^{\overline{\overline{A}}} = 2^{\overline{\overline{B}}} = \overline{\overline{2^B}}$. 故 $2^A \sim 2^B$.

充分性: 假设 A 与 B 不对等, 则不妨设 $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$, 则 $\overline{\overline{2^A}} = 2^{\overline{\overline{A}}} > 2^{\overline{\overline{B}}} = \overline{\overline{2^B}}$, 这与 $2^A \sim 2^B$ 矛盾! 故 $A \sim B$.

□

引理 1.2

设 A 是一个非空集合, 则 A 上所有特征函数的全体 $\mathcal{F}_A$ 与 2^A 对等, 即 $\mathcal{F}_A \sim 2^A$. 进而 $\overline{\overline{\mathcal{F}_A}} = \overline{\overline{2^A}} = 2^{\overline{\overline{A}}}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对于每个 $E \in 2^A$, 可以唯一的对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in A - E \end{cases}$$

反之亦然. 这说明 A 上所有特征函数的全体 $\mathcal{F}_A$ 与 2^A 对等.

□

定理 1.16

$\aleph = 2^{\aleph_0}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

用 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 表示 $\mathbb{N}$ 上特征函数的全体, 只需证 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 与 $(0, 1]$ 对等.

对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}$, 作映射

$$f : \varphi \to \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varphi(n)}{3^n}, \varphi(n) \in \{0, 1\}.$$

易知, f 是从 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 到 $(0, 1]$ 的单射, 故命题 1.18可知 $\overline{\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}} \leqslant \overline{\overline{(0, 1]}}$.

另一方面, 对每一个 $x \in (0,1]$, 用 2 进制表示为 (不进位)

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, a_n \in \{0,1\}.$$

定义映射

$$g : x \to \varphi \in \mathcal{F}_{\mathbb{N}}, \quad \varphi(n) = a_n, \quad n = 1, 2, \cdots$$

易知, g 是从 $(0,1]$ 到 $\mathcal{F}_{\mathbb{N}}$ 的单射, 故由命题 1.18可知 $\overline{\overline{(0,1]}} \leqslant \overline{\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}}$.

由Bernstein 定理可知 $\overline{\overline{(0,1]}} = \overline{\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}}$. 再由引理 1.2可得 $\aleph = \overline{\overline{(0,1]}} = \overline{\overline{\mathcal{F}_{\mathbb{N}}}} = \overline{\overline{2^{\mathbb{N}}}} = 2^{\aleph_0}$.

□

例题 1.11 $\mathbb{R}^2 \sim \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.16及命题 1.15和 $\mathbb{N} \sim \mathbb{Z} - \mathbb{N}$ 可知 $\mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z}-\mathbb{N}}$, 故再由命题 1.10可得 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \sim 2^{\mathbb{N}} \times 2^{\mathbb{Z}-\mathbb{N}} \sim 2^{\mathbb{Z}} \sim 2^{\mathbb{N}} \sim \mathbb{R}$.

□

例题 1.12 用 M 表示 $[0,1]$ 上实值有界函数的全体, 则 $\overline{\overline{M}} = 2^{\aleph}$.

证明 Show/Hide Proof

设 E 为 $[0,1]$ 的任一子集, 则 E 唯一对应一个特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E \\ 0, & x \in [0,1] - E \end{cases}$$

显然, $\chi_E \in M$. 故 $\overline{\overline{M}} \geqslant \overline{\overline{2^{[0,1]}}} = 2^{\aleph}$.

另一方面, 对每一个 $f \in M$, 其图像 $\{(x, f(x)) : x \in [0,1]\}$ 为平面上的一有界子集, 两者构成一一对应关系, 故 $\overline{\overline{M}} \leqslant \overline{\overline{2^{\mathbb{R}^2}}} = \overline{\overline{2^{\mathbb{R}}}} = 2^{\aleph}$. 由伯恩斯坦定理, $\overline{\overline{M}} = 2^{\aleph}$.

□

定理 1.17 (无最大基数定理)

若 A 是非空集合, 则 A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$(由 A 的一切子集所构成的集合族) 不对等, 即 $\overline{\overline{A}} < \overline{\overline{\mathcal{P}(A)}}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

假定 A 与其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 对等, 即存在一一映射 $f : A \to \mathcal{P}(A)$. 我们作集合

$$B = \{x \in A : x \notin f(x)\},$$

于是有 $y \in A$, 使得 $f(y) = B \in \mathcal{P}(A)$. 现在分析一下 y 与 B 的关系:

(i) 若 $y \in B$, 则由 B 的定义可知 $y \notin f(y) = B$;

(ii) 若 $y \notin B$, 则由 B 的定义可知 $y \in f(y) = B$.

这些矛盾说明 A 与 $\mathcal{P}(A)$ 之间并不存在一一映射, 即 A 与 $\mathcal{P}(A)$ 并不是对等的. 集合 A 的基数小于其幂集 $\mathcal{P}(A)$ 的基数是显然的.

□

1.5 集类. 环、σ 环、代数、σ 代数、单调类

定义 1.23

设 X 为取定的集合, 以 X 的某些子集为元素所成的集称为 X 上的**集类**. 而 X 称为**基本空间**. 集类用花体大写字母或希腊字母表示. 例如:$\mathscr{A}, \mathscr{B}, \mathscr{C}, \mathscr{D}, \mathscr{E}, \mathscr{F}, \mathscr{R}$;$\tau, \mu, \nu$ 等.

♣

定义 1.24

设 X 为一个集合,$\mathscr{R}$ 为 X 上的一个非空集类, 如果对 $\forall E_1, E_2 \in \mathscr{R}$, 都有

$$E_1 \cup E_2 \in \mathscr{R}, \quad E_1 \setminus E_2 \in \mathscr{R},$$

则称 $\mathscr{R}$ 为 X 上的一个**环**. 特别地, 如果还有 $X \in \mathscr{R}$, 就称 $\mathscr{R}$ 为 X 上的一个**代数**, 或称为**域**.

如果对任何 $E, F \in \mathscr{R}$, 有 $E \setminus F \in \mathscr{R}$; 且对任何一列 $E_i \in \mathscr{R}(i = 1, 2, \cdots)$, 都有

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathscr{R},$$

则称 $\mathscr{R}$ 为 X 上的一个 **σ 环**. 如果还有 $X \in \mathscr{R}$, 则称 $\mathscr{R}$ 为 X 上的 **σ 代数**, 或称为 **σ 域**.

♣

注 设 $\mathscr{R}$ 为 X 上的 σ 代数, 对 $\forall E_1, E_2 \in \mathscr{R}$, 取 $E_i = E_2 (i \geqslant 3)$, 则 $E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathscr{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathscr{R}$. 所以,**$\sigma$ 环必为环,σ 代数必为代数.**

由定义可知, 环是对集的 “$\cup$” 及 “$\setminus$” 运算封闭的非空集类. 而代数是对 “余或补” 运算也封闭的环 (因为 $\mathscr{R}$ 为非空集类, 故有 $E \in \mathscr{R}$, 从而 $E^c = X \setminus E \in \mathscr{R}$).$\sigma$ 环是对集的 “$\bigcup_{i=1}^{\infty}$” 及 “$\setminus$” 运算封闭的非空集类. 而 σ 代数是对 “余或补” 运算也封闭的 σ 环.

定理 1.18

设 $\mathscr{R}$ 为环, 则

(1) 空集 $\varnothing \in \mathscr{R}$.

(2) $\mathscr{R}$ 对 “$\cap$” 运算封闭.

(3) 如果 $E_i \in \mathscr{R}(i = 1, 2, \cdots, n)$, 则 $\bigcup_{i=1}^{n} E_i \in \mathscr{R}$.

(4) 设 $\mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为环 (代数), 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$ 仍为环 (代数).

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因环 $\mathscr{R}$ 为非空集类, 故 $\exists E \in \mathscr{R}$, 根据环的定义有 $\varnothing = E \setminus E \in \mathscr{R}$.

(2) 设 $E_1, E_2 \in \mathscr{R}$, 则

$$E_1 \cap E_2 = (E_1 \cup E_2) \setminus (E_1 \setminus E_2) \setminus (E_2 \setminus E_1) \in \mathscr{R}.$$

(3) 由环对 “$\cup$” 封闭和归纳法立即推得.

(4) 设 $E_1, E_2 \in \mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 由 $\mathscr{R}_\alpha$ 都为环, 故 $E_1 \cup E_2 \in \mathscr{R}_\alpha$, $E_1 \setminus E_2 \in \mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 从而 $E_1 \cup E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$, $E_1 \setminus E_2 \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$, 即 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$ 为环. 进一步, 如果 $\mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为代数, 则 $X \in \mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$, 即 $X \in \bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$. 这说明了 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$ 为代数.

□

定理 1.19

设 $\mathscr{R}$ 为 σ 环, 则:

(1) $\mathscr{R}$ 为环.

(2) $\mathscr{R}$ 对 “$\bigcap_{i=1}^{\infty}$” 运算封闭.

(3) $\mathscr{R}$ 对 “$\overline{\lim\limits_{k \to +\infty}}$”, “$\underline{\lim\limits_{k \to +\infty}}$”, “$\lim\limits_{k \to +\infty}$” 运算封闭.

(4) 设 $\mathscr{R}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$ 为 σ 环 (σ 代数), 则 $\bigcap_{\alpha \in \Gamma} \mathscr{R}_\alpha$ 仍为 σ 环 (σ 代数).

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 $\varnothing = E \setminus E \in \mathscr{R}$, 当 $E_1, E_2 \in \mathscr{R}$ 时, 有

$$E_1 \cup E_2 = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathscr{R},$$

其中 $E_i = \varnothing (i \geqslant 3)$. 从而,$\mathscr{R}$ 为环.

(2) 从

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} E_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \setminus \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \setminus E_i \right) \in \mathscr{R}$$

可看出 $\mathscr{R}$ 对 "$\bigcap_{i=1}^{\infty}$" 运算封闭.

(3) 设 $E_k \in \mathscr{R}, k = 1, 2, \cdots$. 根据定理 1.19(2)和 $\mathscr{R}$ 为 σ 环知

$$\overline{\lim_{k \to +\infty}} E_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathscr{R}, \quad \underline{\lim_{k \to +\infty}} E_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k \in \mathscr{R}.$$

因此,$\mathscr{R}$ 对 "$\overline{\lim_{k \to +\infty}}$", "$\underline{\lim_{k \to +\infty}}$", "$\lim_{k \to +\infty}$" 封闭.

(4) 利用定义, 容易验证.

□

命题 1.16

(1) 设 X 为任意集合,X 的所有子集全体所成的集类 $\mathscr{A} = 2^X$ 为 σ 代数 (当然也为代数).

(2) 设 X 为任意集合,X 的有限子集 (包括空集 $\varnothing$) 全体所成的集类 $\mathscr{A}$ 为一个环. 当且仅当 X 为有限集时,$\mathscr{A}$ 为代数.

(3) 设 X 为任意集合,X 的至多可数集的全体所成的集类 $\mathscr{A}$ 为一个 σ 环. 当且仅当 X 为至多可数集时,$\mathscr{A}$ 为 σ 代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3)

□

例题 1.13 设 $\mathbb{N}$ 为自然数集,$\mathbb{N}$ 的有限子集全体所成的集类 $\mathscr{A}$ 为一个环. 显然,$\mathbb{N} \notin \mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}$ 不是一个代数. 又因 $\bigcup_{i=1}^{\infty} \{i\} = \mathbb{N} \notin \mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}$ 不是一个 σ 代数.

例题 1.14 设 $\mathbb{R}$ 为实数集 (它是不可数集, 即不是至多可数集),$\mathbb{R}$ 的至多可数的子集的全体所成的集类 $\mathscr{A}$ 为 σ 环. 显然,$\mathbb{R} \notin \mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}$ 不是一个 σ 代数.

例题 1.15 设 $\mathbb{N}$ 为自然数集,$\mathbb{N}$ 的有限子集及其余集的全体所成的集类 $\mathscr{A}$ 为一个代数 ($\mathbb{N} = \varnothing^c \in \mathscr{A}$). 显然,$\bigcup_{i=1}^{\infty} \{2i\} = \{2i \mid i \in \mathbb{N}\} \notin \mathscr{A}$, 故 $\mathscr{A}$ 不是一个 σ 环, 从而不是一个 σ 代数.

例题 1.16 设 $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ 为实数集, 则由 $\mathbb{R}^1$ 中的有限个左开右闭的有限区间的并集

$$A = \bigcup_{i=1}^{n} (a_i, b_i]$$

的全体所成的集类 $\mathscr{R}_0$ 为一个环, 但不是代数, 也不是 σ 环.

注 $\mathscr{R}_0$ 中的元素都可表示成有限个两两不相交的左开右闭区间的并, 但表示法并不惟一. 如:$(0, 1] = \left(0, \frac{1}{2}\right] \cup \left(\frac{1}{2}, 1\right] = \left(0, \frac{1}{3}\right] \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right]$.

注 由有限个开区间 (或闭区间) 的并集的全体所组成的集类并不是一个环. 这是因为 $(0, 2) \setminus (0, 1) = [1, 2)$(或 $[0, 2] \setminus$

$[0,1]=(1,2])$ 不是有限个开 (或闭) 区间的并, 故该集类不是一个环.

证明 Show/Hide Proof

显然,$\mathscr{R}_0$ 对运算 "$\cup$" 是封闭的. 再证 $\mathscr{R}_0$ 对运算 "$\setminus$" 也是封闭的. 首先,$\varnothing=(a,a]\in\mathscr{R}_0$. 而任何两个左开右闭区间 $(a,b],(c,d]$ 的差 $(a,b]\setminus(c,d]$ 只可能发生如下 3 种情况:①空集;②左开右闭的区间;③两个不相交的左开右闭区间的并. 任何情况都表明 $(a,b]\setminus(c,d]\in\mathscr{R}_0$. 于是, 对 $\mathscr{R}_0$ 中任何

$$A=\bigcup_{i=1}^{n}(a_i,b_i],\quad B=\bigcup_{j=1}^{m}(c_j,d_j],$$

有

$$A\setminus B=\bigcup_{i=1}^{n}(a_i,b_i]\setminus\bigcup_{j=1}^{m}(c_j,d_j]=\bigcup_{i=1}^{n}((a_i,b_i]\setminus(c_m,d_m])\setminus\bigcup_{j=1}^{m-1}(c_j,d_j].$$

从 $\bigcup_{i=1}^{n}((a_i,b_i]\setminus(c_m,d_m])\in\mathscr{R}_0$ 和数学归纳法知,$A\setminus B\in\mathscr{R}_0$. 而

$$A\cup B=\left(\bigcup_{i=1}^{n}(a_i,b_i)\right)\cup\left(\bigcup_{j=1}^{m}(c_j,d_j]\right)\in\mathscr{R}_0$$

是显然的. 因此,$\mathscr{R}_0$ 为一个环. 因为 $\mathbb{R}^1=\bigcup_{i\in\mathbb{Z}}(i,i+1]\notin\mathscr{R}_0$, 故 $\mathscr{R}_0$ 不是代数, 也不是 σ 环.

□

例题 1.17 当 $a\leqslant b,c\leqslant d$ 时, 称

$$\{(x,y)\mid a<x\leqslant b,c<y\leqslant d\}=(a,b]\times(c,d]\subset\mathbb{R}^2$$

为左下开右上闭的区间 (或矩形). 类似例题 1.16, 由有限个左下开右上闭的区间 (矩形) 的并集全体所成的集类 $\mathscr{R}_0$ 是一个环. 但不是代数, 也不是 σ 环.

对于 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$, 由有限个形如

$$\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid a_i<x_i\leqslant b_i,i=1,2,\cdots,n\}=\bigotimes_{i=1}^{n}(a_i,b_i]\subset\mathbb{R}^n$$

的区间的并集全体所成的集类 $\mathscr{R}_0$ 是一个环. 但不是代数, 也不是 σ 环.

证明 Show/Hide Proof

□

环、σ 环、代数、σ 代数之间的关系如下图所示:




图 1.4

定理 1.20

设 $\mathscr{E}$ 为由集合 X 的某些子集组成的集类, 则存在惟一的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数)$\mathscr{R}$, 使得

(1) $\mathscr{E}\subseteq\mathscr{R}$;

(2) 任何包含 $\mathscr{E}$ 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数)$\mathscr{R}'$ 必有 $\mathscr{R}\subseteq\mathscr{R}'$. 换言之,$\mathscr{R}$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的最小环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数).

这样的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数)$\mathscr{R}$ 称为**由集类 $\mathscr{E}$ 所生成 (或张成) 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数)**, 并用 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$(或 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$, 或 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$, 或 $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$) 表示.

♡

注 设 $\mathscr{E}$ 为非空集类. 易见,$\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 就是由 $\mathscr{E}$ 中任取有限个元素 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 经过有限次 "$\cup$" , "$\setminus$" 运算后所得的集的全体.

显然,$\mathscr{A}(\mathscr{E}) = \mathscr{R}(\mathscr{E} \cup \{X\})$. 也就是说,$\mathscr{A}(\mathscr{E})$ 是由 $\mathscr{E} \cup \{X\}$ 中任取有限个元素 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 经过有限次 "$\cup$" , "$\setminus$" 运算后所得的集的全体.

类似地,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 就是由 $\mathscr{E}$ 中任取至多可数个元素 $E_1, E_2, \cdots, E_n, \cdots$ 经过至多可数次 "$\bigcup_{n=1}^{\infty}$" , "$\setminus$" 运算后所得的集的全体.

显然,$\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E} \cup \{X\})$. 也就是说,$\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$ 是由 $\mathscr{E} \cup \{X\}$ 中任取至多可数个元素 $E_1, E_2, \cdots, E_n, \cdots$ 经过至多可数次 "$\bigcup_{n=1}^{\infty}$" , "$\setminus$" 运算后所得的集的全体.

证明 Show/Hide Proof

首先,X 的子集全体 2^X 是一个环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数). 当然,$\mathscr{E} \subseteq 2^X$. 因此, 包含 $\mathscr{E}$ 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 确实是存在的. 取环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 族

$$\mu = \{\mathscr{R}' \mid \mathscr{E} \subseteq \mathscr{R}' \subseteq 2^X, \mathscr{R}' \text{为环 (或代数、或 } \sigma \text{ 环、或 } \sigma \text{ 代数)}\}.$$

根据定理 1.18(4)(或定理 1.19(4)),

$$\mathscr{R} = \bigcap_{\mathscr{R}' \in \mu} \mathscr{R}'$$

为环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数). 显然, 还有 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{R}$. 由 $\mathscr{R}$ 的定义知, 性质 (2) 成立.

如果环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数)$\widetilde{\mathscr{R}}$ 也满足 (1),(2), 则 $\widetilde{\mathscr{R}} \subseteq \mathscr{R}$. 因为 $\mathscr{R}$ 满足 (1),(2), 故 $\mathscr{R} \subseteq \widetilde{\mathscr{R}}$. 因此,$\widetilde{\mathscr{R}} = \mathscr{R}$. 这就证明了满足 (1),(2) 的环 (或代数、或 σ 环、或 σ 代数) 是惟一的.

□

定理 1.21

$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}(\mathscr{E}))$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \supseteq \mathscr{E}$, 所以 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \supseteq \mathscr{R}(\mathscr{E})$. 由此推得 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \supseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}(\mathscr{E}))$.

反之, 由于 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{R}(\mathscr{E})$, 所以 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}(\mathscr{E}))$. 这就证明了 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}(\mathscr{E}))$.

□

例题 1.18 设 X 为一个非空集合,$\mathscr{E}$ 为 X 的单元素 (独点) 子集全体所成的集类. 则 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 就是 X 的有限子集 (包括空集) 全体所成的集类 (见命题 1.16(2)), 它是一个环. $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 就是 X 的至多可数子集全体所成的集类 (见命题 1.16(3)), 它是一个 σ 环.

如果 X 为有限集, 则 $\mathscr{R}(\mathscr{E}) = \mathscr{A}(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$, 它是 X 的有限子集全体所成的集类, 它是 σ 代数.

如果 $X = \{a_n | n \in \mathbb{N}\}$ 为可数集, 则 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 为 X 的有限子集全体所成的集类, 这是一个环, 不是代数, 也不是 σ 环, 更不是 σ 代数. 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$ 是 X 的至多可数子集的全体所成的集类, 它是 σ 环, 是代数, 是 σ 代数. 易见,X 的有限子集及其余集的全体所成的集类就是 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$, 它是一个代数. 但不是 σ 环 $\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}\{a_{2n}\} = \{a_{2n} | n \in \mathbb{N}\} \notin \mathscr{A}(\mathscr{E})\right)$, 更不是 σ 代数.

如果 X 为不可数集, 则 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 是 X 的有限子集的全体所成的集类, 它是一个环, 不是代数, 不是 σ 环, 更不是 σ 代数.$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 是 X 的至多可数子集的全体所成的集类, 它是 σ 环, 但不是 σ 代数.$\mathscr{A}(\mathscr{E})$ 是 X 的有限子集及其余集的全体所成的集类. 它是代数, 但不是 σ 环 (因为 X 的可数子集 $\bigcup_{n=1}^{\infty}\{a_n\} = \{a_n | n \in \mathbb{N}\} \notin \mathscr{A}(\mathscr{E})$), 更不是 σ 代数.$\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$ 是 X 的至多可数子集及其余集的全体 (未必是 X 的所有子集形成的集类! 例如:$X = \mathbb{R}$, 则 $(-\infty, 0) \notin \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$) 所成的集类. 它是 σ 代数.

例题 1.19 设 $\mathscr{P}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上左开右闭区间 $(a, b](-\infty < a < b < +\infty)$ 全体所成的集类, 则 $\mathscr{R}(\mathscr{P}) = \mathscr{R}_0$(例题 1.16). $\mathscr{A}(\mathscr{P}) = \mathscr{R}(\mathscr{P} \cup \{\mathbb{R}^1\})$(有限个左开右闭区间的并及其余集所形成的集类).

显然,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{P}) = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{P}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0) = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{R}_0)$(因为 $\mathbb{R}^1 = \bigcup\limits_{i\in\mathbb{Z}}(i, i+1]$). 注意:$(-\infty, 0] = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty}(-n, -n+1] \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{P}) \setminus \mathscr{R}(\mathscr{P})$, 所以 $\mathscr{R}(\mathscr{P}) \subsetneq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{P})$.

定理 1.22

设 X 为非空集合,$\mathscr{R}$ 为 X 上的一个集类, 则 $\mathscr{R}$ 为 σ 代数的充要条件是同时满足以下条件

(1) $\varnothing \in \mathscr{R}$;

(2) 若 $E \in \mathscr{R}$, 则 $E^c \in \mathscr{R}$;

(3) 若 $E_i \in \mathscr{R}, i = 1, 2, \cdots$, 则 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} E_i \in \mathscr{R}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 因为 $\mathscr{R}$ 为 σ 代数, 故 $\mathscr{R}$ 为非空集类, 从而 $\exists E \in \mathscr{R}$. 由此得到 $\varnothing = E \setminus E \in \mathscr{R}$. 这就证明了 (1).

因为 $\mathscr{R}$ 为 σ 代数, 故 $X \in \mathscr{R}$. 如果 $E \in \mathscr{R}$, 根据 $\mathscr{R}$ 为环, 所以 $E^c = X \setminus E \in \mathscr{R}$. 这就证明了 (2).

(3) 就是 σ 代数定义的第 1 条.

($\Leftarrow$) 从右边条件 (1),(2) 立知,$X = \varnothing^c \in \mathscr{R}$. 右边条件 (3) 就是 σ 代数定义中的第 1 个条件.

如果 $E_1, E_2 \in \mathscr{R}$, 由右边条件 (2) 知,$E_1^c, E_2^c \in \mathscr{R}$. 于是, 由 (1),(2),(3) 得到

$$\begin{aligned} E_1 \setminus E_2 = E_1 \cap E_2^c &= \left((E_1 \cap E_2^c)^c\right)^c = \left(E_1^c \cup E_2\right)^c \\ &= \left(E_1^c \cup E_2 \cup \varnothing \cup \varnothing \cup \cdots\right)^c \in \mathscr{R}. \end{aligned}$$

综上所述,$\mathscr{R}$ 为 σ 代数.

□

定义 1.25 (单调类)

设 $\mathscr{M}$ 为由 X 的某些子集所成的集类、如果对 $\mathscr{M}$ 中任何单调集列 $\{E_n\}$, 都必有 $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n \in \mathscr{M}$, 则称 $\mathscr{M}$ 为**单调类**. 因此, 单调类就是对单调集列的极限运算封闭的集类.

♣

例题 1.20 设 $X = \mathbb{R}^1$, 则 $\mathscr{M} = \{[0,1], [2,3]\}$ 为单调类 ($\mathscr{M}$ 中任何单调类 $\{E_n\}$, 必有 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $E_n = [0,1]$. 因此, $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n = [0,1] \in \mathscr{M}$; 或者, 必有 $n_0 \in \mathbb{N}$, 当 $n > n_0$ 时, 有 $E_n = [2,3]$. 因此, $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n = [2,3] \in \mathscr{M}$). 但 $\mathscr{M}$ 对 "$\cup$" 不封闭 ($[0,1] \cup [2,3] \notin \mathscr{M}$), 故 $\mathscr{M}$ 不为环.

定理 1.23

设 $\mathscr{M}_\alpha$ 为单调类,$\alpha \in \Gamma$, 则 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} \mathscr{M}_\alpha$ 也为单调类.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{E_n\}$ 为 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} \mathscr{M}_\alpha$ 中的单调集列, 则它也是 $\mathscr{M}_\alpha$ 中的单调集列. 根据单调类的定义, $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n \in \mathscr{M}_\alpha (\alpha \in \Gamma)$. 所以, $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n \in \bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} \mathscr{M}_\alpha$. 这就证明了 $\bigcap\limits_{\alpha\in\Gamma} \mathscr{M}_\alpha$ 也为单调类.

□

定理 1.24

设 $\mathscr{E}$ 是由集合 X 的某些子集所成的集类, 则存在惟一的单调类 $\mathscr{M}$, 使得

(1) $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{M}$;

(2) 任何包含 $\mathscr{E}$ 的单调类 $\mathscr{M}'$, 必有 $\mathscr{M} \subseteq \mathscr{M}'$.

换言之,$\mathscr{M}$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的最小单调类. 这样的单调类 $\mathscr{M}$ 称为**由集类 $\mathscr{E}$ 所张成的单调类**, 记作 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先,X 的子集的全体 2^X 是一个单调类, 当然,$\mathscr{E} \subseteq 2^X$. 因此, 包含 $\mathscr{E}$ 的单调类确实是存在的. 取单调类族

$$\Gamma = \{\mathscr{M}' \mid \mathscr{E} \subseteq \mathscr{M}' \subseteq 2^X, \mathscr{M}' \text{为单调类}\}.$$

根据定理 1.23,$\mathscr{M} = \bigcap\limits_{\mathscr{M}' \in \Gamma} \mathscr{M}'$ 为单调类. 显然, 还有 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{M}$, 故 $\mathscr{M}$ 满足 (1). 由 $\mathscr{M}$ 的定义知, 性质 (2) 成立.

如果单调类 $\widetilde{\mathscr{M}}$ 也满足 (1),(2), 则 $\widetilde{\mathscr{M}} \subseteq \mathscr{M}$. 因为 $\mathscr{M}$ 满足 (1),(2), 故 $\mathscr{M} \subseteq \widetilde{\mathscr{M}}$. 所以,$\widetilde{\mathscr{M}} = \mathscr{M}$. 这就证明了满足 (1),(2) 的单调类是惟一的.

□

定理 1.25

设 $\mathscr{M}$ 为集合 X 的集类. 则 $\mathscr{M}$ 为 σ 环 $\Longleftrightarrow$ $\mathscr{M}$ 为单调环 (既是单调类又是环).

♡

证明 Show/Hide Proof

($\Rightarrow$) 由 σ 环定义知,σ 环 $\mathscr{M}$ 对 "$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}$" 运算封闭. 再由定理 1.19(2),$\sigma$ 环 $\mathscr{M}$ 对 "$\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}$" 运算也封闭. 再根据 $\mathscr{M}$ 的单调增 (减) 集列 $\{E_n\}$ 的极限的定义知 $\lim\limits_{n\to+\infty} E_n = \bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n$(或 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} E_n$) $\in \mathscr{M}$. 故 $\mathscr{M}$ 为单调类, 又因为 $\mathscr{M}$ 为 σ 环, 所以 $\mathscr{M}$ 为单调环.

($\Leftarrow$) 设 $\mathscr{M}$ 为单调环, 即 $\mathscr{M}$ 既是单调类又是环. 要证 $\mathscr{M}$ 为 σ 环, 只须证 $\mathscr{M}$ 对 "$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}$" 运算封闭. 事实上, 对 $\forall E_n \in \mathscr{M}(n = 1, 2, \cdots)$, 由于 $\mathscr{M}$ 为一个环, 所以 $\bigcup\limits_{i=1}^{n} E_i \in \mathscr{M}$. 而 $\{\bigcup\limits_{i=1}^{n} E_i \mid n \in \mathbb{N}\}$ 为单调增集列, 因此

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i \right) = \lim_{n\to+\infty} \bigcup_{i=1}^{n} E_i \overset{\text{单调类定义}}{\in} \mathscr{M}.$$

□

定理 1.26

设 $\mathscr{E}$ 为集合 X 的某些子集所成的环, 则 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{M}(\mathscr{E})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的 σ 环, 根据定理 1.25, 它是单调类. 但 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的最小单调类, 所以 $\mathscr{M}(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$.

下面可以证明 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为环. 于是,$\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为一个单调环. 根据定理 1.25,$\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为 σ 环. 但 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 是包含 $\mathscr{E}$ 的最小 σ 环, 因此 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 这就证明了 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{M}(\mathscr{E})$.

现在来证明 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为一个环. 对 $\forall E \subseteq X$, 作集类

$$\mathscr{K}(E) = \{F \mid F \in \mathscr{M}(\mathscr{E}), \text{且 } F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathscr{M}(\mathscr{E})\}.$$

先证 $\mathscr{K}(E)$ 为单调类. 事实上, 设 $\{F_n\}$ 为 $\mathscr{K}(E)$ 中的任一单调集列. 因为 $F_n \setminus E, E \setminus F_n, E \cup F_n \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 且 $\{F_n \setminus E\}, \{E \setminus F_n\}, \{E \cup F_n\}$ 都仍为单调集列. 于是

$$\lim_{n\to+\infty} F_n \setminus E = \lim_{n\to+\infty} (F_n \setminus E) \in \mathscr{M}(\mathscr{E}),$$

$$E \setminus \lim_{n\to+\infty} F_n = \lim_{n\to+\infty} (E \setminus F_n) \in \mathscr{M}(\mathscr{E}),$$

$$E \cup \lim_{n\to+\infty} F_n = \lim_{n\to+\infty} (E \cup F_n) \in \mathscr{M}(\mathscr{E}).$$

由此与 $\{F_n\}$ 为 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 中的单调集列知, $\lim\limits_{n\to+\infty} F_n \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$, $\lim\limits_{n\to+\infty} F_n \in \mathscr{K}(E)$. 这就证明了 $\mathscr{K}(E)$ 为单调类.

特别, 当 $E \in \mathscr{E} \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$ 时, 由于 $\mathscr{E}$ 为环, 故 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{K}(E) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 又因为 $\mathscr{K}(E)$ 为包含 $\mathscr{E}$ 的单调类, 从而 $\mathscr{M}(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{K}(E)$. 因此,$\mathscr{K}(E) = \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 这就表明: 当 $E \in \mathscr{E}$ 时, 对 $\forall F \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 总有 $F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$.

对 $\forall E \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 根据上述证明, 当 $F \in \mathscr{E}$ 时,$E \setminus F, F \setminus E, E \cup F \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$, 从而 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{K}(E) \subseteq \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 但 $\mathscr{K}(E)$ 为包含 $\mathscr{E}$ 的单调类, 所以, 包含 $\mathscr{E}$ 的最小单调类 $\mathscr{M}(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{K}(E)$. 由此得到 $\mathscr{K}(E) = \mathscr{M}(\mathscr{E})$.

对 $\forall E, F \in \mathscr{M}(\mathscr{E}) = \mathscr{K}(E)$, 由 $F \in \mathscr{K}(E)$ 知,$F \setminus E, E \setminus F, E \cup F \in \mathscr{M}(\mathscr{E})$. 这就证明了 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为环.

□

推论 1.2

设 $\mathscr{M}, \mathscr{E}$ 为集合 X 上的两个集类. 如果 $\mathscr{M}$ 为单调类,$\mathscr{E}$ 为环, 且 $\mathscr{M} \supseteq \mathscr{E}$, 则 $\mathscr{M} \supseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathscr{E}$ 为环, 根据定理 1.26,$\mathscr{M}(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$. 再由 $\mathscr{M}$ 为包含 $\mathscr{E}$ 的单调类, 而 $\mathscr{M}(\mathscr{E})$ 为包含 $\mathscr{E}$ 的最小单调类. 从定理 1.20知,$\mathscr{M} \supseteq \mathscr{M}(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$.

□

例题 1.21 设 $\mathscr{E}$ 为集合 X 上的一个非空集类. 证明: 对 $\forall F \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$, 必 $\exists E_i \in \mathscr{E} (i = 1, 2, \cdots)$,s.t. $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$.

证明 Show/Hide Proof

设 X 上的集类

$$\mathscr{R} = \{F \mid F \subseteq X, \exists E_i \in \mathscr{E},\ i = 1, 2, \cdots, \text{s.t. } F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\},$$

则 $\mathscr{R}$ 为 X 上的一个 σ 环. 事实上, 对 $\forall F_i \in \mathscr{R}, i = 1, 2, \cdots$, 必有 $E_{ij} \in \mathscr{R}, j = 1, 2, \cdots$,s.t. $F_i \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij}$. 于是

$$F_1 \setminus F_2 \subseteq F_1 \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{1j}, \quad F_1 \setminus F_2 \in \mathscr{R},$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_{ij} \right), \quad \bigcup_{i=1}^{\infty} F_i \in \mathscr{R}.$$

因此,$\mathscr{R}$ 为 X 上包含 $\mathscr{E}$ 的一个 σ 环. 又因为 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 为包含 $\mathscr{E}$ 的最小 σ 环, 故 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{R}$. 从而, 对 $\forall F \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$, 必 $\exists E_i \in \mathscr{E}, i = 1, 2, \cdots$,s.t. $F \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$.

□

命题 1.17

设 X 为集合,$\mathscr{E}$ 为 X 上的集类. 证明:

(1) $\mathscr{A}(\mathscr{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}$.

(2) $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 设 $E \in \mathscr{R}(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{A}(\mathscr{E})$, 因 $X \in \mathscr{A}(\mathscr{E})$, 故 $X \setminus E \in \mathscr{A}(\mathscr{E})$. 于是

$$\{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\} \subseteq \mathscr{A}(\mathscr{E}).$$

反之, 下证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}$ 为含 $\mathscr{E}$ 的代数, 而 $\mathscr{A}(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{E}$ 的最小代数. 因此

$$\mathscr{A}(\mathscr{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathscr{A}(\mathscr{E}) = \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}.$$

剩下的欲证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}$ 为含 $\mathscr{E}$ 的代数. 含 $\mathscr{E}$ 是显然的, 而 $X = X \setminus \varnothing \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}$, 故只需证 $\{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\}$ 为一个环. 事实上, 对于 $\forall A, B \in \mathscr{R}(\mathscr{E})$, 由定理 1.18有

$$A \cup B, A \setminus B \in \mathscr{R}(\mathscr{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\},$$

$$(X \setminus A) \cup (X \setminus B) = X \setminus A \cap B \in \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\},$$

$$(X \setminus A) \setminus (X \setminus B) = B \setminus A \in \mathscr{R}(\mathscr{E}) \subseteq \{E, X \setminus E \mid E \in \mathscr{R}(\mathscr{E})\},$$

$$(X\setminus B)\cup A = X\setminus(B\setminus A)\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\},$$
$$(X\setminus B)\setminus A = X\setminus(A\cup B)\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\},$$
$$A\setminus(X\setminus B) = A\cap B\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\subseteq\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\}.$$

这就证明了 $\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\}$ 为一个环.

(2) 设 $E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\subseteq\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$, 因 $X\in\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$, 故 $X\setminus E\in\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$. 于是

$$\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}\subseteq\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E}).$$

反之, 下证 $\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$ 为含 $\mathscr{E}$ 的 σ 代数, 而 $\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{E}$ 的最小 σ 代数. 因此

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E})\subseteq\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}.$$

综合上述, 有

$$\mathscr{A}_\sigma(\mathscr{E}) = \{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}.$$

剩下的欲证 $\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$ 为含 $\mathscr{E}$ 的代数. 含 $\mathscr{E}$ 是显然的, 而 $X = X\setminus\varnothing\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$, 故只需证 $\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$ 为一个 σ 环. 事实上, 对于 $\forall A, B, A_n, B_n (n\in\mathbb{N})\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$, 有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n, A\setminus B\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\subseteq\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\},$$
$$\bigcup_{n=1}^{\infty}(X\setminus A_n)\xlongequal{\text{DeMorgan 公式}}X\setminus\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\},$$
$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}(X\setminus A_n)\right)\cup\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right) = \left(X\setminus\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\right)\cup\left(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)$$
$$= X\setminus\left(\bigcap_{n=1}^{\infty}A_n\setminus\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\right)\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\},$$
$$(X\setminus A)\setminus(X\setminus B) = B\setminus A\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\subseteq\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\},$$
$$(X\setminus B)\setminus A = X\setminus(A\cup B)\in\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\},$$
$$A\setminus(X\setminus B) = A\cap B\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\subseteq\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}.$$

这就证明了 $\{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\}$ 为一个 σ 环.

□

例题 1.22 设 X 为集合,$\mathscr{E}$ 为 X 上的非空集类. 在下列各种情况下分别求出 $\mathscr{R}(\mathscr{E}), \mathscr{A}(\mathscr{E})$:

(1) $\mathscr{E} = \{E_1, E_2, \cdots, E_n\}$.

(2) $X = \mathbb{R}^1$(实数直线),$\mathscr{E} = \{(a, b) \mid -\infty < a < b < +\infty\}$.

(3) $X = \mathbb{R}^1$,$\mathscr{E} = \{(-\infty, a) \mid a\in\mathbb{R}\}$.

解 Show/Hide Solution

(1) $\mathscr{R}(\mathscr{E}) = \{$ 由 $E_1, E_2, \cdots, E_n$ 中若干元素通过“$\cup$”,“$\setminus$”的有限次运算得到的集合 $\}$.

$$\mathscr{A}(\mathscr{E}) = \left\{E_1, E_2, \cdots, E_n\text{以及}X\text{中若干元素通过}\cup, \setminus\text{的有限次运算得到的集合}\right\}$$
$$\xlongequal{\text{命题 1.17}}\{e, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\}$$

(2) 由 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 的定义知,$\mathscr{E}\subseteq\mathscr{R}(\mathscr{E})$. 进而, 当 $a < c < b < d$ 时, 有

$$(a, b)\setminus(c, d) = (a, c]\in\mathscr{R}(\mathscr{E}),$$
$$(c, d)\setminus(a, b) = [b, d)\in\mathscr{R}(\mathscr{E}).$$

当 $a < c < b$ 时, 有

$$(a, c]\cap[c, b) = \{c\}\in\mathscr{R}(\mathscr{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\begin{aligned}\mathscr{R}(\mathscr{E}) &= \{\text{有限个开区间与有限个点的并集}\}\\ &= \{\text{有限个 (开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间与有限个点的并集}\},\end{aligned}$$

$$\mathscr{A}(\mathscr{E}) \overset{\text{命题 1.17}}{=\!=} \{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\} = \{E, X\setminus E \mid E\text{为有限个开区间与有限个点的并集}\}.$$

(3) 由 $\mathscr{R}(\mathscr{E})$ 的定义知,$\mathscr{E}\subseteq\mathscr{R}(\mathscr{E})$. 进而, 当 $a<c<b<d$ 时, 有

$$\begin{aligned}(-\infty,b)\setminus(-\infty,a) &= [a,b)\in\mathscr{R}(\mathscr{E}),\\ (a,b)\setminus(c,d) &= (a,c]\in\mathscr{R}(\mathscr{E}),\\ (c,d)\setminus(a,b) &= [b,d)\in\mathscr{R}(\mathscr{E}),\end{aligned}$$

当 $a<c<b$ 时, 有

$$(a,c]\cap[c,b) = \{c\}\in\mathscr{R}(\mathscr{E}).$$

于是, 猜测并验证得到

$$\begin{aligned}\mathscr{R}(\mathscr{E}) &= \{(-\infty,a)\text{与有限个开区间以及有限个点的并集}\}\\ &= \{(-\infty,a)\text{与有限个 (开, 半开半闭, 半闭半开, 闭) 区间以及有限个点的并集}\},\end{aligned}$$

$$\mathscr{A}(\mathscr{E}) \overset{\text{命题 1.17}}{=\!=} \{E, X\setminus E \mid E\in\mathscr{R}(\mathscr{E})\} = \{E, X\setminus E \mid E\text{为 }(-\infty,a)\text{与有限个开区间以及有限个点的并集}\}.$$

□

例题 1.23 设 $\mathscr{E} = \{(a,b) \mid -\infty<a<b<+\infty\}$,$\mathscr{R}_0 = \left\{\bigcup_{i=1}^{n}(a_i,b_i] \mid -\infty<a_i<b_i<+\infty,\ n\in\mathbb{N}\right\}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的两个集类.

证明: 分别由 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{R}_0$ 张成的 σ 环是一致的, 并且

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0) = \mathscr{B},$$

其中 $\mathscr{B}$ 为 Borel 集类, 即 $\mathscr{B} = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0)$, 它是由 $\mathbb{R}^1$ 的所有开集族 $\mathscr{T}_0$ 所生成的 σ 代数.

证明 Show/Hide Proof

取 $a_1 = a$,

$$\begin{aligned}a_2 &= a+\frac{1}{2}(b-a),\\ a_3 &= a+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}\right)(b-a),\\ &\cdots\\ a_i &= a+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^{i-1}}\right)(b-a),\\ &\cdots\end{aligned}$$

则

$$(a,b) = \bigcup_{i=1}^{\infty}(a_i,a_{i+1}]\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0),\quad \mathscr{E}\subseteq\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

这就证明了 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)$ 为含 $\mathscr{E}$ 的 σ 环. 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{E}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\subseteq\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

另一方面, 由于 $(a,b] = \bigcap_{n=1}^{\infty}\left(a,b+\frac{1}{n}\right)\in\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$,$\mathscr{R}_0\subseteq\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$. 这就证明了 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{R}_0$ 的 σ 环. 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0)$ 为含 $\mathscr{R}_0$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})\supseteq\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

综合上述得到

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0).$$

因为 $X = \mathbb{R}^1 = \bigcup_{n=1}^{\infty}(-n, n) \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$, 故 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{E}$ 的 σ 代数, 而 $\mathscr{T}_0$ 的每个元素 (即 $\mathbb{R}^1$ 中的开集), 根据开集构造定理**??**, 它为 $\mathscr{E}$ 中至多可数个两两不相交的元素的并. 因此, $\mathscr{T}_0 \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$. 又因为 $\mathscr{B} = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0)$ 为含 $\mathscr{T}_0$ 的最小 σ 代数, 故

$$\mathscr{B} = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0) \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}).$$

反之, 因为 $\mathscr{E} \subseteq \mathscr{T}_0 \subseteq \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0)$, 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E})$ 为含 $\mathscr{E}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) \subseteq \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0) = \mathscr{B}.$$

综合上述得到

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}_0) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{E}) = \mathscr{A}_\sigma(\mathscr{T}_0) = \mathscr{B}.$$

□

命题 1.18

设 $\mathscr{R}$ 为集合 X 上的一个非空集类. 证明:

(1) 以下三个结论等价:

(i) $\mathscr{R}$ 为一个环;

(ii) $\mathscr{R}$ 对 "\" 运算和任意有限个互不相交集的 "∪" 运算封闭;

(iii) $\mathscr{R}$ 对 "\"、"Δ"、"∩" 运算封闭.

(2) $\mathscr{R}$ 为代数 $\Leftrightarrow$ $\mathscr{R}$ 对 "∪"、"∩"、"余" 运算封闭.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) (i)⇒(iii) 由环的定义知, 环 $\mathscr{R}$ 对 "\" 运算封闭.

进而, 对 $\forall E, F \in \mathscr{R}$, $E \setminus F \in \mathscr{R}$, $F \setminus E \in \mathscr{R}$, 从而

$$E\Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathscr{R},$$

即 $\mathscr{R}$ 对 "Δ" 运算封闭. 此外, 由

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E\Delta F) \in \mathscr{R}$$

推得 $\mathscr{R}$ 对 "∩" 运算封闭. 这就证明了 (iii) 成立.

(i)⇐(iii) 设 $\mathscr{R}$ 对 "\"、"Δ"、"∩" 运算封闭. 于是, 对 $\forall E, F \in \mathscr{R}$, 有

$$E\Delta F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \in \mathscr{R}, \quad E \cap F \in \mathscr{R},$$

$$\begin{aligned} E \cup F &= (E\Delta F) \cup (E \cap F) \\ &= (E\Delta F \setminus E \cap F) \cup (E \cap F \setminus E\Delta F) \\ &= (E\Delta F)\Delta(E \cap F) \in \mathscr{R}, \end{aligned}$$

故 $\mathscr{R}$ 对 "∪" 运算封闭. 这就证明了 $\mathscr{R}$ 为一个环, 即 (1) 成立.

(i)⇒(ii) 因为 $\mathscr{R}$ 为一个环, 故 $\mathscr{R}$ 对 "\" 运算和 "∪" 运算封闭. 再由归纳法立知, $\mathscr{R}$ 对其任意有限个集 ($\mathscr{R}$ 的元素) 的 "∪" 运算封闭.

(i)⇐(ii) 设 (ii) 成立, 则对 $\forall E, F \in \mathscr{R}$, 有

$$E \setminus F \in \mathscr{R}, \quad F \setminus E \in \mathscr{R},$$

$$E \cap F = E \setminus (E \setminus F) \in \mathscr{R}.$$

于是, 根据 (ii) 中 $\mathscr{R}$ 对任意有限个互不相交集的 “$\cup$” 运算的封闭性, 有

$$E \cup F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E) \cup (E \cap F) \in \mathscr{R}.$$

这就证明了 $\mathscr{R}$ 对 “$\cup$” 运算封闭. 因此,$\mathscr{R}$ 为一个环, 即 (i) 成立.

(2) ($\Rightarrow$) 设 $\mathscr{R}$ 为代数, 则 $X \in \mathscr{R}$, 且 $\mathscr{R}$ 对 “$\setminus$”、“$\cup$” 运算封闭. 于是, 对 $\forall E, F \in \mathscr{R}$, 有

$$E^c = X \setminus E \in \mathscr{R},$$

$$E \cap F = (E \cup F) \setminus (E \setminus F) \setminus (F \setminus E) \in \mathscr{R}.$$

这就证明了 $\mathscr{R}$ 对 “$\cup$”、“$\cap$”、“余” 运算封闭.

($\Leftarrow$) 设 $\mathscr{R}$ 对 “$\cup$”、“$\cap$”、“余” 运算封闭. 因为 $\mathscr{R}$ 为集合 X 上的非空集类, 故 $\exists E \in \mathscr{R}$. 于是,$E^c = X \setminus E \in \mathscr{R}$,$X = E \cup (X \setminus E) \in \mathscr{R}$. 进而, 对 $\forall E, F \in \mathscr{R}$, 有

$$F^c \in \mathscr{R}, \quad E \setminus F = E \cap F^c \in \mathscr{R}.$$

这就证明了 $\mathscr{R}$ 对 “$\cup$” 和 “$\setminus$” 运算封闭, 即 $\mathscr{R}$ 为一个环. 又因 $X \in \mathscr{R}$, 故 $\mathscr{R}$ 为代数.

□

命题 1.19

设 X 为集合,$A \subseteq X$. $\mathscr{R}$ 为 X 上某些子集所成的环. 记

$$\mathscr{R} \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathscr{R}\}, \quad \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A = \{E \cap A \mid E \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})\}.$$

证明:

(1) $\mathscr{R} \cap A$ 为 A 上的一个环.

(2) $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为 A 上的一个 σ 环.

(3) $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A)$.

(4) 当 $\mathscr{R}$ 为代数或 $A \in \mathscr{R}$ 时,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 代数.

♠

证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $\forall E \cap A \in \mathscr{R} \cap A, F \cap A \in \mathscr{R} \cap A$, 有 $E \in \mathscr{R}, F \in \mathscr{R}$, 故 $E \cup F \in \mathscr{R}, E \setminus F \in \mathscr{R}$, 且

$$(E \cap A) \cup (F \cap A) = (E \cup F) \cap A \in \mathscr{R} \cap A,$$

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathscr{R} \cap A.$$

这就证明了 $\mathscr{R} \cap A$ 为 A 上的一个环.

(2) 对 $\forall E \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A, F \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A, E_n \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A, n \in \mathbb{N}$, 有 $E \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}), F \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}), E_n \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}), n \in \mathbb{N}$, 且 $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$. 于是

$$(E \cap A) \setminus (F \cap A) = (E \setminus F) \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A,$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (E_n \cap A) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A.$$

这就证明了 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为 A 上的一个 σ 环.

(3) 证法一: 因为 $\mathscr{R} \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$, 故 $\mathscr{R} \cap A \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$. 显然,$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为含 $\mathscr{R} \cap A$ 的 σ 环, 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A)$ 为含 $\mathscr{R} \cap A$ 的最小 σ 环, 因此

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A) \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A.$$

令

$$\mathscr{F} = \{F \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \mid F \cap A \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A)\},$$

易见,$\mathscr{F}$ 为 σ 环.

由于 $\mathscr{R} \subseteq \mathscr{F}$, 故 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \subseteq \mathscr{F}$. 于是

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A \subseteq \mathscr{F} \cap A \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A).$$

综合上述得到

$$\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A).$$

证法二:

$$\begin{aligned}\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A &= \{\mathscr{R}\text{中至多可数个元素}E_1, E_2, \cdots, E_n, \cdots\text{的至多可数次 “}\cup\text{”、“}\setminus\text{” 运算后所得集与}A\text{的交}\} \\ &= \{\mathscr{R} \cap A\text{中至多可数个元素}E_1 \cap A, E_2 \cap A, \cdots, E_n \cap A, \cdots\text{的至多可数次 “}\cup\text{”、“}\setminus\text{” 运算后所得的集}\} \\ &= \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A).\end{aligned}$$

(4) 当 $\mathscr{R}$ 为代数时,$X \in \mathscr{R}$, 从而 $A = X \cap A \in \mathscr{R} \cap A \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$. 再由 (2) 知 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 环, 故 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A)$ 为 A 上的 σ 代数.
当 $A \in \mathscr{R}$ 时,$A = A \cap A \in \mathscr{R} \cap A \subseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$. 再由 (2) 知 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) \cap A$ 为 A 上的 σ 环, 故 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R} \cap A)$ 为 A 上的 σ 代数.

□

例题 1.24 设 X 为集合,$\mathscr{R}$、$\mathscr{U}$ 为 X 上的非空集类,$\mathscr{U}$ 为 X 上的环, 且有

(1) $\mathscr{U} \supseteq \mathscr{R}$;

(2) 当 $E_1, E_2, \cdots, E_n, \cdots$ 为 $\mathscr{U}$ 中的一列互不相交的元素时,$\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathscr{U}$.

证明:$\mathscr{U} \supseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$.

证明 Show/Hide Proof

$\forall F_n \in \mathscr{U}, n \in \mathbb{N}$, 令 $E_1 = F_1, E_2 = F_2 \setminus F_1, \cdots, E_n = F_n \setminus \bigcup\limits_{i=1}^{n-1} F_i$, 则 $E_n (n \in \mathbb{N})$ 互不相交. 又因为 $\mathscr{U}$ 为环, 故 $E_n \in \mathscr{U}, n \in \mathbb{N}$. 于是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \overset{\text{由 (2)}}{\subseteq} \mathscr{U}.$$

因此, 环 $\mathscr{U}$ 为 σ 环. 再由 (1) 知 $\mathscr{R} \subseteq \mathscr{U}$, 而 $\mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$ 为含 $\mathscr{R}$ 的最小 σ 环, 故

$$\mathscr{U} \supseteq \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}).$$

□

例题 1.25 设 $\mathscr{R}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的一个环,$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\}$. 对 $\forall E \in \mathscr{R}$, 令

$$\widetilde{E} = \{(x, y) \mid x \in E\} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad \widetilde{\mathscr{R}} = \{\widetilde{E} \mid E \in \mathscr{R}\}.$$

证明:

(1) $\widetilde{\mathscr{R}}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的一个环.

(2) $\mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}}) \cap \mathbb{R}^1 = \mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$, 其中 $\mathbb{R}^1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}$.

换言之,

$$\mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}}) = \{\widetilde{E} \mid E \in \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})\}, \quad \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R}) = \{E \mid \widetilde{E} \in \mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}})\}.$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $\widetilde{E}_1 = \{(x, y) \mid x \in E_1\} \in \widetilde{\mathscr{R}}, \widetilde{E}_2 = \{(x, y) \mid x \in E_2\} \in \widetilde{\mathscr{R}}$, 故 $E_1 \in \mathscr{R}, E_2 \in \mathscr{R}$. 又因 $\mathscr{R}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 上的一个环, 所以 $E_1 \cup E_2 \in \mathscr{R}, E_1 \setminus E_2 \in \mathscr{R}$. 于是

$$\begin{aligned}\widetilde{E}_1 \cup \widetilde{E}_2 &= \{(x, y) \mid x \in E_1\} \cup \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \cup E_2\} \in \widetilde{\mathscr{R}}, \\ \widetilde{E}_1 \setminus \widetilde{E}_2 &= \{(x, y) \mid x \in E_1\} \setminus \{(x, y) \mid x \in E_2\} = \{(x, y) \mid x \in E_1 \setminus E_2\} \in \widetilde{\mathscr{R}}.\end{aligned}$$

这就证明了 $\widetilde{\mathscr{R}}$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的一个环.

(2) $\mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}}) \cap \mathbb{R}^1 \overset{\text{命题 1.19(3)}}{=\!=\!=} \mathscr{R}_\sigma(\widetilde{\mathscr{R}} \cap \mathbb{R}^1) = \mathscr{R}_\sigma(\mathscr{R})$.

□

1.6 关系

定义 1.26 ((二元) 关系)

所谓在集合 A 中定义了二元素间的一个 **(二元) 关系** R, 也就是给出了集合 $A\times A$ 中元素的一个性质 R, 若 $a,b\in A$, (a,b) 有性质 R, 则称 a 与 b 有关系 R, 记为 aRb.

♣

笔记 Show/Hide Note

事实上, 集合 A 中关系 R 可由 $A\times A$ 中子集

$$S\triangleq\{(a,b)\mid a,b\in A,aRb\}$$

来刻画. 即若 aRb, 则 $(a,b)\in S$.

反之, 由 $A\times A$ 的一个子集 S, 也可确定 A 一个关系 R. 即若 $(a,b)\in S$, 则 aRb.

定义 1.27 (等价关系)

1. 集合 A 中关系若满足以下条件:
   (1) **自反性** $aRa,\forall a\in A$;
   (2) **对称性** 若 aRb, 则 bRa;
   (3) **传递性** 若 aRb,bRc, 则 aRc,
   则称 R 为 A 的一个**等价关系**.
2. 若仍以 R 表示 A 中关系所确定的 $A\times A$ 的子集, 则 R 为等价关系当且仅当下列三个条件同时成立:
   (1) $(a,a)\in R,\forall a\in A$;
   (2) 若 $(a,b)\in R$, 则 $(b,a)\in R$;
   (3) 若 $(a,b)\in R,(b,c)\in R$, 则 $(a,c)\in R$.

♣

注 等价关系的三个条件是互相独立的, 即: 已知任意两个条件不一定能推出第三个条件.

但若 $\sim$ 是集合 A 中的关系, 且 $\sim$ 满足对称性和传递性, 则 $\sim$ 具有自反性.

证明 Show/Hide Proof

例如, 实数集 $\mathbb{R}$ 中的关系 $\sim$

$$a\sim b\iff a\leqslant b$$

满足自反性和传递性, 但不满足对称性.

实数集中关系 $\sim$

$$a\sim b\iff |a-b|\leqslant 1$$

满足自反性和对称性, 但不满足传递性.

在非负整数集 $\mathbb{N}_0$ 中定义关系 $\sim$

$$a\sim b\iff a与b均为正数且有相同的奇偶性$$

则易见 $\sim$ 满足对称性和传递性, 但不满足自反性, 因为没有 $0\sim 0$.

若 $\sim$ 是集合 A 中的关系, 且 $\sim$ 满足对称性和传递性, 设 $a\sim b$, 则由 $\sim$ 满足对称性知 $b\sim a$, 又由 $\sim$ 满足传递性可得 $a\sim a$.

□

定义 1.28 (等价类和代表元素)

若 R 是集合 A 的一个等价关系且 $a \in A$, 则 A 中所有与 a 有关系 R 的元素集合

$$K_a = [a] = \{b \in A \mid bRa\}$$

称为 a 所在的**等价类**, a 称为这个等价类的**代表元素**.

♣

定义 1.29 (分划/分类)

集合 A 的一个子集族 $\{A_\alpha\}$ 称为 A 的一个**分划**或**分类**或**分拆**, 如果满足

$$A = \bigcup_\alpha A_\alpha, \quad A_\alpha \bigcap A_\beta = \varnothing, \quad 若\alpha \neq \beta.$$

也称 A 是 $\{A_\alpha\}$ 中**所有不相交的集合的并**或**无交并**. 也把上式无交并记为

$$A = \bigsqcup_\alpha A_\alpha.$$

♣

定理 1.27

设 R 是集合 A 的等价关系, 则由所有不同的等价类构成的子集族 $\{K_a\}$ 是 A 的分划. 即

$$A = \bigsqcup_{a \in A} K_a.$$

其中 a 取遍不同 A 的等价类的代表元.

反之, 若 $\{A_a\}$ 是 A 的分划, 则可在 A 中定义等价关系 R,

$$aRb, \quad 若\exists A_\alpha, 使 a, b \in A_\alpha.$$

并且使得每个 A_a 是一等价类.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 R 是 A 的等价关系. 由 $\forall a \in A, aRa$ 知 $a \in K_a$, 于是 $A = \bigcup_a K_a$. 设 $K_a \cap K_b \neq \varnothing$, 即 $\exists c \in K_a \cap K_b$, 对 $\forall x \in K_a$ 有 cRa, xRa, 因而 xRc. 又 cRb, 故 xRb, 即 $x \in K_b$, 从而得 $K_a \subseteq K_b$. 同样可得 $K_b \subseteq K_a$, 故 $K_a = K_b$, 亦即若 $K_a \neq K_b$, 则 $K_a \cap K_b = \varnothing$. 这样就证明了 $\{K_a\}$ 是 A 的分划.

反之, 设 $\{A_\alpha\}$ 是 A 的一个分划. 在 A 中定义关系 R,

$$aRb, \quad 若\exists A_\alpha, 使 a, b \in A_\alpha.$$

因 $A = \bigcup_\alpha A_\alpha$, 故对 $\forall a \in A, \exists A_\alpha$, 使 $a \in A_\alpha$, 因此 $a, a \in A_\alpha$, 即 aRa. 其次, 若 aRb, 即 $\exists A_\alpha$, 使 $a, b \in A_\alpha$. 自然 $b, a \in A_\alpha$, 故 bRa. 再次, 若 aRb, bRc, 即有 A_α, A_β, 使 $a, b \in A_\alpha$ 且 $b, c \in A_\beta$, 故 $b \in A_\alpha \cap A_\beta$. 由 $\{A_\alpha\}$ 为 A 的分划知 $A_\alpha = A_\beta$, 因而 aRc. 这样就证明了 R 是等价关系. 由 R 的定义知若 $a \in A_\alpha$, 则 a 所在的等价类 $K_a = A_\alpha$.

□

定义 1.30 (商集和自然映射)

设 R 是集合 A 的等价关系. 以关于 R 的等价类为元素的集合 $\{K_a\}$ 称为 A 对 R 的**商集合**或**商集**. 记为 A/R. 由

$$\pi(a) = K_a, \quad \forall a \in A$$

定义的 A 到 A/R 上的映射 π 称为 A 到 A/R 上的**自然映射**.

♣

注 显然自然映射都是满射.

定理 1.28

设 $f: A \to B$ 是满映射. 在 A 中定义关系 R,

$$aRb, \quad 若 f(a) = f(b),$$

则 R 是 A 的等价关系. 又设 $\pi: A \to A/R$ 为自然映射, 则有 A/R 到 B 上的一一对应 g 满足

$$g\pi = f. \tag{1.5}$$

即图 1.5是交换图.




图 1.5

证明 Show/Hide Proof

考虑 $y \in B$ 的原像 $f^{-1}(y)$ 构成的子集族. 显然, $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(y)$. 又若 $y, z \in B$, $f^{-1}(y) \cap f^{-1}(z) \neq \varnothing$, 即 $\exists a \in A$, 使 $f(a) = y, f(a) = z$, 即 $y = z$. 故 $f^{-1}(y) = f^{-1}(z)$, 从而 $\{f^{-1}(y)\}$ 是 A 的一个分划. 于是由定理 1.27知, 在 A 中可定义等价关系 $R: aRb$, 若 $\exists f^{-1}(y)$, 使 $a, b \in f^{-1}(y)$, 即 $f(a) = f(b)$. 由此知定理的第一部分成立.

定义 A/R 到 B 的映射 g,

$$g(K_a) = f(a), \quad \forall a \in A.$$

注意到 A 中元素 a 所在等价类 $K_a = f^{-1}(f(a))$, 由于 $K_a = K_b$ 当且仅当 $f(a) = f(b)$, 故 g 是单射. 又 $f(A) = B$, 故 g 是满射. 因此 g 是一一对应. 由 π 的定义知式 (1.5) 成立.

□

定义 1.31 (完全代表系)

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, 则子集 $R \subseteq X$ 称为等价关系 $\sim$ 的**完全代表系**, 当且仅当满足以下条件:

$$|R \cap C| = 1, \ \forall C \in X/\sim .$$

即 R 与每个等价类有且仅有一个公共元素.

定理 1.29

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系, 则必存在 X 的子集 R 为等价关系 $\sim$ 的完全代表系.

注 这个定理表明: 任意等价关系的完全代表系的存在性与选择公理等价.

一个等价关系的完全代表系可以不唯一.

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.27知

$$\bigcup_{K \in X/\sim} K = X.$$

由选择公理知, 存在一个选择函数

$$f: X/\sim \longrightarrow \bigcup_{K \in X/\sim} K = X,$$

使得对 $\forall K \in X/\sim$, 都有 $f(K) \in K$. 令

$$R = \{f(K) \mid K \in X/\sim\},$$

则对 $\forall C \in X/\sim$, 有 $f(C) \in C$. 再对 $\forall f(K) \in R \setminus \{f(C)\}$, 有 $K \neq C$, 则由定理 1.27知

$$K \cap C = \varnothing.$$

而 $f(K) \in K$, 故 $f(K) \notin C$. 因此 $R \cap C = \{f(C)\}$, 即 $|R \cap C| = 1$.

□

定理 1.30

设 $\sim$ 是集合 X 上的等价关系,X 的子集 R 为等价关系 $\sim$ 的**完全代表系**的充分必要条件是满足以下任意一个条件:

(1) 对 $\forall x \in X$, 存在 $r \in R$, 使得 $x \sim r$. 并且对 $\forall r_1, r_2 \in R$ 且 $r_1 \neq r_2$, 有 r_1 与 r_2 不等价.

(2) $X = \bigsqcup_{r \in R} K_r$, 也即

$$X = \bigcup_{r \in R} K_r \text{ 且 } K_{r_1} \cap K_{r_2} = \varnothing, \forall r_1, r_2 \in R \text{且} r_1 \neq r_2.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

□

定义 1.32 (同余关系和同余类)

设集合中 A 的二元运算, 记作乘法. 若 A 的一个等价关系 $\sim$ 满足

$$\text{若} a \sim b, c \sim d, \text{ 则} ac \sim bd, \forall a, b, c, d \in A.$$

则称 $\sim$ 为 A 的一个**同余关系**. $a \in A$ 的等价类 K_a 此时也称为 a 的**同余类**.

♣

例题 1.26

1. 设 $m \in \mathbb{Z}$(所有整数的集合), $m \neq 0$. 在 $\mathbb{Z}$ 中定义关系

$$a \sim b, \quad \text{若} a \equiv b \pmod{m}.$$

易证 $\sim$ 是等价关系且由 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$ 可得 $a + c \equiv b + d \pmod{m}$, $ac \equiv bd \pmod{m}$. 因而 $\sim$ 对于 $\mathbb{Z}$ 中的加法与乘法都是同余关系.

2. 设 $\mathbb{P}[x]$ 是数域 $\mathbb{P}$ 上一元多项式的集合. 设 $f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x) \neq 0$. 在 $\mathbb{P}[x]$ 中定义关系 $\sim$: $g(x) \sim h(x)$, 若 $f(x) \mid (g(x) - h(x))$. 与第一问类似可证 $\sim$ 对 $\mathbb{P}[x]$ 中的加法与乘法都是同余关系.

3. 以 $\mathbb{P}^{n\times n}$ 表示数域 $\mathbb{P}$ 上所有 n 阶方阵的集合. 方阵的加法与乘法都是 $\mathbb{P}^{n\times n}$ 中的二元运算. 对 $\boldsymbol{A} \in \mathbb{P}^{n\times n}$, 用 $\mathrm{ent}_{ij}\boldsymbol{A}$, $\mathrm{row}_i\boldsymbol{A}$, $\mathrm{col}_j\boldsymbol{A}$ 和 $\det \boldsymbol{A}$ 分别表示 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列元素、$\boldsymbol{A}$ 的第 i 行、$\boldsymbol{A}$ 的第 j 列和 $\boldsymbol{A}$ 的行列式. $\mathbb{P}^{n\times n}$ 中由 $\det \boldsymbol{A} = \det \boldsymbol{B}$ 确定的关系, 对乘法是同余关系, 但对加法除 $n = 1$ 的情形外不是同余关系.

定理 1.31

设集合 A 有二元运算乘法, $\sim$ 是 A 的一个同余关系. 又 $\pi : A \to A/\sim$ 是自然映射, 则在商集合 $A/\sim$ 中可定义二元运算

$$\pi(a)\pi(b) = \pi(ab), \quad \forall a, b \in A.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

要证明这个二元运算的良定义性, 只需证由 $\pi(a) = \pi(a_1)$, $\pi(b) = \pi(b_1)$ 可得 $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$, 其中, $a, b, a_1, b_1 \in A$. 事实上, 由 π 的定义知 $\pi(a) = \pi(a_1)$, 即 $a \sim a_1$, $\pi(b) = \pi(b_1)$, 即 $b \sim b_1$. 因 $\sim$ 是同余关系, 故 $ab \sim a_1b_1$, 所以 $\pi(ab) = \pi(a_1b_1)$.

□

1.7 其他

定理 1.32 (有限偏序集必有极大元)

有限偏序集必有极大元.

♡

证明 Show/Hide Proof

设有限偏序集 $\langle S, \leqslant \rangle$ 有 n 个元素. 当 $n = 1$ 时, 结论显然成立. 假设结论对元素个数小于 n 的偏序集成立. 考虑 n 个元素的偏序集 P, 任取 $a \in P$, 若 a 为极大元, 则证毕. 若 a 不是极大元, 则存在 $a \leqslant b$. 去掉 a 剩下的 $n-1$ 个元素在子集仍是一个偏序集 P_1, 由归纳假设知 P_1 有极大元 m. 从而 $a \leqslant b \leqslant m$. 故 m 也是集合 P 的极大元. 故由数学归纳法知结论成立.

□

定理 1.33 (逆归定理)

假设 S 是一个集合,$a \in S$, 并且对于每个 $n \in \mathbb{N}$,$f_n : S \to S$ 均是良定义的映射, 则存在唯一的函数 $\varphi : \mathbb{N} \to S$, 使得

$$\varphi(0) = a, \quad \varphi(n+1) = f_n(\varphi(n))(\forall n \in \mathbb{N}).$$

即

$$\varphi : \mathbb{N} \to S,\ n \mapsto f_{n-1} \circ f_{n-2} \circ \cdots \circ f_0(a).$$

♡

注 如果 A 是非空集合,A 中的序列是一个函数 $\mathbb{N} \to A$. 一个序列通常表示成 $\{a_0, a_1, \cdots\}$,$\{a_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ 或者 $\{a_i\}$, 其中 $a_i \in A$ 是 $i \in \mathbb{N}$ 的象. 类似地, 函数 $\mathbb{N}^* \to A$ 也称作序列, 并且表示成 $\{a_1, a_2, \cdots\}$,$\{a_i\}_{i\in\mathbb{N}^*}$ 或者 $\{a_i\}$, 这些符号在课文中不会引起混乱.

证明 Show/Hide Proof

我们将构作 $\mathbb{N}\times S$ 上的一个关系 R, 使得它是满足上述性质的函数 $\varphi : \mathbb{N} \to S$ 的图象, 令

$$\mathcal{F} = \{Y \subset \mathbb{N}\times S \mid (0,a) \in Y, \text{并且} (n,x) \in Y \Rightarrow (n+1, f_n(x)) \in Y (\forall n \in \mathbb{N})\}$$

由于 $\mathbb{N}\times S \in \mathcal{F}$, 从而 $\mathcal{F} \neq \varnothing$. 令 $R = \bigcap_{Y\in\mathcal{F}} Y$, 则 $R \in \mathcal{F}$. 又设 M 为子集合

$$\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在唯一的} x_n \in S, \text{使得} (n, x_n) \in R\}$$

我们归纳证明 $M = \mathbb{N}$. 如果 $0 \notin M$, 则有 $(0,b) \in R$, 其中 $b \neq a$, 并且集合 $R - \{(0,b)\} \subset \mathbb{N}\times S$ 属于 $\mathcal{F}$. 从而 $R = \bigcap_{Y\in\mathcal{F}} Y \subset R - \{(0,b)\}$, 这就导致矛盾. 因此 $0 \in M$. 现在假定 $n \in M$(即有唯一的 $x_n \in S$, 使得 $(n, x_n) \in R$), 则 $(n+1, f_n(x_n)) \in R$. 如果又有 $(n+1, c) \in R$, 而 $c \neq f_n(x_n)$, 则 $R - \{(n+1, c)\} \in \mathcal{F}$(验证!), 由此又可象上面那样导致矛盾. 因此 $x_{n+1} = f_n(x_n)$ 是 S 中唯一的元素, 使得 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 于是由归纳法 (定理 6.1) 可知 $\mathbb{N} = M$, 即 $n \longmapsto x_n$ 定义了一个函数 $\varphi : \mathbb{N} \to S$, 它的图象为 R. 由于 $(0,a) \in R$, 从而 $\varphi(0) = a$. 对于每个 $n \in \mathbb{N}$,$(n, x_n) = (n, \varphi(n)) \in R$. 由于 $R \in \mathcal{F}$, 从而 $(n+1, f_n(\varphi(n))) \in R$. 但是 $(n+1, x_{n+1}) \in R$. 由 x_{n+1} 的唯一性推出 $\varphi(n+1) = x_{n+1} = f_n(\varphi(n))$.

□

命题 1.20

设 V 是数域上的线性空间, 证明 V 有一组基.

♠

证明 Show/Hide Proof

V 的子集 L 称为线性无关的向量组, 如果 L 中任意有限个向量均是线性无关的.

令 S 是 V 中所有线性无关的向量组作成的集合, 则 S 对于集合的包含关系作成偏序集. 设 $T = \{L_i \mid i \in I\}$ 是 S 的一个链, 则 $L = \bigcup_{i\in I} L_i$ 也是线性无关的向量组. 事实上, 设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 是 L 中任意有限个元, 则每个 α_i 属于某一 L_{j_i}. 因为 T 是链, 故存在 $i \in I$ 使得 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m \in L_i$. 从而 $\alpha_1, \cdots, \alpha_m$ 是线性无关的.

于是 $L \in S$,L 是 T 的一个上界. 由 Zorn 引理知 S 有极大元 M. 不难验证 M 就是 V 的基: 即 M 是线性无关组, 且 V 中任一元均是 M 中有限个元的线性组合.

□