

0.1 Cauchy-Riemann 方程

定义 0.1

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 是定义在区域 D 上的函数, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$. 我们说 f 在 z_0 处实可微, 是指 u 和 v 作为 x, y 的二元函数在 (x_0, y_0) 处可微.

定理 0.1

如果 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处实可微, 则有极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0),$$

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{\Delta y} = \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) = \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0),$$

分别记为 $\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, $\frac{\partial f}{\partial y}(z_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$, 也简记为

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y}.$$

称为 f 的一阶偏导数. 与实变函数中的偏导数一样, 可同理定义 f 的 k 阶偏导数.

证明 Show/Hide Proof

定义 0.2

设 $z = x + iy$ 是一个复数, 把 $z, \bar{z}$ 看成独立变量, 定义算子

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right). \quad (1)$$

注 为什么要像(1)式那样来定义算子 $\frac{\partial}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}}$ 呢? 这是因为如果把复变函数 $f(z)$ 写成

$$f(x, y) = f\left(\frac{z + \bar{z}}{2}, -i\frac{z - \bar{z}}{2}\right),$$

把 $z, \bar{z}$ 看成独立变量, 分别对 z 和 $\bar{z}$ 求偏导数, 则得

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial z} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

这就是表达式(1)的来源. 这说明在进行微分运算时, 可以把 $z, \bar{z}$ 看成独立的变量.

命题 0.1

设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是定义在区域 D 上的函数, $z_0 \in D$, 那么 f 在 z_0 处实可微的充分必要条件是

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \quad (2)$$

成立.

证明 Show/Hide Proof

设 f 在 z_0 处实可微, 由二元实值函数可微的定义, 有

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|), \quad (3)$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|), \quad (4)$$

这里, $|\Delta z| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$. 于是

$$\begin{aligned} f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) &= u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) + i(v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|) + i\left(\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|)\right) \\ &= \left(\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)\right)\Delta x + \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i\frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0)\right)\Delta y + o(|\Delta z|) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)\Delta y + o(|\Delta z|). \end{aligned}$$

把 $\Delta x = \frac{1}{2}(\Delta z + \overline{\Delta z})$, $\Delta y = \frac{1}{2i}(\Delta z - \overline{\Delta z})$ 代入上式, 得

$$\begin{aligned} f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) &= \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(\Delta z + \overline{\Delta z}) - \frac{i}{2}\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(\Delta z - \overline{\Delta z}) + o(|\Delta z|) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0, y_0)\Delta z + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y}\right)f(x_0, y_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \end{aligned}$$

从而上式可写为

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|). \quad (5)$$

容易看出(5)式和(3)(4)两式等价.

□

定理 0.2

设 f 是定义在区域 D 上的函数, $z_0 \in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 f 在 z_0 处实可微且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$. 并且 f 在可微的情况下, $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

如果 f 在 z_0 处可微, 由(??)式得

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = f'(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

与(2)式比较就知道, f 在 z_0 处是实可微的, 而且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0, f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

反之, 若 f 在 z_0 处实可微, 且 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$, 则由(2)式得

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + o(|\Delta z|)$$

由此即知

$$\lim_{\Delta z} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0).$$

故 f 在 z_0 处可微, 而且 $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$.

□

定义 0.3 (Cauchy-Riemann 方程)

设 f 是定义在区域 D 上的函数, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 称为 **Cauchy - Riemann 方程**, 简称 **C. - R. 方程**.

♣

笔记 Show/Hide Note

从这个方程可以得到 f 的实部和虚部应满足的条件.

定理 0.3 (Cauchy-Riemann 方程的等价定义)

设 $z = x + iy, f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则

(i) Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases} \quad (6)$$

(ii) Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价于

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = 0.$$

(iii) 令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 进而 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta), f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, 则 Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价于

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}. \end{cases}$$



证明 Show/Hide Proof

(i) 由(1)式得

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial u}{\partial \bar{z}} + i \frac{\partial v}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right).$$

因此 Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 就等价于

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \end{cases}$$

(ii) 又注意到

$$\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial z} - i \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) - \frac{i}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} - i \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - \frac{i}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right),$$

故 Cauchy-Riemann 方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 也等价于 $\frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = 0$.

(iii) 直接计算得

$$\frac{\partial (x, y)}{\partial (r, \theta)} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r.$$

再由定理 11.11 知

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x} &= \frac{\partial y}{\partial \theta} / \frac{\partial (x, y)}{\partial (r, \theta)} = \cos \theta, & \frac{\partial r}{\partial y} &= -\frac{\partial x}{\partial \theta} / \frac{\partial (x, y)}{\partial (r, \theta)} = \sin \theta, \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} &= -\frac{\partial y}{\partial r} / \frac{\partial (x, y)}{\partial (r, \theta)} = -\frac{\sin \theta}{r}, & \frac{\partial \theta}{\partial y} &= \frac{\partial x}{\partial r} / \frac{\partial (x, y)}{\partial (r, \theta)} = \frac{\cos \theta}{r}. \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{r}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{r}, \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{r}, \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{r}. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} &\iff \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{r} = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{r} \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \sin \theta = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot r \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \cos \theta, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} &\iff \frac{\partial u}{\partial r} \cdot \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{r} = -\frac{\partial v}{\partial r} \cdot \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{r} \\ &\iff \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \cos \theta = -\frac{\partial v}{\partial r} \cdot r \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \sin \theta.\end{aligned}$$

由 (i) 可知 Cauchy-Riemann 方程等价于 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$, 故此时 Cauchy-Riemann 方程等价于

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \cos \theta - \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \sin \theta = \frac{\partial v}{\partial r} \cdot r \sin \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \cos \theta, \\ \frac{\partial u}{\partial r} \cdot r \sin \theta + \frac{\partial u}{\partial \theta} \cdot \cos \theta = -\frac{\partial v}{\partial r} \cdot r \cos \theta + \frac{\partial v}{\partial \theta} \cdot \sin \theta. \end{cases}$$

化简可得

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}. \end{cases}$$

□

定理 0.4

设 $f = u + iv$ 是定义在区域 D 上的函数, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$, 那么 f 在 z_0 处可微的充要条件是 $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 且在 (x_0, y_0) 处满足 Cauchy-Riemann 方程, 即

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0 \iff \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = 0 \iff \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}.$$

在可微的情况下, 有

$$f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}.$$

这里的偏导数都在 (x_0, y_0) 处取值.

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.2 和 Cauchy-Riemann 方程的等价定义容易得到充要条件的证明. 再由定理 0.2 中的 $f'(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$ 和 Cauchy-Riemann 方程的等价定义可得, 在可微的情况下, 有

$$\begin{aligned}f'(z_0) &= \frac{\partial f}{\partial z}(z_0) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial f}{\partial x}(z_0) - i \frac{\partial f}{\partial y}(z_0) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) - i \left(\frac{\partial u}{\partial y}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + \frac{\partial v}{\partial y}(z_0) + i \left(\frac{\partial v}{\partial x}(z_0) - \frac{\partial u}{\partial y}(z_0) \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + 2i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0) \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(z_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z_0).\end{aligned}$$

再由 Cauchy-Riemann 方程的等价定义可得结论.

□

定义 0.4

1. 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的区域, 我们用 $C(D)$ 记 D 上连续函数的全体, 用 $H(D)$ 记 D 上全纯函数的全体.
2. 设 $f = u + iv$, 我们用 $C^1(D)$ 记有 1 阶连续偏导数的函数的全体. 用 $C^k(D)$ 记在 D 上有 k 阶连续偏导数的函数的全体, $C^\infty(D)$ 记在 D 上有任意阶连续偏导数的函数的全体.

命题 0.2

- (1) $H(D) \subseteq C(D)$.
- (2) $C^1(D) \subseteq C(D)$.
- (3) 区域 D 上的全纯函数在 D 上有任意阶的连续偏导数, 并且有如下的包含关系:

$$H(D) \subseteq C^\infty(D) \subseteq C^k(D) \subseteq C^1(D) \subseteq C(D).$$

这里, k 是大于 1 的自然数.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 命题 ?? 告诉我们, $H(D) \subseteq C(D)$.
- (2) 设 $f = u + iv$, 记 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial y}$. 我们用 $C^1(D)$ 记 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$ 在 D 上连续的 f 的全体. 进而 u, v 关于 x, y 的偏导在 D 上都连续, 由多元微积分的知识知道, u, v 在 D 上都可微. 于是对于任意 $f \in C^1(D)$, f 在 D 上实可微, 从 (5) 式知道

$$f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)\Delta z + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0)\overline{\Delta z} + o(|\Delta z|).$$

令 $\Delta z \rightarrow 0$, 则 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z} = \frac{\partial f}{\partial z}(z_0)$, 故 f 在 D 上连续, 因而 $C^1(D) \subseteq C(D)$.

(3)

□

例题 0.1 研究函数 $f(z) = z^n$, n 是自然数.

解 Show/Hide Solution

显然, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$, 且 f 在整个平面上是实可微的. 因而, f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, 而且

$$f'(z) = \frac{\partial f}{\partial z} = nz^{n-1}. \quad (7)$$

□

例题 0.2 研究函数 $f(z) = e^{-|z|^2}$.

解 Show/Hide Solution

把 f 写为 $f(z) = e^{-z\bar{z}}$, 于是 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = -e^{-z\bar{z}}z$, 它只有在 $z = 0$ 处才等于零. 因此, $e^{-|z|^2}$ 只有在 $z = 0$ 处可微, 它在任何点处都不是全纯的. 但它对 x, y 有任意阶连续偏导数, 所以它是 $C^\infty(\mathbb{C})$ 中的函数.

□

命题 0.3

设函数 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 并满足下列条件之一:

- (1) 在 D 内 $f'(z) = 0$.
- (2) $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
- (3) $|f(z)|$ 在 D 内为常数.
- (4) $\operatorname{Re} f(z)$ 或 $\operatorname{Im} f(z)$ 在 D 内为常数.
- (5) $\operatorname{Arg} f(z)$ 在 D 内为常数.
- (6) $au + bv = c$, 其中 a, b 与 c 是不全为零的实常数.

则 $f(z)$ 是常数.

◆

证明 Show/Hide Proof

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

(1) 因为 $f'(z) = 0$, 所以由定理 0.4 可知 $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} = 0$, 并且 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$. 于是 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = 0$. 因此 u, v 都是常数, 故 f 是一常数.

(2) 若 $\overline{f(z)} = u(x, y) - iv(x, y)$ 解析, 由 C.-R. 方程很容易得到 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$, 从而 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内为常数, 故 $f(z)$ 亦为常数.

(3) 若 $|f(z)| \equiv C = 0$, 则显然 $f(z) \equiv 0$. 若 $|f(z)| \equiv C \neq 0$, 则 $f(z) \neq 0$.

证法一: 由 $\overline{f(z)} \cdot f(z) \equiv C^2$, 可推得 $\overline{f(z)} \equiv \frac{C^2}{f(z)}$ 也是解析函数, 则利用命题 0.3(2) 可知 $f(z)$ 在 D 内为常数.

证法二: 由 $|f(z)|^2 = C^2$ 可得 $u^2 + v^2 = C^2 \neq 0$, 分别对 x, y 微分, 再应用 C.-R. 方程, 讨论解二元一次齐次方程组, 即得在 D 内 $u_x = v_y = u_y = v_x = 0$.

(4) 若 $\operatorname{Re} f(z)$ 在 D 内为常数, 可设 $u(x, y) \equiv C$, 则 $u_x = u_y = 0$, 由 C.-R. 方程, 得

$$v_x = -u_y \equiv 0, \quad u_x = v_y \equiv 0.$$

因此 $u(x, y) \equiv C_1, v(x, y) \equiv C_2, f(z) = C_1 + iC_2$ 为常数. 若 $\operatorname{Im} f(z)$ 在 D 内为常数, 同上可得证.

(5) 利用 C.-R. 方程易得.

(6) 由条件可得 $au_x + bv_x = 0, au_y + bv_y = 0$.

情况 1: 若 $a \neq 0, b = 0$ 或 $a = 0, b \neq 0$, 则再由命题 0.3(4) 可知 u 或 v 为常数.

情况 2: 若 $ab \neq 0$, 则根据

$$au_x - bv_y = 0, \quad bu_x + av_y = 0,$$

注意到 $\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 > 0$, 系数矩阵满秩. 则上述方程组只有零解, 故 u 为常数. 同理 v 为常数. 故 $f(z)$ 是常数.

□

定义 0.5 (调和函数)

设 u 是区域 D 上的实值函数, 如果 $u \in C^2(D)$, 且对任意 $z \in D$, 有

$$\Delta u(z) = \frac{\partial^2 u(z)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(z)}{\partial y^2} = 0, \quad (8)$$

就称 u 是 D 中的调和函数. $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 称为 Laplace 算子.

♣

命题 0.4

设 $u \in C^2(D)$, 那么 $\Delta u = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}}$.

♣

证明 Show/Hide Proof

由(1)式, 有

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y} \right), \\ \frac{\partial}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right), \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} &= \frac{\partial}{\partial \bar{z}} \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{1}{4} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) + i \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) = \frac{1}{4} \Delta u. \end{aligned}$$

□

定理 0.5

设 $f = u + iv \in H(D)$, 那么 u 和 v 都是 D 上的调和函数.

**证明** Show/Hide Proof

因为 $f \in H(D)$, 由定理 0.4, 有

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0, \quad \frac{\partial \bar{f}}{\partial z} = 0.$$

所以

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = \frac{\partial^2 \bar{f}}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

于是, 由 $u = \frac{1}{2}(f + \bar{f})$ 即得

$$\Delta u = 4 \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

同理可证 $\Delta v = 0$.

**定义 0.6 (共轭调和函数)**

设 u 和 v 是 D 上的一对调和函数, 如果它们还满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \end{cases} \quad (9)$$

就称 v 为 u 的共轭调和函数.

**命题 0.5**

全纯函数的实部和虚部就构成一对共轭调和函数.

**证明** Show/Hide Proof

由定理 0.5 和定理 0.4 立得.

**定理 0.6**

设 u 是单连通区域 D 上的调和函数, 则必存在 u 的共轭调和函数 v , 使得 $u + iv$ 是 D 上的全纯函数.

**证明** Show/Hide Proof

因为 u 满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

若令 $P = -\frac{\partial u}{\partial y}, Q = \frac{\partial u}{\partial x}$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial P}{\partial y},$$

所以

$$Pdx + Qdy = -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy$$

是一个全微分, 因而积分

$$\int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y}dx + \frac{\partial u}{\partial x}dy$$

与路径无关. 令

$$v(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy,$$

则

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y_0)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy + \int_{(x, y_0)}^{(x, y)} -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy \\ &= \int_{x_0}^x -\frac{\partial u}{\partial y} dx + 0 + 0 + \int_{y_0}^y \frac{\partial u}{\partial x} dy \\ &= \int_{x_0}^x -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \int_{y_0}^y \frac{\partial u}{\partial x} dy. \end{aligned}$$

那么

$$\begin{cases} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}, \\ \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}. \end{cases}$$

所以, v 就是要求的 u 的共轭调和函数.

□

定理 0.7 (函数在一点解析的充要条件)

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点 z_0 的某个邻域内有定义, 则 $f(z)$ 在 z_0 点解析的充要条件是以下条件之一:

- (1) $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内处处可导.
- (2) $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 z_0 的某个邻域内具有连续的一阶偏导数, 且在该邻域内满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

- (3) $f(z)$ 在 z_0 的某个邻域内可以展开成 $(z - z_0)$ 的幂级数, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

- (4) $v(x, y)$ 在 z_0 的某个邻域内是 $u(x, y)$ 的共轭调和函数.

♡

定理 0.8 (函数在区域内解析的充要条件)

设 $D \subset \mathbb{C}$, 则

- (1) 函数 $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 D 内解析的充要条件是 u, v 在 D 内是可微的, 且满足 Cauchy-Riemann 方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}.$$

- (2) 函数 $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析的充要条件为:

- (i) u_x, u_y, v_x, v_y 在 D 内连续;
- (ii) $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内满足 Cauchy-Riemann 方程.

- (3) 函数 $f(z)$ 在区域 D 内解析的充要条件是:

- (i) $f(z)$ 在 D 内连续.
- (ii) 对任一可求长简单闭曲线 C , 只要 C 及其内部全含于 D 内, 就有 $\int_C f(z) dz = 0$.

- (4) 函数 $f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 D 内解析的充要条件为在区域 D 内 $v(x, y)$ 是 $u(x, y)$ 的共轭调和函数.

- (5) 函数 $f(z)$ 在 D 内解析的充要条件为 $f(z)$ 在 D 内可局部 (逐点) 展开为幂级数, 即 f 在 D 内任一点 a

的邻域内可展开成 $z - a$ 的幂级数, 即

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$



例题 0.3 设 $f(z) = |z|^2$, 则以下常见错误命题均不成立:

- (1) 若 $f(z)$ 在 z_0 不解析则不可导. 反例: $f(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 处可导但不解析.
- (2) 若 $f(z)$ 在 z_0 可导则解析. 反例: $f(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 处可导但不解析.
- (3) 若 u, v 在 z_0 满足 C-R 方程则 $f(z)$ 在 z_0 解析. 反例: $f(z) = |z|^2$ 在 $z = 0$ 处满足 C-R 方程, 但在 $z = 0$ 的任意邻域内不满足 C-R 方程, 因此不解析.