

# Simplex Example

- iteration-by-iteration standard-form example

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-1, -2)$

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-1, -2)$
- choose  $\eta_2 = 2$  to **enter** basis

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-1, -2)$
- choose  $\eta_2 = 2$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_2 \longrightarrow d_B = (-1, -2, 0)$

## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-1, -2)$
- choose  $\eta_2 = 2$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_2 \longrightarrow d_B = (-1, -2, 0)$
- ratio test:  $q = \arg \min_{q | d_{\beta_q} < 0} -\frac{x_{\beta_q}}{d_{\beta_q}} \longrightarrow q = 1, \beta_q = 3$  **exits** basis



## Example

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

**iteration 0:**  $\mathcal{B} = \{3, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 2\}$

**iteration 1:**

- $B = I = B^{-1}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 7, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = 0$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-1, -2)$
- choose  $\eta_2 = 2$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_2 \longrightarrow d_B = (-1, -2, 0)$
- ratio test:  $q = \arg \min_{q | d_{\beta_q} < 0} -\frac{x_{\beta_q}}{d_{\beta_q}} \longrightarrow q = 1, \beta_q = 3$  **exits** basis
- new basis:  $\mathcal{B} = \{2, 4, 5\}$ ,  $\mathcal{N} = \{1, 3\}$

**iteration 2:**

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$

- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-5, 2)$

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-5, 2)$
- choose  $\eta_1 = 1$  to **enter** basis

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-5, 2)$
- choose  $\eta_1 = 1$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_1 \longrightarrow d_B = (2, -3, 1)$



## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-5, 2)$
- choose  $\eta_1 = 1$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_1 \longrightarrow d_B = (2, -3, 1)$
- ratio test:  $q = \arg \min_{q \in \{ 1, \dots, m \} | d_{\beta_q} < 0} -\frac{x_{\beta_q}}{d_{\beta_q}} \longrightarrow q = 2, \beta_q = 4$  **exits** basis

## iteration 2:

- current basis:  $B = \{ 2, 4, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 1, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (2, 3, 3)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (-2, 0, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (-5, 2)$
- choose  $\eta_1 = 1$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_1 \longrightarrow d_B = (2, -3, 1)$
- ratio test:  $q = \arg \min_{q \in \{ 1, \dots, m \} | d_{\beta_q} < 0} -\frac{x_{\beta_q}}{d_{\beta_q}} \longrightarrow q = 2, \beta_q = 4$  **exits** basis
- new basis:  $B = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (5/3, -4/3)$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (5/3, -4/3)$
- choose  $\eta_2 = 3$  to **enter** basis



### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (5/3, -4/3)$
- choose  $\eta_2 = 3$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_3 \longrightarrow d_B = (1/3, 2/3, -2/3)$

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (5/3, -4/3)$
- choose  $\eta_2 = 3$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_3 \longrightarrow d_B = (1/3, 2/3, -2/3)$
- ratio test: only candidate basic variable is  $q = 3$ ,  $\beta_q = 5$  **exits** basis

### iteration 3:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 5 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 3 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = (1/3) \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (4/3, -5/3, 0)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (5/3, -4/3)$
- choose  $\eta_2 = 3$  to **enter** basis
- search dir:  $Bd_B = -a_3 \longrightarrow d_B = (1/3, 2/3, -2/3)$
- ratio test: only candidate basic variable is  $q = 3$ ,  $\beta_q = 5$  **exits** basis
- new basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$

**iteration 4:**

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$

#### iteration 4:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$

#### iteration 4:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$

#### iteration 4:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (0, -1, -2)$

#### iteration 4:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (0, -1, -2)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (1, 2)$



#### iteration 4:

- current basis:  $\mathcal{B} = \{ 2, 1, 3 \}$ ,  $\mathcal{N} = \{ 4, 5 \}$
- $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ,  $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1/2 & 3/2 \end{bmatrix}$
- current itn:  $Bx_B = b \longrightarrow x_B = (4, 1, 2)$
- simplex multipliers:  $B^T y = c_B \longrightarrow y = (0, -1, -2)$
- reduced costs:  $z_N = c_N - N^T y \longrightarrow z_N = (1, 2)$
- $z_N \geq 0 \longrightarrow$  basis is **optimal**