



LÍNEA BOVINOS · POSDESTETE

20.1% PROTEÍNA

BECERRO RECEPCIÓN

Suplemento energético-proteico para becerros después del destete



USO VETERINARIO

Consulte a su médico veterinario

ANÁLISIS GARANTIZADO

COMPONENTE	VALOR	
Proteína cruda	20.1 %	Mín.
Fibra cruda	5.5 %	Mín.
E.L.N.	51.0 %	Mín.
Cenizas	7.0 %	Mín.
Humedad	12.0 %	Mín.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

BECERRO RECEPCIÓN 20 contiene micronutrientes (vitaminas y minerales) y aditivos necesarios para satisfacer los requerimientos de becerros desde los 90 días de edad hasta los 7 meses, sin amamantamiento restringido.

INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN

Ofrecer de 1 a 2 kg por animal por día de BECERRO RECEPCIÓN 20 en comederos limpios. Además, proporcionar forrajes de buena calidad como alfalfa en prefloración o inicio de floración, o heno de pasto antes de espigar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

INGREDIENTES

Granos de cereal, productos proteicos vegetales (pasta de soya, grano seco de destilería), subproductos procesados de cereales (salvado, salvadillo), melaza, dextrosa, carbonato de calcio, fosfato monocalcico, sal, óxido de magnesio, cloruro de potasio, bicarbonato de sodio, suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina E, levadura *Saccharomyces cerevisiae* (liofilizada), propionato de calcio (preservativo), etoxiquina (preservativo), sulfato de cobre, lisinato de cobre, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, metionina de zinc, sulfato ferroso, etilendiamina dihidroiodo (EDDI), selenito de sodio y carbonato de cobalto.

ADVERTENCIAS

Mantenga este saco bien cerrado en un lugar seco. No ofrecer este suplemento como único alimento.

NOTA TÉCNICA

Suplemento para la etapa posterior al destete. Ajustar el consumo según peso, condición corporal y disponibilidad de forraje.

FORRAJE

Acompañar con forraje limpio y palatable.

CONSUMO

Ajustar de 1 a 2 kg por animal al día.

TRANSICIÓN

Introducir gradualmente después del destete.

DATOS DE USO Y MANEJO

PRESENTACIÓN
40 KG

ADMINISTRACIÓN
ORAL

LÍNEA
POSDESTETE