

An illustration featuring two hands, one light-skinned and one dark-skinned, cupping a large red heart. The background is a vibrant purple and pink, decorated with various symbols including white hearts, a blue circle, a pink circle, a pink male symbol, and a pink female symbol. The text is overlaid on the central part of the image.

**“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad.”**

**World Health Organization**

# Disfunciones sexuales.

Asignatura: Psicopatología Niñez y Adolescencia.

Estudiante: Zulma Held E-8-104014



# Introducción

**Disfunciones sexuales:** son alteraciones persistentes en el deseo sexual, la excitación, el orgasmo o el dolor relacionado con la actividad sexual, que generan malestar significativo en la persona o dificultades en sus relaciones interpersonales.

Según el DSM-5, para diagnosticar una disfunción sexual los síntomas deben mantenerse aproximadamente por **6 meses**, presentarse con frecuencia y causar malestar clínicamente significativo.



# Factores que pueden causar disfunciones sexuales:



## Factores psicológicos

- Ansiedad
- Depresión
- Estrés
- Baja autoestima
- Trauma sexual
- Problemas de pareja
- Miedo al fracaso sexual



# Factores biológicos

Diabetes

Problemas hormonales

Enfermedades cardiovasculares

Problemas neurológicos

Menopausia

Enfermedades de la próstata



# Factores farmacológicos

Algunos medicamentos pueden provocar disfunciones sexuales:

- Antidepresivos
- Antipsicóticos
- Antihipertensivos
- Alcohol y drogas



# CLASIFICACIÓN SEGÚN DSM-5

| Trastorno                                        | Característica principal                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trastorno del interés/excitación sexual femenino | Poco interés sexual                        |
| Trastorno de deseo sexual hipoactivo masculino   | Disminución del deseo sexual               |
| Trastorno eréctil                                | Dificultad para mantener erección          |
| Eyacuación precoz                                | Eyacuación rápida                          |
| Eyacuación retardada                             | Retraso o ausencia de eyacuación           |
| Trastorno orgásmico femenino                     | Dificultad para alcanzar orgasmo           |
| Trastorno genitopélvico/penetración              | Dolor durante relaciones sexuales          |
| Disfunción sexual inducida por sustancias        | Problema causado por medicamentos o drogas |

# TRASTORNO DEL INTERÉS/EXCITACIÓN SEXUAL FEMENINO

¿Qué es?

Disminución persistente del interés sexual femenino.

## Síntomas

- Poco deseo sexual.
- Falta de placer.
- Escasas fantasías sexuales.
- Disminución de excitación.

## Factores asociados

- Estrés
- Ansiedad.
- Problemas Hormonales.
- Conflictos de pareja.



# TRASTORNO DE DESEO SEXUAL HIPOACTIVO MASCULINO

**¿Qué es?** Disminución persistente del deseo sexual en hombres.

## **Síntomas**

- Bajo interés sexual
- Pocas fantasías sexuales
- Evitación de relaciones sexuales

## **Factores asociados**

- Ansiedad
- Estrés
- Problemas hormonales





## TRASTORNO ERÉCTIL

### ¿Qué es?

Dificultad persistente para lograr o mantener una erección.

### Síntomas

- Erección insuficiente
- Dificultad para mantener la erección
- Disminución de rigidez

### Factores asociados

- Diabetes
- Hipertensión
- Ansiedad
- Alcoholismo

## EYACULACIÓN PRECOZ

### ¿Qué es?

Eyacuación que ocurre antes de lo deseado.

### Características

- Ocurre rápidamente
- Poco control eyaculatorio
- Genera frustración y ansiedad



## EYACULACIÓN RETARDADA

### ¿Qué es?

Retraso marcado o ausencia de eyacuación.

### Síntomas

- Mucho tiempo para eyacular
- Dificultad para alcanzar orgasmo

### Causas

- Medicamentos
- Ansiedad
- Problemas neurológicos

## TRASTORNO ORGÁSMICO FEMENINO

### ¿Qué es?

Dificultad persistente para alcanzar el orgasmo.

### Síntomas

- Orgasmo ausente o reducido
- Malestar emocional

## TRASTORNO DE DOLOR GENITOPÉLVICO/PENETRACIÓN

### ¿Qué es?

Dolor intenso relacionado con la penetración.

### Síntomas

- Dolor durante relaciones sexuales
- Miedo a la penetración
- Tensión muscular

## DISFUNCIÓN SEXUAL INDUCIDA POR SUSTANCIAS

### ¿Qué es?

Problemas sexuales provocados por sustancias o medicamentos.

### Sustancias relacionadas

- Alcohol
- Drogas
- Antidepresivos
- Antipsicóticos

## ¿QUÉ ES LO MÁS NOVEDOSO?

- Actualmente las investigaciones indican que las disfunciones sexuales deben abordarse desde un enfoque biopsicosocial.

### **Aspectos más estudiados actualmente**

- Ansiedad sexual
- Trauma psicológico
- Estrés laboral
- Impacto de la pornografía
- Problemas de pareja
- Salud mental

## ESTADÍSTICAS

### **Internacionales**

- 9.3% de mujeres presentan disfunciones sexuales.
- 6.2% de hombres presentan disfunciones sexuales.

### **Panamá**

Se relaciona la importancia de la salud sexual con el bienestar psicológico y emocional.

# CUADRO COMPARATIVO DSM-5 VS CIE-11

| Aspecto           | DSM-5                                                               | CIE-11                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Definición        | Alteración persistente en deseo, excitación, orgasmo o dolor sexual | Alteración clínica del funcionamiento sexual |
| Duración          | Mínimo 6 meses                                                      | Persistencia clínica significativa           |
| Malestar clínico  | Obligatorio                                                         | Considera afectación funcional               |
| Deseo sexual      | Deseo sexual hipoactivo                                             | Disfunción del deseo sexual                  |
| Erección          | Trastorno eréctil                                                   | Disfunción eréctil                           |
| Eyacuación precoz | Eyacuación prematura                                                | Eyacuación temprana                          |
| Dolor sexual      | Trastorno genitopélvico                                             | Dolor sexual asociado a penetración          |
| Enfoque           | Psicológico y psiquiátrico                                          | Médico y funcional                           |



## EXPLICACIÓN DEL CUADRO COMPARATIVO

### Similitudes

- Ambos reconocen problemas en deseo, excitación y orgasmo.
- Ambos requieren persistencia de síntomas.
- Ambos consideran el impacto emocional y funcional.


### Diferencias

#### DSM-5

- Enfoque psicológico
- Importancia del malestar emocional
- Más utilizado en psicología clínica

#### CIE-11

- Enfoque médico y funcional
- Clasificación internacional de enfermedades
- Lenguaje menos estigmatizante



# INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

## Investigación

Koops et al. (2023)

## Hipótesis

Las disfunciones sexuales diagnosticadas clínicamente serían menores que las dificultades sexuales reportadas.

## Variables

- Deseo sexual - Orgasmo
- Malestar clínico -Excitación

## Muestra

Hombres y mujeres adultos.

## Resultado

Mayor prevalencia en mujeres que en hombres.

# FIGURAS PÚBLICAS

## Figuras públicas que han hablado sobre salud sexual

- Michael Douglas
- Terry Crews
- Lady Gaga
- Selena Gomez

Estas figuras han hablado públicamente sobre problemas relacionados con salud sexual, trauma emocional o dificultades íntimas.





Video

<https://www.youtube.com/watch?v=kVCLersq2bo>

# Resumen

Las disfunciones sexuales afectan el bienestar físico, emocional y psicológico.

Actualmente se entienden desde un enfoque biopsicosocial, considerando factores emocionales, médicos y sociales.

Es importante reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional.







Gracias