



华南理工大学
South China University of Technology

本科毕业设计（论文）

喀麦隆外海波浪特性分析

学 院	土木与交通学院
专 业	船舶与海洋工程
学生姓名	谭伟聪
学生学号	201430160375
指导教师	朱良生
提交日期	2018 年 6 月 日

印刷封面纸用 210g 的橙色卡纸

摘 要

喀麦隆共和国位于非洲中部，是该地区政治经济强国，有较大的经济发展潜力；其外海为几内亚湾的一部分，位于南大西洋，拥有丰富的石油和天然气资源。1974年，在与法国的合作下，喀麦隆于其西北部海域发现油田，后正式开始进行原油开采并出口，加工石油产品及出售原油成为国民经济的重要组成部分。为应对日益严重的能源形势，为确保我国能源的充足供应，与他国合作开发资源成为解决能源问题的新思路。喀麦隆外海丰富的石油资源和我国的基建设备相结合，可实现两国间的互助互惠。基于上述原因，对于喀麦隆外海的波浪特性及其变化规律的分析，对于海洋石油的勘探和开发尤其重要。

本文主要运用脚本语言 Python 对喀麦隆外海的取样点 37 年来（1979-2015）的波浪数据进行分析，广泛运用 Python 语言中各类数据储存形式提高运算效率，运用 Numpy、Pandas 工具包进行数据的预处理和运算，运用 sklearn 深度学习工具包进行数据的线性回归分析，运用 matplotlib、scipy、Windrose 工具包进行数据的可视化展示。

根据研究，本文得出如下结论：

喀麦隆外海

关键词：多变量系统；预测控制；环境试验设备

Abstract

Artificial Neuron Network (ANN) simulates human being's brain function and build the network structure. Convolutional Neural Network (CNN) have many advantage, such as

(2) This paper introduces the common pretreatment method of image, such as collecting image, normalization, graying and binarization. And apply these to the handwritten numeral recognition experiment and handwritten numerals writer recognition experiments.

Keywords: Writer recognition ; Convolutional Neural Network ; Handwritten character recognition

目 录

摘 要	I
目 录	III
第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 研究背景	1
1.3 研究现状	2
1.4 数据来源	2
1.5 本文研究技术路线	2
1.6 论文结构	2
第二章 基础理论方法	4
2.1 随机波理论简介	4
2.2 随机波统计理论基础	4
2.2.1 有效波高及平均周期的定义	4
2.2.2 特征波的定义——部分大波均值	4
2.3 波高分布	4
2.4 Python 程序语言简介	4
第三章 喀麦隆外海年、季波浪特征分析	5
3.1 年、季平均周期及有效波高均值分布	5
3.1.1 年、季平均周期均值分布	5
3.1.2 年、季有效波高均值分布	7
3.2 平均周期、有效波高及波浪来向特征分析	9
3.2.1 平均周期特征分析	9
3.2.2 有效波高特征分析	11
3.2.3 波浪来向特征分析	14
3.3 有效波高与波浪来向的联合分布	17
3.4 平均周期与有效波高的联合分布	21
3.5 强浪与常浪特征分析	26

第四章 波浪特征时间（逐月）变化规律分析	28
4.1 周期、有效波高、风速及主波向逐月时间过程	28
4.1.1 平均周期逐月变化过程	28
4.1.2 有效波高逐月时间过程	28
4.1.3 海面风速逐月时间过程	29
4.1.4 主波向逐月时间过程	30
4.2 波高与风速的相关性分析（分季及不分季分析）	30
4.2.1 全年（不分季）波高与海面风速的相关性分析	30
4.2.2 分季波高与海面风速的相关性分析	31
4.3 强浪相关性分析	33
4.3.1 强浪风速与有效波高的相关性分析	33
4.3.2 强浪风速与平均周期的相关性分析	35
4.3.3 强浪平均周期与有效波高的相关性分析	37
4.4 本章小结	39
第五章 大浪特征变化及趋势分析	40
5.1 大浪特征变化（长期）	40
5.2 重现期分析	48
5.3 本章小结	49
结论	50
1. 论文工作总结	50
2. 工作展望	50
参考文献	51
致谢	53

第一章 绪论

1.1 引言

喀麦隆共和国位于撒哈拉沙漠以南的西非洲，其经济、政治、军事实力在邻近国家属于较高水平。其外海属于几内亚湾的邦尼湾，自 1979 年与法国合作在其西海岸发现油田以来，原油和石油产品的出售成为其重要经济来源。喀麦隆外海的油气资源开发潜力巨大，结合我国强大的基建和石油设备生产能力，与喀麦隆进行合作开采将促进当地就业和经济发展，促进中非友谊和互惠。

本文主要对喀麦隆外海的波浪特征进行分析和趋势研究，并对极端海况进行预测，以对该海区的波浪特征达成大致了解，为该海区石油开采提供理论依据。

本文主要使用开源脚本语言 Python 对 1979~2015 年该海区的波浪数据进行分析，使用其 matplotlib 工具包对分析结果进行可视化展示，以直观地分析该海区波浪的全年及分季特征、有效波高与波向的联合分布、有效波高与平均周期的联合分布，并使用 sklearn 工具包对风速与有效波高、风速与平均周期、平均周期与有效波高进行线性回归分析。

1.2 研究背景

作为非洲最大的海湾，几内亚湾沿岸拥有丰富的石油资源，有潜力在未来成为重要产油区。除喀麦隆外，几内亚湾还有尼日利亚、科特迪瓦等国家，各国政府均希望并欢迎中国政府及企业加强对几内亚湾油气资源开采的合作，以促进当地的就业和经济发展。目前中国海洋石油集团已成功与尼日利亚政府合作，对该国于几内亚湾凌海的油气资源进行开发，原油产量也逐年上升。[1]

几内亚湾地处南大西洋，范围大致与东经 $4^{\circ} \sim 8^{\circ}$ ，北纬 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ ，水深范围约 1400m~2000m，属于沉积和构造特征复杂的尼日利亚三角洲盆地，油气资源丰富。[2] 对于本文所采取采样点而言，全年盛行西南风，导致波浪来向较为单一，主要为 SSW，SW 及 S 方向上偶有分布。波高常年处于 0~3m 的区间，各月均值均于 1m~2m 之间，波动范围较小。图 1-1 展示了喀麦隆外海地理位置，图钉初即本文数据来源的采样点（图片来源：Google Earth）。

基于以上论述，加强对几内亚湾海区波浪特征的研究，能对当地海洋工程及海岸工程的施工评估提供重要理论依据，对于加强中喀合作对几内亚湾油气资源的开采有重大意义。

1.3 研究现状

目前国内外关注喀麦隆外海海区波浪特征的专项学术研究较少，研究过程中主要参考国内外学者针对其他海区进行波浪特征分析的研究成果。

1.4 数据来源

本文应用 ECMWF 波浪资料，计算工程附近海域常年波浪。此模型数据由欧洲中期天气预报组织组织 15 国研发得到。后报研究均采用深水的第三代波浪数学模型，精度为 $0.703125^{\circ} \text{N} \times (0.696-0.702)^{\circ} \text{E}$ ，6 小时 1 次。资料为 1979 年~2015 年的喀麦隆外海海区数据。

1.5 本文研究技术路线

1.6 论文结构

本文共包括五章。

第一章概述本文的研究背景和研究方法，简述了喀麦隆外海的波浪研究现状，介绍本文的结构和研究路线。

第二章介绍了本文的理论基础，主要包括有效波高、平均周期的定义和波高的几种分布模型，最后简要介绍了本文的主要计算分析工具 Python 语言。

第三章主要针对喀麦隆外海的波浪特征进行全年及分季的分析，包括波向、有效波高和平均周期，并对其逐年变化规律进行线性回归分析；然后对有效波高和波向的联合分布、有效波高与平均周期的联合分布进行分析。

第四章主要分析波浪特征各要素的逐月变化规律，包括：

- (1) 有效波高、平均周期、海面风速和主波向的逐月时间过程；

- (2) 海面风速与有效波高的相关关系分析;
- (3) 海面风速与平均周期的相关关系分析;
- (4) 有效波高与平均周期的相关关系分析。

并绘制相关的折线图、散点图分析其特征。

第五章主要对全年及各季的大浪随时间（逐年）变化趋势进行分析，发现各等级大浪变化特征和变化趋势，并计算多年重现期大浪波高。

如无其他说明，本文采用如下统一计量单位：

有效波高——m	波向——°（角度，deg）
平均周期——s	概率——%
风速——m/s	

第二章 基础理论方法

2.1 随机波理论简介

2.2 随机波统计理论基础

2.2.1 有效波高及平均周期的定义

2.2.2 特征波的定义——部分大波均值

2.3 波高分布

2.4 Python 程序语言简介

Python 是一种开源的高级脚本语言，由荷兰程序员 Guido van Rossum 于其一个圣诞节假期所发明，与 1991 年发布。其开源性吸引了世界各地的开发者为 Python 开发社群制作了大量可使 Python 语言应用于各个学科领域的工具包，其中最广被其他学科用作科研工具的包括数据研究的工具包 Pandas、用于矩阵运算的 Numpy、用于科学运算的 Numpy、用于机器学习的 sklearn 和用于数据可视化的 matplotlib。Python 现已广泛应用于后端开发、人工智能及深度学习、数据挖掘及科学计算等方面。

Python 语言具有极高的可读性（与 C 和 FORTRAN 相比），十分容易被科研工作者所学习，并通过调用工具包降低学习的时间成本，也便于脚本的继承和传播。

本文主要使用开源脚本语言 Python 对 1979~2015 年该海区的波浪数据进行分析，使用其 matplotlib 工具包对分析结果进行可视化展示。

第三章 喀麦隆外海年、季波浪特征分析

3.1 年、季平均周期及有效波高均值分布

3.1.1 年、季平均周期均值分布

由表 3-1 我们可以得知, 平均周期的年均值最大值出现在 2002 年, 为 9.604s; 最小值出现在 1992 年, 为 8.789s。平均周期的冬季均值最大值出现在 2010 年, 为 9.408s; 最小值出现在 1980 年, 为 8.337s。平均周期的春季均值最大值出现在 2002 年, 为 10.404s; 最小值出现在 1988 年, 为 9.206s。平均周期的夏季均值最大值出现在 1999 年, 为 9.802s; 最小值出现在 1983 年, 为 8.259s。平均周期的夏季均值最大值出现在 2007 年, 为 9.634s; 最小值出现在 1992 年, 为 8.380s。

图 3-1 为平均周期的年、季均值逐年变化图。可以看出, 平均周期的年、季均值随年份增长呈明显增长趋势, 且数据离散性较大。春、秋两季增长趋势两者回归趋势线斜率较为接近, 且较平均周期的年均值增长回归趋势更快。夏、冬两季均值回归趋势线斜率较为接近年均值回归趋势线, 截距有明显差距。

如无下文无特别说明, 本文冬季指 1、2、12 月份 (DJF), 春季指 3、4、5 月份 (MAM), 夏季指 6、7、8 月份 (JJA), 秋季指 9、10、11 月份 (SON)。

表 3-1 波浪周期年、季平均值分布

年份	年	冬季	春季	夏季	秋季
1979	9.022	8.748	9.719	8.945	8.666
1980	8.807	8.337	9.683	8.576	8.624
1981	8.815	8.651	9.206	8.640	8.758
1982	9.042	8.708	9.832	8.742	8.878
1983	8.841	8.990	9.257	8.259	8.864
1984	9.396	9.022	10.166	9.593	8.791
1985	9.235	8.757	9.372	9.577	9.223
1986	9.107	9.065	9.813	8.952	8.592
1987	9.114	8.814	9.621	8.772	9.244

1988	8.964	8.768	9.206	8.778	9.104
1989	9.256	9.267	9.504	9.148	9.104
1990	9.315	9.152	9.358	9.301	9.448
1991	9.147	9.184	9.898	8.740	8.762
1992	8.789	8.846	9.410	8.515	8.380
1993	9.213	9.091	9.290	8.968	9.505
1994	9.107	8.956	9.787	8.644	9.037
1995	9.267	8.855	9.629	9.263	9.314
1996	9.197	8.621	9.252	9.644	9.267
1997	9.384	9.135	9.861	9.140	9.396
1998	9.389	8.977	9.929	9.136	9.506
1999	9.583	9.225	10.198	9.802	9.095
2000	9.197	8.756	9.474	9.381	9.170
2001	9.400	9.126	10.007	9.394	9.061
2002	9.604	9.024	10.404	9.537	9.438
2003	9.311	9.207	9.747	9.209	9.076
2004	9.051	8.771	9.231	8.843	9.361
2005	9.136	8.751	9.626	8.954	9.206
2006	9.150	8.536	9.468	9.123	9.462
2007	9.436	9.016	9.456	9.631	9.634
2008	9.502	9.124	10.086	9.373	9.421
2009	9.496	8.684	10.249	9.495	9.537
2010	9.408	9.341	9.288	9.591	9.408
2011	9.365	8.787	9.870	9.339	9.451
2012	9.262	8.803	9.551	9.545	9.142
2013	9.335	9.064	9.682	9.273	9.315
2014	9.125	8.962	9.717	9.173	8.641
2015	9.152	9.007	9.208	8.937	9.456




图 3-1 平均周期年、季均值分布

3.1.2 年、季有效波高均值分布

由表 3-2 我们可以得知, 年平均有效波高最大值出现在 1982 年, 为 1.313m; 最小值出现在 2004 年, 为 1.194m。冬季平均有效波高最大值出现在 1987 年, 为 1.078m; 最小值出现在 2011 年, 为 0.954m。春季平均有效波高最大值出现在 1982 年, 为 1.261m; 最小值出现在 2015 年, 为 1.085。夏季平均有效波高最大值出现在 1990 年, 为 1.604m; 最小值出现在 2004 年, 为 1.345s。秋季平均有效波高最大值出现在 1982 年, 为 1.330m; 最小值出现在 1993 年, 为 1.147m。

图 3-2 为年、季平均有效波高逐年变化图。可以看出, 年、季平均有效波高随年份增长呈明显下降趋势。春、秋两季增长趋势两者回归趋势线与年平均有效波高回归趋势线趋势线较为接近。夏、冬两季呈现出明显的季节性差异, 夏季平均有效波高较高, 冬季平均有效波高较低。

表 3-2 有效波高年、季平均值分布

年份	年	冬季	春季	夏季	秋季
1979	1.289	1.018	1.273	1.567	1.293
1980	1.279	0.995	1.298	1.501	1.319
1981	1.269	1.018	1.261	1.518	1.274
1982	1.313	1.039	1.307	1.568	1.330
1983	1.265	1.019	1.229	1.496	1.314

1984	1.228	1.039	1.246	1.443	1.182
1985	1.218	0.989	1.180	1.502	1.195
1986	1.280	1.075	1.221	1.540	1.279
1987	1.251	1.078	1.238	1.432	1.252
1988	1.203	0.991	1.164	1.415	1.241
1989	1.235	1.044	1.192	1.488	1.209
1990	1.296	1.067	1.189	1.604	1.319
1991	1.261	1.028	1.227	1.513	1.271
1992	1.229	1.006	1.242	1.520	1.147
1993	1.227	1.048	1.216	1.448	1.193
1994	1.242	1.007	1.249	1.475	1.233
1995	1.215	0.968	1.116	1.517	1.255
1996	1.224	0.976	1.086	1.548	1.283
1997	1.242	1.015	1.268	1.480	1.200
1998	1.225	1.003	1.210	1.416	1.267
1999	1.235	0.988	1.207	1.497	1.242
2000	1.197	0.967	1.113	1.468	1.237
2001	1.272	1.035	1.245	1.557	1.245
2002	1.284	1.026	1.306	1.564	1.235
2003	1.217	1.072	1.230	1.400	1.162
2004	1.194	1.013	1.213	1.345	1.204
2005	1.225	0.995	1.230	1.453	1.218
2006	1.223	0.984	1.178	1.456	1.270
2007	1.266	1.053	1.180	1.551	1.278
2008	1.217	1.000	1.212	1.403	1.253
2009	1.250	0.961	1.222	1.536	1.275
2010	1.216	1.042	1.138	1.462	1.218
2011	1.219	0.954	1.218	1.482	1.217
2012	1.233	0.995	1.168	1.541	1.224
2013	1.245	1.034	1.177	1.508	1.255
2014	1.238	1.032	1.185	1.554	1.175
2015	1.218	1.007	1.085	1.484	1.293




图 3-2 有效波高年、季均值分布

3.2 平均周期、有效波高及波浪来向特征分析

3.2.1 平均周期特征分析

将喀麦隆外海观测点 37 年来的有效波高数据分年、季利用 Python 的 `numpy.histogram` 工具包进行频数分布统计，从 5s 到 16s 每 0.5s 划分平均周期区间，统计每个平均周期并使用 `matplotlib.bar` 工具包进行频数分布直方图的绘制。

由图 3-3~3-7 我们可以看出，平均周期均服从单峰分布，大量平均周期数值集中在某个区间，往两边递减。年平均周期出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 8s~10.5s（包含 5 个区间）；冬季平均周期出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 7.5s~10s（包含 5 个区间）；春季平均周期出现概率的峰值在 9.25s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 8.5s~10.5s（包含 4 个区间）；夏季平均周期出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 7.5~10s（包含 5 个区间）；秋季平均周期出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 8s~10s（包含 4 个区间）。

表 3-3 列出了年及冬、春、夏、秋四季平均周期数据的方差、偏度和峰度。我们可以看出，平均周期方差较大，数据离散程度较高，于夏季尤甚；偏度均略大于 0，说明平均周期数据均略微右偏，对称性较好；峰度均接近 0（因正态分布峰度为 3，因实

际操作中一般将峰度减 3，便于与正态分布比较，下同)。据此可得，年及各季平均周期数据均较接近正态分布。

表 3-3 平均周期数据的方差、偏度和峰度

	方差	偏度	峰度
年	1.5107	0.4003	0.3215
冬季	1.1788	0.4814	0.6391
春季	1.3906	0.4490	0.5541
夏季	1.7466	0.3501	-0.0765
秋季	1.4350	0.3871	0.3810




图 3-3 年平均周期概率分布




图 3-4 冬季平均周期概率分布




图 3-5 春季平均周期概率分布




图 3-6 夏季平均周期概率分布




图 3-7 秋季平均周期概率分布

3.2.2 有效波高特征分析

统计方法同 3.2.1，将有效波高从 0m 到 3m 每 0.25m 划分有效波高区间。

由图 3-8~3-12 我们可以看出，有效波高均服从单峰分布，大量有效波高数值集中在某个区间，往两边递减。年有效波高出现概率的峰值在 1.125m 左右，出现概率大于 10% 的区间为 0.75m~1.75m（包含 4 个区间）；冬季有效波高出现概率的峰值在 1.125m 左右，出现概率大于 10% 的区间为 0.75m~1.75m（包含 4 个区间）；春季有效波高出现概率的峰值在 1.125m 左右，出现概率大于 10% 的区间为 0.75m~1.5m（包含 3 个区间）；夏季有效波高出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 7.5~10s（包含 5 个区间）；秋季有效波高出现概率的峰值在 8.75s 左右，出现概率大于 10% 的区间为 8s~10s（包含 4 个区间）。

表 3-4 列出了年及冬、春、夏、秋四季有效波高数据的方差、偏度和峰度。我们可以看出，有效波高数据方差较小，离散程度较低。偏度均大于 0，说明有效波高数据均右偏。年以及春季、秋季峰度较小，较为接近正态分布。夏季及冬季峰度较大。

表 3-4 有效波高数据的方差、偏度和峰度

	方差	偏度	峰度
年	0.0805	0.7507	0.5969
冬季	0.0272	0.6941	0.8078
春季	0.0495	0.8127	1.1305
夏季	0.0671	0.5812	0.5645
秋季	0.0626	0.8514	1.3178




图 3-8 年有效波高概率分布




图 3-9 冬季有效波高概率分布




图 3-10 春季有效波高概率分布




图 3-11 夏季有效波高概率分布




图 3-12 秋季有效波高概率分布

3.2.3 波浪来向特征分析

本文所收集源数据为波向为波浪去向（travelling direction），因此在预处理时将所有波向加上 180° 转换为波浪来向（coming direction），并将所有波向大于 348.75° 的数据减去 360°。如无其他说明，本文所指“波向”均为经处理后的波浪来向。本文按图 3-13 划分波向：




图 3-13 波向划分示意图

表 3-5 列出了年、季波向分布情况。可以看出，全年及各季节喀麦隆外海波向主要集中于南西南（SSW）方向，少部分处于南（S）及西南（SW），其他方向的波浪出现概率为 0 或近乎为 0。

图 3-14~3-18 为喀麦隆外海的风速风向玫瑰图，可以看出，当地全年海面风场方向较为一致，可推断波向主要受海面盛行风风向影响。本文将于第四章进一步论述海面风场风速与波高之间的关系。

表 3-5 年、季波向分布表

年			冬			春			夏			秋		
波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率
N	0	0.0	N	0	0.00	N	0	0.00	N	0	0.00	N	0	0.00
NNE	0	0.0	NNE	0	0.00	NNE	0	0.00	NNE	0	0.00	NNE	0	0.00
NE	0	0.0	NE	0	0.00	NE	0	0.00	NE	0	0.00	NE	0	0.00
ENE	0	0.0	ENE	0	0.00	ENE	0	0.00	ENE	0	0.00	ENE	0	0.00
E	0	0.0	E	0	0.00	E	0	0.00	E	0	0.00	E	0	0.00
ESE	0	0.0	ESE	0	0.00	ESE	0	0.00	ESE	0	0.00	ESE	0	0.00
SE	0	0.0	SE	0	0.00	SE	0	0.00	SE	0	0.00	SE	0	0.00
SSE	1	0.0	SSE	1	0.01	SSE	0	0.00	SSE	0	0.00	SSE	0	0.00
S	2420	4.5	S	528	3.95	S	707	5.19	S	359	2.64	S	826	6.13
SSW	49068	90.8	SSW	12279	91.94	SSW	12629	92.75	SSW	12296	90.31	SSW	11864	88.09
SW	2564	4.7	SW	545	4.08	SW	280	2.06	SW	961	7.06	SW	778	5.78
WSW	3	0.0	WSW	3	0.02	WSW	0	0.00	WSW	0	0.00	WSW	0	0.00
W	0	0.0	W	0	0.00	W	0	0.00	W	0	0.00	W	0	0.00
WNW	0	0.0	WNW	0	0.00	WNW	0	0.00	WNW	0	0.00	WNW	0	0.00
NW	0	0.0	NW	0	0.00	NW	0	0.00	NW	0	0.00	NW	0	0.00
NNW	0	0.0	NNW	0	0.00	NNW	0	0.00	NNW	0	0.00	NNW	0	0.00
TOTAL	54056	100	TOTAL	13356	100	TOTAL	13616	100	TOTAL	13616	100	TOTAL	13468	100




图 3-14 年风速风向玫瑰图




图 3-15 冬季风速风向玫瑰图




图 3-16 春季风速风向玫瑰图




图 3-17 夏季风速风向玫瑰图




图 3-18 秋季风速风向玫瑰图

3.3 有效波高与波浪来向的联合分布

由表 3-6~3-10 及图 3-19~3-23 我们可以得知，喀麦隆外海波向主要集中于 SSW，S 和 SW 有少量分布，波高主要集中于 0.5m~2m 的区间。冬季波向主要集中于 SSW，S 和 SW 有少量分布，波高主要集中于 0.5m~1.5m。春季波向主要集中于 SSW，S 和 SW 有少量分布，波高主要集中于 0.5m~2m。夏季波向主要集中于 SSW，S 和 SW 有少量分布，波高主要集中于 1m~2m。秋季波向主要集中于主要集中于 SSW，S 和 SW 有少量分布，波高主要集中于 0.5m~2m。

表 3-6 有效波高与波向联合分布表 (%)

Hs/DIR	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	19.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6
1~1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	55.6	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.4
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	14.7	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	90.8	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0




图 3-19 有效波高与波向联合分布图

表 3-7 冬季有效波高与波向联合分布表（%）

Hs/DIR	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	46.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1
1~1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	44.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	91.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0




图 3-20 冬季有效波高与波向联合分布图

表 3-8 春季有效波高与波向联合分布表（%）

Hs/DIR	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	15.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
1~1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	67.6	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	9.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	92.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0




图 3-21 春季有效波高与波向联合分布图

表 3-9 夏季有效波高与波向联合分布表（%）

Hs/DIR	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1~1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	48.2	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.5
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	37.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	90.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0




图 3-22 夏季有效波高与波向联合分布图

表 3-10 秋季有效波高与波向联合分布表 (%)

Hs/DIR	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	14.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
1~1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	61.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	11.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	88.1	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0




图 3-23 秋季有效波高与波向联合分布图

3.4 平均周期与有效波高的联合分布

由表 3-11~3-15 及图 3-24~3-33 可得, 喀麦隆外海有效波高出现范围在 0.5m~2.5m 之间, 平均周期范围为 5s~14s; 联合分布有效波高出现频率最高的范围为 0.5m~2m, 平均波高出现频率最高的范围为 7s~11s。冬季有效波高出现范围在 0.5m~1.5m 之间, 平均周期范围为 5s~14s; 联合分布有效波高出现频率最高的范围为 0.5m~2m, 平均波高出现频率最高的范围为 7s~11s。春季有效波高出现范围在 1m~2m 之间, 平均周期范围为 6s~15s; 联合分布有效波高出现频率最高的范围为 0.5m~2m, 平均波高出现频率最高的范围为 8s~11s。夏季有效波高出现范围在 1m~2m 之间, 平均周期范围为 5s~14s; 联合分布有效波高出现频率最高的范围为 0.5m~2m, 平均波高出现频率最高的范围为 8s~11s。秋季有效波高出现范围在 0.5m~2.5m 之间, 平均周期范围为 7s~14s; 联合分布有效波高出现频率最高的范围为 0.5m~2m, 平均波高出现频率最高的范围为 7s~11s。

表 3-11 有效波高与平均周期联合分布表 (%)

Hs/T	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.7	5.0	10.1	4.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6
1~1.5	0.0	1.4	7.1	16.5	21.4	11.8	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0	61.4
1.5~2	0.0	0.2	1.2	3.1	4.2	4.1	2.6	1.0	0.2	0.0	0.0	16.7
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	1.3
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.1	2.4	13.3	29.7	30.0	16.6	5.8	1.7	0.4	0.0	0.0	100.0




图 3-24 有效波高与平均周期联合分布立体图




图 3-25 有效波高与平均周期联合分布平面图

表 3-12 冬季有效波高与平均周期联合分布表 (%)

Hs/T	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.1	1.8	13.6	23.9	9.7	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1
1~1.5	0.0	0.6	3.4	12.1	19.7	10.4	2.4	0.5	0.1	0.0	0.0	49.0
1.5~2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.9
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.1	2.4	17.0	35.9	29.4	11.5	2.8	0.7	0.2	0.0	0.0	100.0




图 3-26 冬季有效波高与平均周期联合分布立体图




图 3-27 冬季有效波高与平均周期联合分布平面图

表 3-13 春季有效波高与平均周期联合分布表（%）

Hs/T	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.4	2.6	7.9	4.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
1~1.5	0.0	0.3	3.2	14.9	28.3	20.5	5.3	0.6	0.1	0.0	0.0	73.1
1.5~2	0.0	0.0	0.1	0.4	1.2	2.7	3.2	1.8	0.7	0.0	0.0	10.2
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	0.0	0.7	6.0	23.3	34.3	23.8	8.5	2.5	0.9	0.1	0.0	100.0




图 3-28 春季有效波高与平均周期联合分布立体图




图 3-29 春季有效波高与平均周期联合分布平面图

表 3-14 夏季有效波高与平均周期联合分布表 (%)

Hs/T	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
1~1.5	0.1	2.9	12.3	18.0	13.7	5.2	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	53.5
1.5~2	0.0	0.7	3.9	9.6	12.0	9.7	4.5	1.1	0.1	0.0	0.0	41.6
2~2.5	0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	1.1	1.0	0.7	0.2	0.0	0.0	3.9
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL	0.1	3.7	16.8	28.0	26.4	16.1	6.7	2.0	0.3	0.0	0.0	100.0




图 3-30 夏季有效波高与平均周期联合分布立体图




图 3-31 夏季有效波高与平均周期联合分布平面图

表 3-15 秋季有效波高与平均周期联合分布表 (%)

Hs/T	5~6	6~7	7~8	8~9	9~10	10~11	11~12	12~13	13~14	14~15	15~16	TOTAL
0~0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5~1	0.0	0.5	3.7	8.7	2.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4
1~1.5	0.1	2.0	9.4	21.0	23.8	11.0	2.4	0.4	0.0	0.0	0.0	70.0
1.5~2	0.0	0.2	0.6	2.1	3.6	3.6	2.5	0.8	0.1	0.0	0.0	13.6
2~2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.9
2.5~3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
TOTAL	0.1	2.6	13.6	31.9	29.8	15.1	5.2	1.5	0.2	0.0	0.0	100.0




图 3-32 秋季有效波高与平均周期联合分布立体图




图 3-33 秋季有效波高与平均周期联合分布平面图

3.5 强浪与常浪特征分析

将所有本次收集的所有数据按有效波高从小到大排序，取前 1/10 的数据（分位数为 0.1）作为强浪，统计年及各季的强浪波浪数量及其波向，并计算其出现概率，列于表 3-16。

结合表 3-5，我们不难发现，波向分布上，强浪与长浪具有同步性。全年及各季节喀麦隆外海强浪波向主要集中于南西南（SSW）方向，少部分处于南（S）及西南（SW），其他方向的波浪出现概率为 0 或近乎为 0。

表 3-16 年、季强浪波浪数量及概率分布表

年			冬			春			夏			秋		
波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率	波向	数量	概率
N	0	0.0	N	0	0.0	N	0	0.0	N	0	0.0	N	0	0.0
NNE	0	0.0	NNE	0	0.0	NNE	0	0.0	NNE	0	0.0	NNE	0	0.0
NE	0	0.0	NE	0	0.0	NE	0	0.0	NE	0	0.0	NE	0	0.0
ENE	0	0.0	ENE	0	0.0	ENE	0	0.0	ENE	0	0.0	ENE	0	0.0
E	0	0.0	E	0	0.0	E	0	0.0	E	0	0.0	E	0	0.0
ESE	0	0.0	ESE	0	0.0	ESE	0	0.0	ESE	0	0.0	ESE	0	0.0
SE	0	0.0	SE	0	0.0	SE		0.0	SE	0	0.0	SE	0	0.0
SSE	0	0.0	SSE	1	0.1	SSE	0	0.0	SSE	0	0.0	SSE	0	0.0
S	263	4.9	S	44	3.3	S	80	5.8	S	46	3.4	S	100	7.4
SSW	4836	89.2	SSW	1202	89.6	SSW	1250	91.4	SSW	1271	92.6	SSW	1092	81.0
SW	320	5.9	SW	92	6.9	SW	38	2.8	SW	55	4.0	SW	156	11.6
WSW	0	0.0	WSW	3	0.2	WSW	0	0.0	WSW	0	0.0	WSW	0	0.0
W	0	0.0	W	0	0.0	W	0	0.0	W	0	0.0	W	0	0.0
WNW	0	0.0	WNW	0	0.0	WNW	0	0.0	WNW	0	0.0	WNW	0	0.0

第三章 喀麦隆外海年、季波浪特征分析

NW	0	0.0	NW	0	0.0	NW	0	0.0	NW	0	0.0	NW	0	0.0
NNW	0	0.0	NNW	0	0.0	NNW	0	0.0	NNW	0	0.0	NNW	0	0.0
TOTAL	5419	100	TOTAL	1342	100	TOTAL	1368	100	TOTAL	1372	100	TOTAL	1348	100

表 3-17 强浪与常浪有效波高年、季均值对比

	强浪有效波高	常浪有效波高
年	1.8104	1.1783
冬季	1.3431	0.9790
春季	1.6612	1.1581
夏季	2.0027	1.4362
秋季	1.7486	1.1887

第四章 波浪特征时间（逐月）变化规律分析

4.1 周期、有效波高、风速及主波向逐月时间过程

4.1.1 平均周期逐月变化过程

计算 1979~2015 年同月份的平均周期均值，列于表 4-1，绘制图 4-1。平均周期均值呈现双峰结构，最大值出现在 5 月，并于 11 月达到另一个极大值，6~10 月及 12~2 月平均周期均值较低。

表 4-1 平均周期月均值列表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
平均周期均值	8.85	8.94	9.34	9.71	9.90	9.29	9.08	9.03	9.04	9.10	9.29	8.97




图 4-1 平均周期均值逐月时间过程

4.1.2 有效波高逐月时间过程

计算 1979~2015 年同月份的有效波高均值，列于表 4-2，绘制图 4-2。有效波高均值呈现单峰结构，最大值出现在 7 月及 8 月，1~7 月逐月递增，8~12 月逐月递减。

表 4-2 有效波高月均值列表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
有效波高均值	1.00	1.04	1.12	1.20	1.31	1.44	1.52	1.51	1.39	1.23	1.11	1.01




图 4-2 有效波高均值逐月时间过程

4.1.3 海面风速逐月时间过程

计算 1979~2015 年同月份的海面风速均值，列于表 4-3，绘制图 4-3。海面风速月均值呈现单峰结构，最大值出现在 7 月及 8 月，1~7 月逐月递增，8~12 月逐月递减。逐月变化趋势与有效波高类似，两者变化可能存在相关性。本文将于 4.2 论述海面风速及有效波高的相关性。

表 4-3 风速月均值列表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
风速均值	3.08	3.37	3.35	3.27	3.60	4.93	5.53	5.59	4.83	3.83	3.03	2.99




图 4-3 风速均值逐月时间过程

4.1.4 主波向逐月时间过程

计算 1979~2015 年同月份的主波向均值，列于表 4-4，绘制图 4-4，并根据本文 3.2.3 中的方向划分方法进行方向划分。主波向的月均值总体在一个比较小的范围内波动，总体仍处于 SSW 的范围内。

表 4-4 主波向及其方向月均值列表

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
主波向	202.3	203.0	201.6	200.1	200.8	201.8	203.9	205.4	205.4	202.0	198.6	200.8
方向	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW




图 4-4 主波向均值逐月时间过程

4.2 波高与风速的相关性分析（分季及不分季分析）

4.2.1 全年（不分季）波高与海面风速的相关性分析

运用 Python 的 sklearn 工具包对全年有效波高和海面风速进行一次线性回归分析，并求拟合曲线的斜率、截距及相关系数，以验证本文于 4.1.3 提出的猜想。




图 4-5 全年有效波高与风速的一次线性回归分析

得出曲线方程为及相关系数：

$$y = 3.004x + 0.2236,$$

$$r = 0.5182$$

线性相关性较好，因此可认为，喀麦隆外海有效波高与海面风速有相关关系，拟合良好。

4.2.2 分季波高与海面风速的相关性分析

运用 Python 的 sklearn 工具包对各季节有效波高和海面风速进行一次线性回归分析，并求拟合曲线的斜率、截距及相关系数。得出冬季一次线性回归方程为 $y=1.5213x+1.5948$ ，相关系数为 0.2063，线性相关性不明显，可认为冬季有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出春季一次线性回归方程为 $y=1.2603x+1.8854$ ，相关系数为 0.2102，线性相关性不明显，可认为冬季有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出夏季一次线性回归方程为 $y=2.1131x+2.1986$ ，相关系数为 0.3710，线性相关性不明显，可认为冬季有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出秋季一次线性回归方程为 $y=2.6645x+0.5800$ ，相关系数为 0.4252，略有线性相关性。可认为冬季有效波高与海面风速没有明显相关关系。

结合 4.2.1 的结论，我们可以得知，喀麦隆外海全年风速与有效波高有较强相关关系；但分季情况下，海面风速与有效波高没有明显相关性。结合图 4-10，此结论与 4.1.2~4.1.3 的猜想与 4.2.1 的结论符合。




图 4-6 冬季有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-7 春季有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-8 夏季有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-9 秋季有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-10 逐月有效波高与风速时间过程对比

4.3 强浪相关性分析

4.3.1 强浪风速与有效波高的相关性分析

按照 3.5 的划分标准划分强浪和常浪，并按 4.2 的方法进行分季及不分季的有效波高与风速的一次线性回归分析。得出全年一次线性回归方程为 $y=1.4473x+2.9443$ ，相关系数为 0.1472，线性相关性不明显，可认为全年有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出冬季一次线性回归方程为 $y=1.6820x+1.2627$ ，相关系数为 0.1278，线性相关性不明显，可认为冬季有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出春季一次线性回归方程为 $y=0.1574x+3.6520$ ，相关系数为 0.0141，线性相关性不明显，可认为春季有效波高与海面风速没有明显相关关系；得出夏季一次线性回归方程为 $y=1.3475x+3.4806$ ，相关系数为 0.1372，线性相关性不明显，可认为夏季有效波高与海

面风速没有明显相关关系；得出秋季一次线性回归方程为 $y=1.6820x+1.2627$ ，相关系数为 0.1288，可认为秋季有效波高与海面风速没有明显相关关系。

综上所述，全年及各季强浪有效波高与海面风速没有线性相关关系，强浪有效波高可能由其他因素所影响。




图 4-11 全年强浪有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-12 冬季强浪有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-13 春季强浪有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-14 夏季强浪有效波高与风速的一次线性回归分析




图 4-15 秋季强浪有效波高与风速的一次线性回归分析

4.3.2 强浪风速与平均周期的相关性分析

对强浪数据进行分季及不分季的平均周期与风速的一次线性回归分析。得出全年一次线性回归方程为 $y=-0.8359x+14.1940$ ，相关系数为-0.7256，负线性相关性非常明显，可认为全年有效波高与海面风速有明显负相关关系；得出冬季一次线性回归方程为 $y=-0.5602x+9.3495$ ，相关系数为-0.4771，线性相关性较弱，但仍可认为冬季有效波高与海面风速有一定负相关关系；得出春季一次线性回归方程为 $y=-0.7829x+12.6994$ ，相关系数为-0.6394，线性负相关性明显，可认为春季有效波高与海面风速有显著相关关系；得出夏季一次线性回归方程为 $y=-0.7878x+14.4890$ ，相关系数为-0.6951，线性相关性较明显，可认为夏季有效波高与海面风速有明显负相关关系；得出秋季一次线性回归方程为 $y=-0.8115x+13.5774$ ，相关系数为-0.6818，线性负相关性较明显，可认为

秋季有效波高与海面风速有明显负相关关系。

因此可得结论，除夏季外，喀麦隆外海波浪平均周期与海面风速有明显负相关关系。




图 4-16 全年强浪平均周期与风速的一次线性回归分析




图 4-17 冬季强浪平均周期与风速的一次线性回归分析




图 4-18 春季强浪平均周期与风速的一次线性回归分析




图 4-19 夏季强浪平均周期与风速的一次线性回归分析




图 4-20 秋季强浪平均周期与风速的一次线性回归分析

4.3.3 强浪平均周期与有效波高的相关性分析

对强浪数据进行分季及不分季的有效波高与平均周期的一次线性回归分析。得出全年一次线性回归方程为 $y=2.5975x+5.6751$ ，相关系数为 0.3008，线性相关性不明显，可认为全年平均周期与有效波高没有明显相关关系；得出冬季一次线性回归方程为 $y=4.5763x+4.2559$ ，相关系数为 0.4114，线性相关性不明显，可认为冬季周期与有效波高没有明显相关关系；得出春季一次线性回归方程为 $y=3.4670x+5.4625$ ，相关系数为 0.3795，线性相关性不明显，可认为春季周期与有效波高没有明显相关关系；得出夏季一次线性回归方程为 $y=2.997x+4.5473$ ，相关系数为 0.3457，线性相关性不明显，可认为夏季周期与有效波高没有明显相关关系；得出秋季一次线性回归方程为 $y=3.0195x+5.1162$ ，相关系数为 0.3876，可认为秋季周期与有效波高没有明显相关关系。




图 4-20 全年强浪有效波高与平均周期的一次线性回归分析




图 4-21 冬季强浪有效波高与平均周期的一次线性回归分析




图 4-22 春季强浪有效波高与平均周期的一次线性回归分析




图 4-23 夏季强浪有效波高与平均周期的一次线性回归分析




图 4-24 秋季强浪有效波高与平均周期的一次线性回归分析

4.4 本章小结

由本章分析可得以下结论：有效波高、海面风速呈单峰分布，平均周期、主波向呈双峰分布，但主波向只在小幅度内波动，总体仍位于 SSW 方向。

对于强浪而言，海面风速与平均周期有极强负相关性关系；全年海面风速与有效波高有一定线性相关关系，但不明显，分季情况下，海面风速与有效波高没有明显相关关系；可视平均周期与有效波高没有相关关系。

第五章 大浪特征变化及趋势分析

5.1 大浪特征变化（长期）

本文定义大浪波高为年分布中分位数为 0.995、0.99、0.98（0.5%、1%、2%）处的有效波高。对全年及分季进行有效波高排序，并使用 Python 的 Numpy.quantile() 提取分位数，得到表 5-1~5-5。使用 sklearn.linearregression 工具包计算一次线性回归直线参数，并使用 matplotlib 工具包进行绘制大浪波高逐年变化折线图及回归直线，得图 5-1~5-5。

由表 5-1~5-5 及图 5-1~5-5 我们可得，全年各等级大浪波高相关关系式为 $y=0.0050x-7.7603$ (Quantile=0.995)， $y=0.0033x-4.4634$ (Quantile=0.99)， $y=0.0017x-1.4142$ (Quantile=0.98)，逐年呈上升趋势；冬季各等级大浪波高相关关系式为 $y=-0.0022x+5.8630$ (Quantile=0.995)， $y=-0.0011x+3.5837$ (Quantile=0.99)， $y=-0.0001x+1.4297$ (Quantile=0.98)，逐年呈下降趋势；春季各等级大浪波高相关关系式为 $y=0.0019x-1.8438$ (Quantile=0.995)， $y=0.0014x-0.9294$ (Quantile=0.99)， $y=-0.0002x-2.0882$ (Quantile=0.98)，0.5% 及 1% 大浪波高逐年呈上升趋势，2% 大浪波高逐年呈下降趋势；夏季各等级大浪波高相关关系式为 $y=0.0024x-2.6583$ (Quantile=0.995)， $y=0.0034x-4.5517$ (Quantile=0.99)， $y=0.0029x-3.7811$ (Quantile=0.98)，逐年呈上升趋势；秋季各等级大浪波高相关关系式为 $y=0.0052x-8.4812$ (Quantile=0.995)， $y=0.0047x-7.3986$ (Quantile=0.99)， $y=0.0027x-3.7383$ (Quantile=0.98)，逐年呈上升趋势。

由此可见，除冬季及春季的 2% 大浪波高逐年呈下降趋势外，全年、其他季节及其他等级大浪波高逐年均呈上升趋势。

表 5-1 大浪波高全年分布

年份	0.005	0.01	0.02
1979	1.9987	1.9304	1.8476
1980	2.2771	2.1609	2.0234
1981	2.1876	2.0625	1.9733
1982	2.0339	1.9914	1.9448
1983	2.0854	2.0404	1.9416
1984	2.1166	1.9846	1.8542
1985	2.1087	2.0294	1.8881
1986	2.0812	2.0239	1.8930

第四章 波浪特征时间（逐月）变化规律分析

1987	1.8448	1.8034	1.7429
1988	2.0184	1.8142	1.7575
1989	2.0075	1.9408	1.8743
1990	2.2343	2.1494	2.0115
1991	1.9727	1.9315	1.8566
1992	2.2303	2.1131	2.0308
1993	2.0418	1.8839	1.8268
1994	2.0867	1.9987	1.9228
1995	2.2011	2.1084	2.0299
1996	2.1229	2.0302	1.9408
1997	2.0659	2.0267	1.9417
1998	2.0936	2.0164	1.8583
1999	2.1585	2.0359	1.9138
2000	2.0489	2.0043	1.9281
2001	2.1925	2.1014	1.9912
2002	2.1614	2.0851	1.9622
2003	2.2561	2.1406	1.8360
2004	1.8867	1.8407	1.7405
2005	2.1118	2.0381	1.9075
2006	2.2549	2.1327	1.9455
2007	2.3023	2.2379	2.0825
2008	2.0980	1.9861	1.8921
2009	2.1182	2.0534	1.9844
2010	2.0155	1.9338	1.8366
2011	2.4681	2.2141	1.9858
2012	2.2890	2.1375	2.0337
2013	2.2888	2.1217	2.0128
2014	2.4008	2.1703	1.9770
2015	2.1194	1.9921	1.9024




图 5-1 全年大浪波高逐年变化及其线性回归趋势线

相关回归直线方程：

$$y=0.0050x-7.7603 \text{ (Quantile=0.995)}$$

$$y=0.0033x-4.4634 \text{ (Quantile=0.99)}$$

$$y=0.0017x-1.4142 \text{ (Quantile=0.98)}$$

表 5-2 大浪波高冬季分布

年份	0.005	0.01	0.02
1979	1.7427	1.4976	1.3998
1980	1.3842	1.3665	1.3182
1981	1.4085	1.3738	1.2826
1982	1.5089	1.4700	1.4357
1983	1.5006	1.4563	1.3919
1984	1.3825	1.3604	1.3234
1985	1.4750	1.4512	1.3978
1986	1.4998	1.4457	1.4258
1987	1.6363	1.6003	1.5222
1988	1.5077	1.4924	1.3954
1989	1.4811	1.3814	1.3117
1990	1.5902	1.5547	1.4728
1991	1.5362	1.4872	1.3869
1992	1.5312	1.5244	1.5100
1993	1.6365	1.6322	1.6088
1994	1.4959	1.4585	1.3197
1995	1.5174	1.4899	1.3899
1996	1.6447	1.6118	1.5173

第四章 波浪特征时间（逐月）变化规律分析

1997	1.4471	1.4163	1.3476
1998	1.3532	1.3198	1.2976
1999	1.4646	1.4253	1.3430
2000	1.3922	1.3455	1.3134
2001	1.6786	1.6310	1.3308
2002	1.5165	1.4614	1.3993
2003	1.8479	1.7625	1.6411
2004	1.4961	1.4557	1.3955
2005	1.3311	1.3181	1.2758
2006	1.4775	1.4584	1.3811
2007	1.4808	1.4603	1.4402
2008	1.4506	1.4378	1.4252
2009	1.3192	1.2851	1.2548
2010	1.6632	1.6215	1.5913
2011	1.3042	1.2917	1.2676
2012	1.3772	1.3577	1.3270
2013	1.5298	1.5036	1.4908
2014	1.3696	1.3284	1.3123
2015	1.4650	1.4470	1.4310




图 5-2 冬季大浪波高逐年变化及其线性回归趋势线

相关回归直线方程：

$$y=-0.0022x+5.8630 \text{ (Quantile=0.995)}$$

$$y=-0.0011x+3.5837 \text{ (Quantile=0.99)}$$

$$y=-0.0001x+1.4297 \text{ (Quantile=0.98)}$$

表 5-3 大浪波高春季分布

年份	0.005	0.01	0.02
1979	1.7875	1.7853	1.7292
1980	2.3085	2.2224	2.0375
1981	1.7739	1.7236	1.7020
1982	1.8088	1.7830	1.7687
1983	1.8571	1.8145	1.6905
1984	1.7917	1.7510	1.6566
1985	1.7670	1.7336	1.6933
1986	2.1042	2.0536	1.9413
1987	1.6737	1.6402	1.5908
1988	1.6048	1.5953	1.5636
1989	1.5342	1.5313	1.4986
1990	1.9127	1.8696	1.7793
1991	1.7842	1.7699	1.7550
1992	1.7293	1.6778	1.5876
1993	1.8321	1.8173	1.7472
1994	1.8708	1.8450	1.8046
1995	1.8628	1.7809	1.6347
1996	1.6943	1.5978	1.4493
1997	2.2010	2.0937	1.9553
1998	2.1305	2.0668	1.9575
1999	1.7380	1.7213	1.6025
2000	1.5255	1.5116	1.4920
2001	1.8878	1.8469	1.7566
2002	1.8576	1.8140	1.7726
2003	1.7983	1.7516	1.6458
2004	1.7491	1.7266	1.7107
2005	2.0352	1.9756	1.8682
2006	1.5856	1.5613	1.5287
2007	1.7619	1.7323	1.7036
2008	1.9816	1.9293	1.8810
2009	2.0641	2.0337	1.9805
2010	1.8128	1.7833	1.7359
2011	2.0227	1.9906	1.8435
2012	1.6712	1.6547	1.6146
2013	1.9916	1.8932	1.7892
2014	2.4227	2.3073	1.7756
2015	1.5631	1.5200	1.4813




图 5-3 春季大浪波高逐年变化及其线性回归趋势线

相关回归直线方程：

$$y=0.0019x-1.8438 \text{ (Quantile=0.995)}$$

$$y=0.0014x-0.9294 \text{ (Quantile=0.99)}$$

$$y=-0.0002x-2.0882 \text{ (Quantile=0.98)}$$

表 5-4 大浪波高夏季分布

年份	0.005	0.01	0.02
1979	2.1054	2.0602	1.9987
1980	2.3141	2.2826	2.2011
1981	2.4375	2.3422	2.1869
1982	2.1212	2.0793	2.0328
1983	2.0848	2.0612	1.9896
1984	2.3684	2.3078	2.1158
1985	2.2879	2.1743	2.1079
1986	2.1910	2.0847	2.0310
1987	1.9415	1.8570	1.8237
1988	2.2098	2.1449	2.0183
1989	2.3584	2.1200	2.0065
1990	2.4569	2.3427	2.2328
1991	2.0110	2.0030	1.9727
1992	2.2945	2.2693	2.2299
1993	2.2459	2.2233	2.0416
1994	2.2061	2.1477	2.0443
1995	2.3433	2.2763	2.2010
1996	2.2750	2.1720	2.0792

1997	2.0508	2.0407	1.9980
1998	2.1514	2.0942	1.9915
1999	2.1658	2.0771	2.0272
2000	2.0950	2.0813	2.0396
2001	2.1175	2.0816	2.0529
2002	2.2423	2.2243	2.1613
2003	2.3487	2.2733	2.2560
2004	1.9193	1.8863	1.8520
2005	2.1505	2.1423	2.1113
2006	2.2046	2.1438	2.0358
2007	2.4439	2.3811	2.3019
2008	2.0540	1.9651	1.9187
2009	2.1828	2.1400	2.0845
2010	2.0578	2.0216	1.9466
2011	2.6378	2.6183	2.4637
2012	2.4883	2.3877	2.2885
2013	2.4426	2.3663	2.1076
2014	2.4330	2.4073	2.2415
2015	2.2053	2.1909	2.1185




图 5-4 夏季大浪波高逐年变化及其线性回归趋势线

相关回归直线方程：

$y=0.0024x-2.6583$ (Quantile=0.995)

$y=0.0034x-4.5517$ (Quantile=0.99)

$y=0.0029x-3.7811$ (Quantile=0.98)

表 5-5 大浪波高秋季分布

第四章 波浪特征时间（逐月）变化规律分析

年份	0.005	0.01	0.02
1979	1.8447	1.7982	1.7208
1980	2.1376	2.0747	2.0368
1981	2.0626	2.0004	1.9584
1982	1.9512	1.9325	1.8739
1983	2.1566	2.1281	2.0706
1984	1.7776	1.6564	1.6055
1985	1.8277	1.7915	1.6888
1986	1.8478	1.8297	1.7815
1987	1.8084	1.7729	1.7336
1988	1.7772	1.7699	1.7525
1989	1.6881	1.6605	1.6277
1990	1.9624	1.8839	1.6529
1991	1.7401	1.7225	1.6957
1992	1.7600	1.7259	1.6144
1993	1.6979	1.6751	1.6581
1994	2.0514	2.0068	1.8778
1995	2.0758	2.0009	1.8789
1996	2.1269	1.9908	1.8952
1997	2.0579	1.9664	1.7621
1998	2.0134	1.9790	1.8569
1999	2.2208	2.2062	2.0535
2000	2.0419	1.9703	1.7922
2001	2.2689	2.2393	2.1757
2002	1.7389	1.6963	1.6471
2003	1.5995	1.5845	1.5460
2004	1.9854	1.9028	1.7457
2005	1.8842	1.8557	1.7832
2006	2.6459	2.5580	2.2216
2007	2.2452	2.0985	2.0111
2008	2.6043	2.4227	2.0669
2009	2.0326	1.9964	1.9735
2010	2.0274	1.9639	1.8595
2011	1.7524	1.7144	1.6049
2012	1.8070	1.7852	1.7402
2013	2.3083	2.2292	2.1247
2014	1.8144	1.7763	1.7157
2015	1.9590	1.9380	1.8847




图 5-5 秋季大浪波高逐年变化及其线性回归趋势线

相关回归直线方程：

$$y=0.0052x-8.4812 \text{ (Quantile=0.995)}$$

$$y=0.0047x-7.3986 \text{ (Quantile=0.99)}$$

$$y=0.0027x-3.7383 \text{ (Quantile=0.98)}$$

5.2 重现期分析

本文采用极值 I 型概率分布函数（耿贝尔曲线）结合耿贝尔计算用表进行重现期统计分析计算大浪重现期。该方法要求求历年最大有效波高的均值和均方差：

$$\overline{H_{max}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H_{max_i}$$

$$\sigma_{H_{max}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N H_{max_i}^2 - \overline{H_s}}$$

因此得预测的重现期波高为：

$$H = \overline{H_{max}} + \lambda \times \sigma_{H_{max}}$$

其中 λ 值根据数据样本容量和所需求重现期根据耿贝尔计算用表取或线性插值得。

表 5-6 各年最大有效波高值及重现期波高计算表

年份	最大波高	年份	最大波高	年份	最大波高	年份	最大波高
1979	2.154	1990	2.508	2001	2.297	2012	2.808
1980	2.359	1991	2.021	2002	2.328	2013	2.472
1981	2.461	1992	2.331	2003	2.426	2014	2.572
1982	2.145	1993	2.285	2004	2.030	2015	2.283
1983	2.213	1994	2.275	2005	2.173	$\overline{H_{\max}}$	2.341
1984	2.428	1995	2.427	2006	2.680	$\sigma_{H_{\max}}$	0.191
1985	2.335	1996	2.326	2007	2.561	$\lambda_{35,0.95}$	2.153
1986	2.213	1997	2.230	2008	2.738	$\lambda_{35,0.96}$	2.356
1987	2.072	1998	2.221	2009	2.225	$\lambda_{35,0.98}$	2.979
1988	2.226	1999	2.269	2010	2.161	$\lambda_{35,0.99}$	3.598
1989	2.522	2000	2.178	2011	2.676		

表 5-7 各重现期大波波高

重现周期	大波波高
20	2.153
25	2.356
50	2.979
100	3.598

5.3 本章小结

大浪年波高除冬季及春季 0.02 级外，均呈逐年微弱增长的趋势。秋季各级大浪波高增长速率比全年各季大波波高增长速率快。

20 年一遇有效波高为 2.153m，25 年一遇有效波高为 2.356m，50 年一遇有效波高为 2.979m，100 年一遇有效波高为 3.598m。

结论

1. 论文工作总结
2. 工作展望

参考文献

- [1] LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proc. IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

期刊文献

[序号] 作者. 文献题名[J]. 刊名,出版年份,卷号(期号): 起-止页码.

- [2] 刘国钧, 陈绍业, 王凤翥.图书馆目录[M].北京:高等教育出版社, 1957.15-18.

学术著作

[序号] 作者. 书名[M].出版地:出版社, 出版年: 起-止页码 .

- [3] Ngiam J, Chen Z, Chia D, et al. Tiled convolutional neural networks[C], Advances in Neural Information Processing Systems. 2010: 1279-1287.

有 ISBN 号的论文集

[序号] 作者. 题名[A].主编. 论文集名[C]. 出版地: 出版社,出版年: 起-止页码.

- [4] 田露. 基于多特征数据融合的离线中文笔迹鉴别研究[D]. 河南大学, 2011.
- [5] 张慧档. 笔迹鉴别方法研究[D]. 郑州大学, 2002.
- [6] 梁亮. 图像处理技术在笔迹鉴定系统开发过程中的应用与研究[D]. 沈阳工业大学, 2007.
- [7] 陈先昌. 基于卷积神经网络的深度学习算法与应用研究[D]. 浙江工商大学, 2014.
- [8] 王强. 基于 CNN 的字符识别方法研究[D]. 天津师范大学, 2014.

学位论文

[序号] 作者. 题名[D]. 保存地: 保存单位,年份.

- [9] 姜锡洲.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056073, 1989-07-26.

专利文献

[序号] 专利所有者. 专利题名[P]. 专利国别: 专利号,发布日期.

- [10]GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则[S].

技术标准

[序号] 标准代号,标准名称[S].出版地: 出版者,出版年

- [11]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报, 1998-12-25(10).

报纸文章

[序号] 作者. 题名[N]. 报纸名,出版日期(版次)

- [12]冯西桥.核反应堆压力管道和压力容器的 LBB 分析[R].北京:清华大学核能技术设计研究院, 1997.

报告

[序号] 作者. 文献题名[R]. 报告地: 报告会主办单位,年份

- [13]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展
[EB/OL].<http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html>'1998-08-16/1998-10-04.

电子文献

[序号] 作者. 电子文献题名[文献类型/载体类型]. 文献网址或出处,发表或更新日期/
引用日期(任选)

- [14]Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[C], Advances in neural information processing systems. 2012: 1097-1105.
- [15]Zeiler M D, Fergus R. Visualizing and understanding convolutional networks[M], Computer Vision–ECCV 2014. Springer International Publishing, 2014: 818-833.
- [16]Zeiler M D, Krishnan D, Taylor G W, et al. Deconvolutional networks[C],Proc. CVPR, 2010: 2528-2535.

致谢

从选题到定稿到答辩，我尤为感谢朱良生教授对我的指导。大三时曾有志海洋科学学术研究，曾与朱教授约谈，朱教授为我的志向点出了具体的道路。后因个人和家庭原因，选择了其他的毕业去向。后又因机缘巧合，又选择朱教授指导下的毕业论文题目。正是朱教授的热情和悉心指导和答疑，我才能合理安排好个人安排的实习和毕业论文，顺利完成毕业论文的相关工作。

同时要感谢大学四年来我所有的任课老师，感谢你们四年来对教学工作的严谨、认真和负责的态度，让我在华园的四年丰富多彩，学有所成。恩师所教授我的知识，远超课堂和课本本身，而是将我引领到一个更大的世界，打开了通往更广阔宇宙的大门。

感谢我的父母和家人在我生命中尤其是大学四年期间对我无条件的支持，对我许多想法的配合。

感谢在毕业之际帮助过我的所有朋友，尤其是黄钰琪先生、刘睿先生、林康睿先生、黄冠霖先生和万心玥小姐。感谢诸位在我毕业论文写作、实习和留学申请的工作让我精神状况极差的时候给我许多的帮助，使我能以较佳的精神状态进行论文写作。

感谢实习单位给予我在毕业论文写作期间的工作安排与便利，也感谢两次实习经历与我共事的领导和同事，在这近一年的广告公关从业生涯中，我学到的东西实在太多。

大学四年如白驹过隙，如今站于门槛，踮起双脚展望未来，回头看看发现有太多人需要表达谢意。要感谢的人实在有太多太多，篇幅所限未能逐一名列，在此谭某表达深深歉意，感恩千句藏于心间。