

משפט הוורדניים

תות שדה - נביל גנאים



תות שדה

הזן	מועד שתילה	תחילת ניבה	צבע	מוצקות (*)	טעם (**)	צורה	רגישות לקמחון (***)	רגישות לאנתרקנוז (***)	הערות
תמר (328)	25/9-18	20/11-15	אדום	2.5-2	4	קונית עד קונית שטוחה	4	2-1	החליף את הדורית. רגיש לעוותים בעונה הקרה
יעל (329)	28/9-22	5/12-25/11	אדום חזק	4	2	קונית	3-2	4-3	מניב יכול גבוה, האפיל בין הבכירים
מלאך (156)	28/9-22	1/12-25/11	אדום עמוק	4	5-4	קונוס גלילי ארוך	3-2	5-4	הזן הטעים ביותר. רגיש למחלות. נטייה לכתפיים לבנות.
בלהה (9)	20/9-15	20/11-15	אדום עמוק	4-3	4-3	קונוס קצר עד כדורי	3-2	1	רגיש לעוותים בגל השני.
הדס (543)	25/9-20	25/11-20	אורנגי אדום	4-3	3-2	קונוס ארוך שטוח	3-2	5-4	נוף חלש יחסית, רגיש לאנתרקנוז.
אוסוגרנדה	5/10-1	10/1-1	אדום עמוק	4.5-4	3	קונוס מוארך	3-2	5-3	מוצק וטעים. הבכיר בין האפילים.
קמרוסה	10/10-5	10/1-1	אדום עמוק	5-4	3-2	קונוס מוארך עד שטוח	3-2	3-2	זן ביניים. נטייה לכתפיים ירוקות.
יובל	25/9-15	20/11-10	אדום	3-2	4	קונית מוארכת	4	2-1	בכיר, אינו רגיש לעוותים, בלעדי לאגרקסוקו.
חרות	25/9-15	20/11-10	אדום עמוק	2	4-3	קונית מוארכת	3-2	0	סביל לאנתרקנוז, קצה ירוק בגל שני

* מוצקות: מוצק מאוד - 5, רך לגמרי - 1 (סולם של 5 דרגות)

** טעם לפי סולם של 5 דרגות, 1 - תפל, 5 - טעם מעולה

*** רגישות למחלות: 1 - רגישות נמוכה ביותר, 5 - רגישות גבוהה מאד
הערה: אין לראות ברשימת הזנים הנ"ל המלצה ספציפית לגידול.

תות-שדה - חלקות לפרי

קדם-שתילה

מניעת הצצה של דגניים ורחבי-עלים, למעט סוככים, מורכבים וקטניות גדולות-זרע

מועד הטיפול	התכשירים	מינון לדונם או ריכוז בקרקעות השונות	הערות
לפני השתילה, על קרקע נקייה מעשבים	רונסטאר ת"מ	400 סמ"ק	הפעלת התכשיר תיעשה באמצעות המטרה בשיעור 20 מ"ק/ד' לפחות, לפני השתילה.
			בעת השתילה יש להימנע ככל האפשר מהזזת עפר מטופל. אין לחפות את הערוגות המטופלות אלא כעבור חודש לפחות ממועד הטיפול. רצוי להימנע מעידורים להחלקת פני הערוגה לפני החיפוי. אם לא ניתן לוותר עליהם, יש לעשותם בעומק שלא יעלה על 3-2 ס"מ.

