

חשמה הדגניים

תירס מתוק



תִּירָס מֵתוֹק

הזן	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
כל הזנים	צהוב	אביב-סתיו	110-90	7-5	15 ס"מ	80-60	1 ק"ג	שוק	2 שורות בערוגה

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
א. בשלב התכנון ובחירת שדה המזרע: וירוס הגימדון המחוּספּס M.R.D.V. מועבר ע"י ציקדות. תוקף בעיקר במזרעים המוקדמים ועד מזרעי ראשית מאי	לפי שעה, אין אמצעי כימי בדוק למניעת ההדבקה; באזורים נגועים מומלץ להימנע מזריעה לפני אמצע מאי.			סבורים שהווירוס חורף בדגני-חורף ובדגניים רב-שנתיים. מועבר על-ידי ציקדות, הנוטשות בראשית האביב את דגני החורף המתייבשים ופולשות אל שדות התירס הירוקים. צמח הנתקף בגיל צעיר יישאר ננסי ולרוב לא יגיע לפריחה. הווירוס מצוי בעולם במינים רבים של דגניים. בארץ נמצא בדורת ארס-צובא, וכנראה היא משמשת מאגר של מחולל המחלה בין העונות. בארץ הוגדרו שני גזעים של הווירוס, הנבדלים בדרגת אלימותם. פגיעת הווירוס מתבטאת בנינוס הצמחים, בהופעת סימני מוזאיקה בעלים, בהפריה לקויה ובהקטנת האשכול. הדבקה מוקדמת בשלב של עד 3 עלים עלולה לגרום פחיתה, עד כדי 30% ביבול האשכולים.
וירוס גימדון המוזאיקה M.D.M.V. מועבר ע"י כנימות עלה שונות, הנושאות אותו באופן חולף.	אין אפשרות למנוע את הפצת הווירוס ע"י הדברה כימית של כנימות עלה. חיפוי הקרקע בפלסטיק שקוף דוחה את כנימות העלה כל עוד הפלסטיק גלוי ואינו מוסתר בנוף הצמחים, ובכך מגן על הצמחים מפני הדבקה בוירוס בשלבי הגידול הראשונים. זריעה מוקדמת באביב, ללא חיפוי קרקע כנ"ל - מסוכנת!			
חילדון עלול לתקוף בכל עונות הגידול	מחזור זרעים; הימנעות משכנות מדביקה. תכנון סדר הזריעה. חלקות צעירות ימוקמו מערבית לחלקות מבוגרות יותר.			המחלה משתמרת בקרקע בשאריות של צמחים נגועים.
	הדברה כימית: פוליקור ת"מ אנויל 5 ת"ר	75 סמ"ק 100-150 סמ"ק	21 14	מטפלים רק במקרה של נגיעות מוקדמות.
מחלת הכתם העדשתי (הלמינתוספוריום טורסיקום) מופיעה מראשית הקיץ, אך פגיעתה גוברת בעיקר בסתיו, בייחוד באזורים של אקלים לח	מחזור זרעים תקין, ועל כל פנים הימנעות מזריעה בשדה שנפגע בשנה שקדמה. כמו כן יש להימנע מזריעה ליד מזרעים קודמים. יש לתכנן את הזריעות, כך שהמזרע הצעיר ימוקם מערבה או דרומה (נגד כיוון הרוח) למזרעים הקודמים.			
	הדברה כימית: פאנץ' ת"מ	10 סמ"ק	14	