

משפח הקטניות

שעועית

פול

אפונה

במיה



שעועיות

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	ייעוד / יצוא / שוק	הערות
בריטל-וקס	מוארך	צהוב	אביב-סתיו	80-70	שוק	
טנדר-גרין	מוארך	ירוק	אביב-קיץ	80-70	שימורים	
מנגולד	מוארך	צהוב	אביב-קיץ	80-70	שוק	
בולגרית	מוארך	ירוק	אביב-קיץ	80-70	שוק	
אקזוטיב	מוארך	ירוק	אביב-קיץ	80-70	שימורים	
קסקייד	מוארך	ירוק	אביב-קיץ	80-70	תעשייה	
באוניטפול	מוארך	ירוק	אביב	80-70	תעשייה	

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים
כל הזנים	7	8-4 ס"מ	25 ס"מ	15-12 ק"ג 35,000-30,000

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
א. בעת הזריעה חולי-נופל	ריסוס בתוך חריץ הזריעה: טרכלור 75 א"ר	165 גרם לכל 1,000 מטר שורה	בעת הזריעה	
רימת הזרע פוגעת במזרעי חורף-אביב - עד אמצע מאי	פעולות אגרוטכניות: ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים" מניעה כימית: ריסוס בתוך חריץ הזריעה תכי דיאזינן 25 (בזודין, דיזיקטול)	150 סמ"ק	בעת הזריעה	המינון ל-1,000 מ' שורה.
ב. במהלך הגידול אגרוטיס, ערצבים	ראה "פגעים התוקפים גידולים רבים".		בראשית הגידול	
אקרית אדומה מצויה ואקרית צהובה	ריסוס: אקרין 18.5 ת"מ אומייט 30 א"ר אומייט 57 ת"מ מטאור 5 ת"ר	200 סמ"ק 150 גרם 100 סמ"ק 100 סמ"ק	3 3 3 7	טיפול יחיד בעונה.
מנהרן החממות מנהרן העורקים פוגע בעיקר בשעועית בבתי-צמיחה.	ריסוס: טריגרד א"ר אויסקט א"מ תכי מתמידופוס ת"י (פרודקס-תמרן, מתמידול, פרוטר)	25 גרם 70 גרם 250-150 סמ"ק	3 14 3	מטפלים מהופעת המחילות הראשונות בעלים התחתונים וחוזרים על הטיפול מדי 7 ימים. רק למנהרן החממות. מרססים בנפח תרסיס 50-100 ליטר/ד', כנדרש לכיסוי מלא של נוף הצמחים.
זחלי הליותיס	ריסוס: תכי אנדוסולפן ת"מ	300 סמ"ק	7	

פול

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול / מועד שתילה / זריעה	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף (בימים)	משך הקטיף (בימים)	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם	ייעוד / יצוא / שוק	זרעים לדונם	הערות
קפריסאי בית דגן מצרי	מוארך	בהיר	ספטי-אוקי	120-110	10-7	10 ס"מ	80 ס"מ	12,000	שוק	8-6 ק"ג	2 שורות בערוגה

משך הגידול, משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הגידול / מזריעה / שתילה / לאסיף בימים	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם
כל הזנים	200-150	30 יום	25-20 ס"מ	80-60 ס"מ בצמד	5,000

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
כנימות עלה כנימת הפול כנימת הקטניות מוצצות מוהל הצמחים	ריסוס: דימקרון 50 ת"נ תכי דימתואט 40 ת"מ (רוגור 40, רוגוטוקס, דימתואייט)	60 סמ"ק 100 סמ"ק	14 10	
זחלי פרודניה ופלוסיה	ריסוס: אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	
מנהרנים	אין עדיין תכשירים מומלצים			הפול סובל מאוד ממנהרנים בראשית תקופת גידולו.
חילדון בעיקר באביב	ריסוס: פולירם DF ג"ר מנבגן 80 א"ר	250 גרם 250 גרם	10 14	
כתמי שוקולד (בוטריטיס) בחורף ובאביב	ריסוס: מנבגן 80 א"ר פולירם DF ג"ר	250 גרם 250 גרם	14 10	

פול: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה. עד 50 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
ציפורים	פחיתת עומד	נזק איכותי ו/או כמותי
סערה, ברד	פגיעה בנוף ובתרמילים	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע
קרה	פגיעה בכל איברי הצמח	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.



אפונה

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	הערות
מלא - קלדרון	מוארך	ירוק	אביב	90-80	5 גרגרים
לקסטון - פרוגרס	מוארך	ירוק	אביב	90-80	7 גרגרים
לינקולן	מוארך	ירוק	אביב	90-80	9 גרגרים

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים	ייעוד/יצוא/שוק
כל הזנים	7-5	10 ס"מ	50 ס"מ	8-6 ק"ג	שוק

מחלות, מזיקים והדברתם

הפגע והנזק	שיטות ותכשירי הדברה	כמות התכשיר לדונם	ימים עד לאסיף	הערות
כנימות עלה מציצת מוהל הצמחים	ריסוס: דימקרון 50 ת"נ מלתיון 50 ת"מ מלתיון 25% א"ר מטסיסטוקס R ת"מ תכי דימתואט 40 ת"מ (רוגוטוקס, רוגור, דימתואיט)	60 סמ"ק 200 סמ"ק 300 גרם 100 סמ"ק 100 סמ"ק	14 2 2 21 10	ההדברה כדאית רק במקרה של התקפה קשה.
ציקדות	איבוק: בזודין 4	3 ק"ג		
פרודניה פלוסיה	ריסוס: אטברון ת"מ	100-75 סמ"ק	15	
קימחון	איבוק: גפרית 70 גפרית 90 (לא לשימוש במפוח-גב מוטורי ובכלי-טיס) גפרטיב	4 ק"ג 3 ק"ג 750 גר' ב-100 ליטר מים	0 0 0	המחלה מופיעה בד"כ לקראת סוף הגידול - לאחר התחלת התרמול. מטפלים מהתגלות המחלה בשדה ועד שבוע לפני האיסוף. תכיפות הטיפולים: מדי 10 ימים

אפונה בשלחין ובבעל

טיפול קדם-הצצה (ראה גם "טיפול הדברה, המתאימים לשימוש במרבית גידולי הירקות")
מניעת הצצה של רחבי-עלים ודגניים ח"ש

מועד הטיפול	התכשיר/ים	מינון לדונם או ריכוז בקרקעות השונות	נפח תרסיס לדונם והערות
מיד לאחר הזריעה, לפני הצצת העשבים והגידול. פוגע גם בנבטי עשבים עד 5-3 ס"מ.	תכי טרבוטרין א"ר/ת"ר (איגורן, טרבוטרקס)	150 גרם/סמ"ק 200 גרם/סמ"ק	יש לדייק בכיול ובמינון ולמנוע חפיפות בין פסי הריסוס. נפח התרסיס: כ-30 לי/ד. אם לא ירד גשם תוך 5 ימים מהטיפול - יש להמטיר 30 מ"מ/ד.

אפונה: נזקי טבע עיקריים המכוסים בביטוחי קנט

גורם הנזק	מהות הנזק	הערות
ברד, סערה, קרה, חום כבד	פחיתת עומד	בנבטים צעירים. חום כבד מכוסה ב-30 ימים ראשונים בלבד. סערה - מהירות רוח לפחות 25 קשר. חום כבד - טמפרטורה מעל 39 מעלות צלסיוס. קרה - ירידת טמפרטורה בשטח הגידול לאפס מעלות צלסיוס ומטה. עד 50 יום מזריעה, יש להודיע בתוך 48 שעות מקרות הנזק.
ציפורים	פחיתת עומד	נזק איכותי ו/או כמותי
סערה, ברד	פגיעה בנוף ובתרמילים	תלוי בעוצמה ובמשך האירוע
קרה	פגיעה בכל איברי הצמח	שיטפון - מים שמקורם בשטחים הסמוכים לשטח הגידול, אשר גורמים לנזקי סחיפה, ובתנאי שהשטח הינו מנוקז.
שיטפון	סחיפת ערוגות וצמחים	

המסמך המחייב הוא חוזה הביטוח באותה שנה.

במיה

הזן	טיפוס / צורת הפרי	צבע	עונת גידול מועד שתילה / זריעה	משך הגידול מזריעה/שתילה לאסיף בימים	ייעוד/יצוא/שוק
כל הזנים	מוארך	ירוק	אביב	80-90	שוק

משך הקטיף, מרווחים וכמות צמחים לדונם

הזן	משך הקטיף בימים	מרווח בשורה	מרווח בין השורות	צמחים לדונם זרעים
מקומית	7-5	30 ס"מ	75 ס"מ	3-2 ק"ג 4,400 צמחים
בולגרית	7-5	80 ס"מ	120 ס"מ	3-2 ק"ג 4,400 צמחים