

Грядут лабораторные, грядёт ДЗ, ГОТОВЬ ЕБАЛО

©Береснева возможно

Вектор невязок R

$AX = B \rightarrow X$  - точное решение СЛАУ

$x^*$  - приближённое

$R = B - Ax^*$  - вектор невязок

$\|R\|$  - невязка решения

$\Delta x^* = \|X - x^*\|$   $\Delta x^* \neq \|R\|$

$\nu(A) = \|A\| * \|A^{-1}\|$

$\delta X \leq \nu(A) (\delta A + \delta B)$

$\nu(A)$  - число обусловленности - чем меньше, тем лучше, ~100 и меньше считается норм, ~1000 и выше - матрица будет плохо обусловлена

$$\begin{cases} x + 10y = 11 \\ 100x + 1001y = 1101 \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\|A\| = 1101 \quad \|A^{-1}\| = 1011$$

$$\nu(A) = 1101 * 1011 \approx 10^6$$

Теперь с матрицей с ошибкой:

$$\begin{cases} x + 10y = 11.01 \\ 100x + 1001y = 1101 \end{cases}$$

$$X^y = \begin{pmatrix} 11.01 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\delta X = \delta(A) \delta B$$

$$\delta B = \frac{0.01}{1101}$$

$$\delta X = 1101 * 1011 * \frac{0.01}{1101} = 10.11 \text{ - около } 1000\%. \text{ Дохуя короче}$$

$$R = B - AX^x = \begin{pmatrix} 11 \\ 1101 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 10 \\ 100 & 1001 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 11.01 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.01 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\|R\| = 0.01$  - и это при неправильной матрице, так что вектор невязки не является критерием правильности вычислений

### Метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Метод Гаусса из линала если вспомнишь - по сути метод Гаусса с выбором ведущего элемента

Выбирая ведущий элемент надо выбирать числа как можно больше, дабы была лучше относительная погрешность

**Идея:**

На текущем шаге исключается не следующая по номеру неизвестная, а неизвестная с коэффициентом, наибольшим по модулю

Определяется 3 метода выбора ведущего элемента:

- Выбор ведущего элемента по столбцу
- Выбор ведущего элемента по строке
- (Legendary pull) С выбором главного элемента по всей матрице. Самый лучший метод, можно всё, заниматься мы им не будем 😊  
У метода Хаусхолдера больше арифметических операций нежели у метода Гаусса

### Метод Хаусхолдера: решение СЛАУ

$P = E - 2\omega\omega^T$  - матрица Хаусхолдера (да, было уже - повторяем ёпта)

$AX = B$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

Шаг 1:

$$\bar{X}_3 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix} \quad \bar{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{V}_3 = \bar{X}_3 + \|\bar{X}_3\| \operatorname{sign} a_{11} \bar{e}_3$$

$$\omega_3 = \frac{\bar{V}_3}{\|\bar{V}_3\|}$$

Шаг 2 судя по всему?:

$$\begin{aligned} P_3 AX &= P_3 B \\ P_2 P_3 AX &= P_2 P_3 B \\ R\bar{X} &= \bar{B} \leftarrow \text{обратный ход метода Гаусса} \end{aligned}$$

### Метод Прогонки (хихи самогон)

Всё допизделись теперь у нас отчислительная математика 🐈

$$A = \begin{pmatrix} c_{11} & b_{12} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{21} & c_{12} & b_{13} & \dots & \dots & 0 \\ 0 & a_{32} & c_{33} & b_{34} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & a_{nn-1} & c_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

$$1. c_1 x_1 + b_1 x_2 = f_1$$

$$x_1 = a_1 x_2 + \beta_1$$

$$a_1 = -\frac{b_1}{c_1} \quad \beta_1 = \frac{f_1}{c_1}$$

$$2. a_2 (a_1 x_1 + \beta_1) + c_1 x_2 + b_2 x_3 = f_2$$

$$x_2 = a_2 x_3 + \beta_2$$

$$a_2 = -\frac{b_2}{a_2 a_1 + c_2} \quad \beta_2 = \frac{f_2 - a_2 \beta_1}{a_2 a_1 + a_2}$$

$$3. x_{k-1} = a_{k-1} x_k + \beta_{k-1}$$

$$a_k (a_{k-1} x_k + b_{k-1}) + c_k x_k + b_k x_{k+1} = f_k$$

$$x_k = a_k x + k + 1 + \beta_k$$

$$a_k = -\frac{b_k}{a_k a_{k-1} + c_k} \quad \beta_k = \frac{f_k - a_k \beta_{k-1} - 1}{a_k a_k - 1 + c_k}$$

На шаге  $n$ :

$$x_{n-1} = a_n - 1 x_n + \beta_n - 1$$

$$a_n x_{n-1} + c_n x_n = f_n$$

$$a_n (a_n - 1 x_n + \beta_n - 1) + c_n x_n = f_n$$

$$x_n = \frac{f_n - a_n \beta_n - 1}{a_n a_n - 1 + c_n}$$

Количество арифметических операций для метода Прогонки  $2 + 6(n - 2) + 5 = 6n - 5$

Для обратной прогонки  $2(n - 1)$

То есть для всей прогонки туда-обратно  $6n - 5 + 2(n - 1) = 8n - 7$

**Th** (условие того что метод прогонки сработает) Пусть коэффициенты системы удовлетворяют следующим условиям диагонального преобладания:

- $\forall i \quad |c_i| \geq |a_i| + |b_i|$
- $|c_i| > |a_i|$   
Тогда  $\forall \alpha_i, \beta_i \quad 1) \alpha_i \alpha_{i-1} + c_i \neq 0 \quad 2) |\alpha_i| \leq 1$

### Поиск обратной матрицы

"Алгебраические дополнения - это слишком большая ошибка"

©Береснева 2025

$AX = B$  (СЛАУ)

$AX = E$ , тогда X - обратная матрица

$$\bar{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \bar{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} AX_1 = \bar{e}_1 \\ AX_2 = \bar{e}_2 \\ \dots \\ AX_3 = \bar{e}_3 \end{cases}$$

$$A^{-1} = (X_1 X_2 \dots X_n)$$

Способ 2

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ a_{31} & \dots & a_{3n} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & b_{11} & \dots & b_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & b_{21} & \dots & b_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_{31} & \dots & b_{3n} \end{pmatrix}$$

^ Кусок матрицы справа, состоящий из  $b$  - транспонированная матрица