



NACIĄGNIĘCIE ŁYDKI

Naciągnięcie łydki dotyczy mięśni tylnej części podudzia i zwykle powstaje w wyniku nagłego, nadmiernego działania siły na mięśnie mięśni lub z powodu powtarzającego się nadmiernego przeciążenia.

Łydka to grupa mięśni, która pozwala skierować stopę i palce u stóp w dół, generując siły napędowe, które pomagają chodzić, biegać i skakać. Łącznie jest 7 mięśni, z których największe to mięsień brzuchaty łydki i mięsień płaszczkowaty. Te duże mięśnie generują największą siłę. Każdy z tych mięśni może ulec naciągnięciu.



Po urazie w łydce mogą pojawić się siniaki i/lub obrzęk. Jest to spowodowane urazem tkanek. Możesz również odczuwać ból, szczególnie podczas chodzenia lub wykonywania jakiejkolwiek czynności, która wykorzystuje dotknięte mięśnie. Możesz odczuwać sztywność w tych tkankach, szczególnie po okresach odpoczynku.


Stopień urazu będzie decydował o tym, jak długo potrwa rekonwalescencja. Może to trwać od 1 tygodnia do 6 tygodni lub dłużej, w zależności od tego, jak rygorystycznie podchodzisz do rutynowej opieki po urazie. Przy odpowiednim leczeniu uraz powinien wrócić do normy.



Mięśnie są dobrze ukrwione, co oznacza, że wszelkie uszkodzenia tych tkanek goją się szybko.


Pomóż swojemu ciału w regeneracji, unosząc nogę na krótkie okresy we wczesnej fazie. Pomoże to rozproszyć wszelkie obrzęki i siniaki.

Lód może być doskonałym dodatkowym środkiem w gojeniu siniaków i/lub obrzęków. Pamiętaj, aby owinąć lód wilgotną szmatką i obserwować skórę, aby uniknąć oparzeń lodem.



Po pierwszym urazie warto ograniczyć ilość chodzenia i wszelkie inne aktywności wykorzystujące te mięśnie, takie jak bieganie i skakanie. Zamiast tego wybierz aktywności bez obciążania, aby zachować formę i aktywność, takie jak jazda na rowerze i pływanie.

Aby pomóc w rekonwalescencji i nieprzyjemnych objawach, których doświadczasz, może być zalecane wykonywanie małych kólek i pompek kostkowych od czasu do czasu, aby uniknąć sztywności. Pomoże to również Twojemu ciału utrzymać krążenie krwi wokół Twoich tkanek.



Możesz zostać poddany ocenie, aby spróbować ustalić, dlaczego uraz w ogóle wystąpił. Być może jesteś słaby w innych miejscach i w konsekwencji nadmiernie eksploatujesz mięśnie łydek, lub może potrzebujesz lepszej struktury swojego reżimu aktywności. Do tego terapeuta użyje metody P-Dtr

Prawdopodobnie otrzymasz kilka ćwiczeń, które pomogą Ci w pełni wyzdrowieć po kontuzji. Mogą to być rozciągania, które pomogą Ci rozluźnić napięte obszary w nodze, oraz ćwiczenia siłowe, które pomogą Ci wrócić do normalnego poziomu sprawności.

Bez względu na przyczynę kontuzji, nie spiesz się z rehabilitacją. Dzięki cierpliwości i właściwemu przewodnictwu wrócisz do robienia tego, co kochasz najbardziej.

