


Rwa kulszowa



Czym jest rwa kulszowa?

Rwa kulszowa to termin często używany w odniesieniu do bólu pleców z objawami promieniującymi w dół nogi. Objawy mogą obejmować osłabienie, drętwienie, uczucie mrowienia, uczucie przypominające porażenie prądem i ból. Objawy mogą być różne, od sporadycznych i lekko drażniących do ciągłych i silnych. Nierzadko ból w nodze jest silniejszy niż ból w plecach.

Skąd bierze się ból?

Nerwy biegnące do nóg zaczynają się między kręgami lędźwiowymi, w pobliżu dysków międzykręgowych i biegną w dół przez mięśnie i tkanki łączne w nogach. Chociaż te nerwy są mocne, są podatne na podrażnienia spowodowane urazami lub problemami w dowolnej części ich przebiegu. Takie podrażnienia mogą prowadzić do objawów promieniujących w dół nogi.

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie wszystkie bóle nóg są związane z nerwami. Różne inne schorzenia mogą imitować rwę kulszową, w tym problemy ze stawami, mięśniami i powięzią – tkanką łączną otaczającą mięśnie – powodując promieniujący ból wzdłuż nogi podobny do objawów rwy kulszowej.

Dlaczego to mam i jakie są rokowania?

Ból nerwów nie dyskryminuje – może dotknąć każdego. Jednak siedzący tryb życia, palenie, nadwaga i brak ruchu lub snu dobrej jakości są czynnikami ryzyka wystąpienia **rwu kulszowej**. Rozważenie i wprowadzenie zmian w tych obszarach może być korzystne w dłuższej perspektywie. Dobrą wiadomością jest to, że u większości osób epizod **rwu kulszowej** zaczyna ustępować w ciągu czterech do sześciu tygodni. Nawrót bólu pleców jest również powszechny, więc jeśli się zdarzy, nie panikuj. W większości przypadków nasilenie objawów jest łagodniejsze niż początkowy epizod.

Co mogę zrobić, żeby sobie z tym poradzić?

Bądź aktywny i modyfikuj swoje działania w razie potrzeby

Odczuwanie promieniującego bólu lub drętwienia w nodze może być niepokojące, ale zazwyczaj nie jest szkodliwe. Często sama zmiana pozycji ciała (ze stojącej na siedzącą lub odwrotnie) może przynieść ulgę. Pozostawanie aktywnym, np. kontynuowanie pracy, jest wskazane i może przyspieszyć powrót do zdrowia. Jednak może być konieczne dostosowanie sposobu wykonywania niektórych zadań i częstsze wstawanie z pozycji siedzącej.

Łagodne ćwiczenia aerobowe

Delikatne aktywności, takie jak spacerowanie lub pływanie, są doskonałym punktem wyjścia. Na początku możesz potrzebować ograniczyć czas trwania swoich aktywności, ale możesz go stopniowo wydłużać z czasem.

Delikatne rozciąganie

Wykonywanie delikatnych rozciągań pleców może pomóc utrzymać elastyczność kręgosłupa, łagodząc stały nacisk na nerwy i dyski. Może to sprzyjać gojeniu i rekonwalescencji. Jeśli napięcie w pośladkach, ścięgnach podkolanowych lub mięśniach łydek wywołuje ból nerwowy, regularne, delikatne rozciąganie tych obszarów jest niezbędne.

Należy jednak pamiętać, że podrażniony nerw może być bardzo wrażliwy, dlatego należy rozciągać się bez powodowania bólu. Zacznij od dynamicznych lub krótkich rozciągań, aby uniknąć dalszego podrażnienia.

Delikatne ćwiczenia wzmacniające

Aby zapobiec osłabieniu kręgosłupa – zwłaszcza w okresach ograniczonej ruchomości – i zmniejszyć prawdopodobieństwo nawrotów w przyszłości, włącz do swojej rutyny ćwiczenia wzmacniające. Razem ze swoim specjalistą możesz zidentyfikować czynności, rozciągania i ćwiczenia wzmacniające, które są dla Ciebie najbardziej korzystne.

Wskazówka: Wykonuj ćwiczenia regularnie, ale delikatnie. Rozważ włączenie ich do codziennej rutyny, aby zachować spójność. Odczuwanie pewnego dyskomfortu podczas ćwiczeń jest normalne i nie powinno budzić obaw. Skup się na tym, co możesz zrobić i trzymaj się granic, które są dla Ciebie komfortowe. Pamiętaj, że postęp dokonuje się krok po kroku, a skupienie się na swoich możliwościach może prowadzić do stopniowej poprawy.

Leki, gdy są potrzebne

Są chwile, kiedy leki mogą być korzystne, zwłaszcza jeśli ból zakłóca sen lub codzienne czynności. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków.

Zmiany w stylu życia, gdy są potrzebne

Czynniki takie jak palenie, masa ciała, stres i jakość snu mogą na pierwszy rzut oka wydawać się niezwiązane z bólem pleców, ale mają znaczący wpływ na Twoje samopoczucie. Te aspekty mogą wpływać na Twój nastrój i ogólne spojrzenie na życie. Sen, a w szczególności jego brak, może mieć natychmiastowy wpływ na Twoje doświadczenie bólu. Wprowadzanie pozytywnych zmian w tych obszarach, takich jak rzucenie lub ograniczenie palenia i poprawa diety, może poprawić zdrowie tkanek i ogólne funkcjonowanie organizmu. Rozważ wprowadzenie tych lub innych zdrowych zmian w stylu życia, aby od razu zacząć odczuwać korzyści.

A co jeśli nie poczuje się lepiej?

Jeśli objawy nie ulegną poprawie po czterech do sześciu tygodniach, ważne jest, aby zasięgnąć porady u fizjo. Należy jednak pamiętać, że rwa kulszowa może czasami trwać nawet sześć miesięcy lub nawet rok.

Jeśli zaobserwujesz u siebie którykolwiek z poniższych objawów, koniecznie skontaktuj się z lekarzem bezzwłocznie:

- Niezdolność do oddawania moczu pomimo odczuwania potrzeby.
- Utrata kontroli nad jelitami.
- Drętwienie w okolicy narządów płciowych.
- Niezdolność do osiągnięcia erekcji.
- Coraz większe osłabienie obu nóg.

Bądź cierpliwy ze swoim umysłem i ciałem. Długoterminowe perspektywy są dobre.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów: