



SKRĘCENIE KOSTKI BOCZNEJ

Skręcenie kostki to częsty uraz

Skręcenie kostki zwykle występuje, gdy przypadkowo skrećisz lub obrócisz kostkę. Ten uraz jest dość powszechny, szczególnie w sportach takich jak piłka nożna czy koszykówka. Zazwyczaj przy odpowiednim leczeniu i ćwiczeniach uraz goi się w ciągu kilku tygodni.

Zrozumienie stawu skokowego i urazu skręcenia

Staw skokowy jest złożonym stawem, który może wykonywać ruchy takie jak zawiasowanie, obracanie i rotacja. Jego stabilność wynika ze struktury kości i więzadeł, które łączą kości. Siła mięśni i kontrola również odgrywają kluczową rolę w stabilności kończyny dolnej. Skręcenia często wynikają z nadmiernego rozciągnięcia więzadeł, a w ciężkich przypadkach zerwania. Są one powszechnie spowodowane zdarzeniami traumatycznymi, takimi jak nagła zmiana kierunku podczas uprawiania sportu lub ześlizgnięcie się z krawędzi krawężnika. Obrzęk i siniaki są typowe po skręceniu, a siniaki mogą rozprzestrzeniać się w dół stopy, co nie powinno powodować niepokoju.

Ostre leczenie skręceń stawu skokowego

Zmniejszenie obciążenia kostki jest ważne w ciągu pierwszych kilku dni lub nawet do tygodnia, w zależności od potrzeb. Możesz również potrzebować przerwy od aktywnego uprawiania sportu (**1-3 tygodnie**). Jednak nadmierny odpoczynek może utrudniać proces gojenia się organizmu, więc powinieneś przynajmniej zacząć delikatnie poruszać kostką dzień po urazie. Ponadto, jeśli nie jest to zbyt bolesne, możesz chodzić i obciążać stopę.

Najnowsze badania sugerują, że stosowanie lodu lub zimnych okładów nie jest zalecane. Jednakże, jeśli kostka jest bardzo bolesna i opuchnięta, zastosowanie zimna bezpośrednio po skręceniu na krótki okres (10-15 minut) może być korzystne pod względem leczenia bólu.

Podniesienie stopy powyżej wysokości biodra to skuteczna technika zmniejszania obrzęku. Podczas gdy długotrwałe leczenie jest zazwyczaj niepotrzebne, doustne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub środki przeciwbólowe mogą być pomocne w radzeniu sobie z objawami w pierwszym tygodniu. Należy pamiętać, że stosowanie podpórki nie powinno być rozwiązaniem długoterminowym, ponieważ może hamować naturalne mechanizmy stabilizacji organizmu przed regeneracją. Więcej informacji na temat leczenia ostrego można znaleźć w Ramce 1 na następnej stronie.

Samodzielne zarządzanie jest często kluczem

Ogólnie rzecz biorąc, łagodne skręcenie kostki można leczyć samodzielnie, ponieważ takie incydenty są powszechne. Jednak jeśli odczuwasz silny ból, rozległe siniaki i obrzęk oraz nie możesz obciążać stopy, koniecznie zasięgnij porady specjalisty opieki zdrowotnej, takiego jak fizjoterapeuta.

Rehabilitacja i ćwiczenia *Rehabilitacja, skupiająca się na sile, stabilności, równowadze, koordynacji i ruchomości, jest niezbędna do odzyskania pełnej funkcji stawu skokowego. Po pierwszych dniach rozciąganie i poruszanie stawem skokowym, zwłaszcza zginanie i prostowanie, jest niezbędne, aby uniknąć długotrwałej sztywności. Następnie stopniowe włączanie ćwiczeń siłowych i równowagi pomoże przywrócić stabilność stawu i zmniejszyć ryzyko przyszłych urazów. Twój lekarz może udzielić dalszych porad dotyczących ćwiczeń i rehabilitacji oraz zalecić konkretne ćwiczenia, aby zapewnić, że rehabilitacja będzie przebiegać w odpowiednim tempie. Rekonwalescencja może być czasami złożona, a pełna rekonwalescencja może trwać od 6 do 12 tygodni. Zazwyczaj większość bólu i trudności z chodzeniem powinna ustąpić w ciągu 1–2 tygodni.*

Niestabilność stawu skokowego po skręceniu – dlaczego to problem?

Skręcenie stawu skokowego jest jednym z najczęstszych urazów, które mogą prowadzić do trwałej niestabilności stawu. Po urazie często dochodzi do osłabienia mięśni stabilizujących kostkę oraz zaburzeń propriocepcji, czyli zdolności ciała do "czucia" położenia stawu w przestrzeni. Niestabilna kostka jest bardziej podatna na kolejne urazy, co może skutkować przewlekłym bólem, ograniczeniem ruchomości i problemami z codzienną aktywnością.

Jak metoda P-DTR pomaga w stabilizacji kostki?


P-DTR (Proprioceptive Deep Tendon Reflex) to innowacyjna metoda fizjoterapeutyczna, która pozwala na skuteczną korekcję dysfunkcji mięśniowych i nerwowych. Dzięki tej technice możliwe jest przywrócenie prawidłowej komunikacji między mięśniami a układem nerwowym, co ma kluczowe znaczenie w procesie stabilizacji kostki po urazie.

Kluczowe efekty korekty metodą P-DTR:

1. **Stabilizacja mięśni:** Korekta pozwala na aktywację odpowiednich grup mięśniowych, które stabilizują staw skokowy, zapobiegając jego nadmiernym ruchom.
2. **Poprawa propriocepcji:** Dzięki odbudowie czucia głębokiego staw staje się bardziej "świadomy" swojej pozycji, co zwiększa kontrolę ruchów i zmniejsza ryzyko ponownego urazu.
3. **Prewencja przyszłych skręceń:** Stabilna kostka oznacza mniejsze ryzyko ponownego skręcenia, co jest kluczowe dla osób aktywnych fizycznie i sportowców.

Przewaga metody P-DTR w terapii stawu skokowego:

- Szybka diagnoza i korekta dysfunkcji nerwowo-mięśniowych.
- Trwałe efekty dzięki poprawie wzorców ruchowych.
- Minimalizacja ryzyka przewlekłej niestabilności i bólu stawu skokowego.



Ramka 1. P.O.L.I.C.E. – Zasada postępowania w przypadku ostrych urazów

Zasada P.O.L.I.C.E. to zbiór wytycznych opracowanych specjalnie, aby pomóc Ci skutecznie leczyć kontuzję. Sprowadza się ona do słów Protection (Ochrona), Optimal Load (Optymalne Obciążenie), Ice (Lód), Compression (Ucisk) i Elevation (Uniesienie). Pomaga ona w szybszym wyzdrowieniu i powrocie do zdrowia dzięki połączeniu odpoczynku z odpowiednią ilością aktywności.

- **P. - dla ochrony**
- **O.L. - dla optymalnego obciążenia**
- **I. - dla lodu**
- **C. - dla kompresji**
- **E. - dla uniesienia**

Ochrona przed dalszymi urazami, np. unikanie agresywnego chodzenia lub ćwiczeń.

Optymalne obciążenie to termin ogólny dla obciążenia mechanicznego, które oprócz ruchu i ćwiczeń może obejmować techniki manualne, takie jak masaż lub mobilizacje stawów w celu przywrócenia ruchomości. Jednak aktywne ćwiczenia są kluczem do powrotu do zdrowia, a pasywne metody leczenia powinny być stosowane tylko jako dodatek, gdy jest to konieczne. Podpory, kule i ortezy mogą być używane do dostosowania obciążenia umieszczonego na uszkodzonej tkance. To, co jest optymalne, różni się w zależności od urazu, uszkodzonej tkanki i obszaru urazu itp. Jednak całkowity odpoczynek może być szkodliwy i hamować powrót do zdrowia. Optymalne obciążenie z drugiej strony sprzyja gojeniu się tkanek. Wczesna aktywność sprzyja wczesnemu powrotowi do zdrowia po urazie.

W razie potrzeby można włączyć lód do leczenia bólu i obrzęku limfatycznego (tj. opuchlizny), ale należy zachować ostrożność. Lód w połączeniu z lekami przeciwzapalnymi nie jest koniecznym składnikiem leczenia ostrych urazów tkanek miękkich i czasami może zaburzać normalne gojenie się tkanek.

Kompresja i uniesienie mogą być włączone w celu leczenia bólu i obrzęku limfatycznego. Ponadto zachowaj pozytywne nastawienie, ponieważ negatywne uczucia, takie jak myślenie i oczekiwanie najgorszego, zły nastrój i strach mogą stanowić barierę dla powrotu do zdrowia.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów:

