



WSTRZĄS MÓZGU – LĘK I NASTRÓJ

Uporczywe objawy po wstrząśnieniu mózgu są powszechne, przy czym jeden na pięć wstrząsów mózgu związanych ze sportem powoduje uporczywe objawy po wstrząśnieniu mózgu, które trwają znacznie dłużej niż 2-3 tygodnie, co jest typowym okresem rekonwalescencji. W przypadku uporczywych objawów po wstrząśnieniu mózgu częściej występują towarzyszące zaburzenia zdrowia psychicznego lub emocjonalne niż w przypadku krótszego czasu rekonwalescencji.

Typowe zaburzenia psychiczne i emocjonalne po wstrząśnieniu mózgu:

Rozmyślanie

Nadmierna
czujność

Lęk

Panika

Nastrój
depresyjny

Apatia

Zaburzenie
snu

Raportowanie
objawów w
inwentarzach
psychologicznych

Prawdopodobieństwo wystąpienia objawów depresji po wstrząśnieniu mózgu jest wyższe u młodych sportowców niż w populacji ogólnej.

Zarówno deficyty poznawcze, jak i brak równowagi to objawy, które regularnie występują zarówno w objawach po wstrząśnieniu mózgu, jak i zaburzeniach zdrowia psychicznego. Fakt, że objawy zaburzeń zdrowia psychicznego i wstrząśnienia mózgu nakładają się, jest przynajmniej częściowo spowodowany zmianami, które zachodzą w ośrodkach emocjonalnych mózgu po wstrząśnieniu mózgu. Na przykład zaawansowane obrazowanie mózgu ujawnia podobny wzorzec zmian mózgu zarówno w depresji klinicznej, jak i wstrząśnieniu mózgu.

Samorządność

Ćwiczenia Zaplanowane, ustrukturyzowane i powtarzalne ćwiczenia wykazały, że zmniejszają objawy lękowe. Badania wykazały, że dotyczy to zarówno osób z rozpoznaniem zaburzeniem lękowym, jak i osób bez niego. Fizjoterapeuta może wesprzeć Twój powrót do zdrowia za pomocą indywidualnie dostosowanego programu ćwiczeń. Może również pomóc w znalezieniu pozytywnych strategii radzenia sobie w celu zmniejszenia lęku. Mogą one obejmować, ale nie ograniczają się do technik relaksacyjnych i wizualizacyjnych, ćwiczeń głębokiego oddychania i uważności.

Interwencje medyczne W razie potrzeby lekarze mogą przepisać leki w celu leczenia lęku i zaburzeń nastroju związanych z wstrząśnieniem mózgu. W celu leczenia zaburzeń emocjonalnych może być potrzebna konsultacja z profesjonalnym terapeutą, takim jak psycholog lub doradca.

Poszukaj wsparcia: Wsparcie społeczne, takie jak wsparcie słuchania, wsparcie emocjonalne, wsparcie doceniania zadań i pomoc osobista, są ważnymi elementami powrotu do zdrowia. Wsparcie społeczne może pomóc Ci trzymać się reżimów rehabilitacyjnych, a także zmniejszyć strach przed ponownym urazem i uczucie izolacji.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów:

