



ZAMROŻONY BARK

Informacje i porady

Wprowadzenie

Zamrożony bark, znany również jako zapalenie torebki stawowej, to bolesna i często niezwykle wyniszczająca choroba, która może prowadzić do braku snu, trudności w utrzymaniu normalnego życia i obniżenia ogólnego samopoczucia psychicznego. U 2-5% populacji ogólnej w pewnym momencie życia wystąpi zamrożony bark, przy czym więcej przypadków występuje u osób pochodzenia afroamerykańskiego i latynoskiego. Zamrożony bark występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, najczęściej w wieku 40–65 lat.

Czym jest zamrożony bark?

Staw barkowy jest, z założenia, niezwykle ruchomy. Wokół stawu barkowego, podobnie jak w przypadku innych stawów ciała, znajduje się torebka stawowa. U osób bez zamrożonego barku torebka stawowa barku jest bardzo duża i wiotka, co zapewnia dużą elastyczność (Rysunek 1). U osób z zamrożonym barkiem stan zapalny i zaciśnięcie torebki stawowej powoduje ból i ostatecznie ogranicza zdolność barku do swobodnego poruszania się (Rysunek 2).

Zamrożony bark można podzielić na trzy stadia:

- etap „bolesny”
- etap „zamrażania”
- etap „odmrażania”

Objawy związane z zamrożonym barkiem różnią się w zależności od stadium choroby.



Rycina 1. Zdrowa torebka stawowa barku



Rycina 2. Torebka stawowa barku zamrożonego – stan zapalny i skurcz

Jakie są objawy zamrożonego barku?

W fazie 1 występuje aktywny stan zapalny wewnątrz stawu barkowego. W tej fazie ból jest najbardziej dominującą cechą, często występują wysokie poziomy bólu nocnego.

W stadium 2 ból zaczyna ustępować, ponieważ następuje „napięcie” lub „kurczenie” torebki stawowej barku. To naprężenie powoduje trudności w unoszeniu ramienia na bok, za plecy i obracaniu go na zewnątrz.

W trzecim etapie objawy stopniowo ustępują i następuje poprawa, a torebka stawowa zaczyna powracać do normy.

Jakie są przyczyny zamrożonego barku?

Dokładna przyczyna zamrożonego barku pozostaje nieznana, ale istnieją czynniki ryzyka związane z rozwojem tej choroby. Czynniki genetyczne (takie jak dziedziczny wysoki poziom cholesterolu), czynniki mechaniczne (takie jak niedawny uraz barku, wcześniej istniejąca choroba barku, unieruchomienie w temblaku lub niedawny zabieg barku, serca i piersi), czynniki metaboliczne (takie jak cukrzyca lub problemy z tarczycą), czynniki immunologiczne (takie jak niedawne zakażenie wirusowe lub szczepienie), a także czynniki hormonalne mogą być związane z zamrożonym barkiem.

Gdy zamrożony bark rozwija się bez oczywistych powiązanych czynników ryzyka, często podaje się etykietę „Pierwotny” lub „Idiopatyczny” zamrożony bark. Jeśli uważa się, że zamrożony bark został spowodowany przez powiązany czynnik ryzyka, można użyć etykiety „Wtórny” zamrożony bark. Biorąc to pod uwagę, możliwe jest, że lekarz skieruje Cię na dalsze badania w celu wykluczenia wszelkich niezdiagnozowanych schorzeń lub czynników ryzyka.

Jak diagnozuje się zamrożony bark?

Rozpoznanie zamrożonego barku na wczesnym „bolesnym” etapie, zanim nastąpi charakterystyczna utrata zakresu ruchu, może być trudne. Jednak gdy ruchy zostaną ograniczone, terapeuta będzie mógł postawić diagnozę na podstawie badania fizykalnego. Żadne badanie medyczne ani badanie obrazowe nie może ostatecznie zdiagnozować zamrożonego barku, jednak może być wymagane normalne zdjęcie rentgenowskie, aby wykluczyć inne możliwe przyczyny sztywności barku.

Ćwiczenia i zamrożony bark

Samoleczenie w formie terapii ruchowej jest uważane za pierwszą linię leczenia zamrożonego barku. Podejście do terapii ruchowej będzie się różnić w zależności od stadium choroby.

Etap 1: Cele leczenia na tym etapie to zmniejszenie stanu zapalnego i zminimalizowanie przykurczu torebki stawowej. Dlatego w tym etapie może zostać zaproponowany zastrzyk sterydowy. Nie zaleca się forsowania ćwiczeń i ruchów w bólu, ponieważ może to wydłużyć Etap 1 poprzez zwiększenie stanu zapalnego. Chociaż nie należy forsować żadnych ruchów na tym etapie, bezpieczne i korzystne jest kontynuowanie ruchu w zakresie ruchu bez bólu, jaki masz.

Etap 2 i 3: Gdy ból się poprawi i ból nocny ustąpi, terapeuta poprowadzi Cię przez program ćwiczeń, który pomoże Ci przywrócić zakres ruchu i funkcję. Zazwyczaj obejmuje to ćwiczenia rozciągające, ale może również obejmować ćwiczenia wzmacniające.

Twój terapeuta może również wykonywać zabiegi wspomagające, aby pomóc Ci radzić sobie z bólem i wspomagać Twoje ogólne wyzdrowienie. Może to być pomocne, jeśli jest wykonywane w połączeniu z odpowiednim programem ćwiczeń domowych.

Porada dotycząca leczenia!

Zbytne forsowanie ćwiczeń, gdy jesteś w stadium 2 i 3, może czasami skutkować powrotem do bolesnego stadium choroby (stadium 1). „no pain no gain” to nie jest dobre podejście, jeśli chodzi o zamrożony bark.

Podczas ćwiczeń z zamrożonym barkiem najlepiej przyjąć nastawienie „naprężenie, nie ból” i monitorować wszelkie zmiany w nocnym bólu. Jeśli nocny ból zacznie powracać, posłuchaj swojego ciała i przerwij ćwiczenia na kilka dni, aby pozwolić mu się uspokoić. Następnie stopniowo wznów wszystkie ćwiczenia, ale z niższą intensywnością niż wcześniej.

Podejmując to proaktywne podejście, znajdziesz poziom, na którym możesz ćwiczyć regularnie. Jest to ważne, ponieważ konsekwencja jest kluczem do zapewnienia maksymalnych korzyści z ćwiczeń.



Oczekiwania

Zamrożony bark zwykle ustępuje samoistnie, ale powrót do zdrowia może być powolny i nie występuje u wszystkich pacjentów. Większość osób odzyskuje większość swoich możliwości ruchowych, a wszelkie pozostałe ograniczenia ruchomości zazwyczaj nie wpływają na normalne codzienne czynności. Okres powrotu do zdrowia jest bardzo zmienny i wynosi od 1 do 4 lat, ze średnią 2,5 roku. Osoby z cukrzycą częściej doświadczają objawów zamrożonego barku przez dłuższy czas niż osoby bez cukrzycy. Większość poprawy następuje „wcześnie” w ciągu pierwszych 12–48 miesięcy i ważne jest, aby w tym czasie zasięgnąć porady specjalistycznej.

Zamrożony bark rzadko dotyka tego samego barku dwa razy, jednak u 20% osób z zamrożonym barkiem rozwija się ta sama choroba po drugiej stronie w ciągu 5 lat. Bardzo rzadko zdarza się, aby zamrożony bark wystąpił w obu barkach jednocześnie.

Zeskanuj kod
QR, aby uzyskać
dostęp do
odnośników do
artykułów:

