




FASCIOPATIA PODESZWOWA

Czym jest zapalenie powięzi podeszwowej?

Fasciopatía podeszwowa, często nazywane zapaleniem powięzi podeszwowej, jest powszechnym schorzeniem powodującym ból w dolnej części pięty. Chociaż może to być poważny i niepokojący problem, większość przypadków zareaguje na konserwatywne metody leczenia i skutecznie się zagoi.

Rozciągną podeszwowe to pogrubiona tkanka na podeszwie stopy. Wyściela stopę, a także ma właściwości sprężyste, które pomagają przenosić siły mięśni łydki, umożliwiając Ci sprężyste podskakiwanie. Nadaje kształt łukowi stopy, zapewniając amortyzację i równomierne rozłożenie ciężaru, gdy przenosisz ciężar na nogę.

Przeciążenie tej powięzi poprzez nadmierne napięcie może prowadzić do podrażnienia lub, w niektórych przypadkach, zapalenia, skutkując bólem. Ból występuje zazwyczaj podczas przenoszenia ciężaru ciała na stopy.



Nadmierne użytkowanie może wystąpić w okresach wzmożonej aktywności fizycznej, takiej jak piesza wycieczka, lub w wyniku długotrwałego noszenia niewspierającego obuwia, np. przejścia na sandały latem po noszeniu wspierających, sznurowanych butów przez resztę roku. Patologia powięzi podeszwowej jest powszechna wśród osób, które spędzają długie okresy w pozycji stojącej lub chodzącej. Dodatkowe czynniki ryzyka obejmują nadwagę i wiek średni lub starszy.

Co mogę z tym zrobić?

Plantar fasciopathy może znacząco wpłynąć na codzienne życie, powodując znaczny ból i ograniczając normalne czynności. Nie jest niczym niezwykłym, że powrót do zdrowia trwa do sześciu miesięcy, a nawet roku. Jednak prognozy są generalnie pozytywne. Dzięki cierpliwości, samoopiece i, w razie potrzeby, pomocy ze strony pracownika służby zdrowia, większość osób zauważy poprawę z czasem.

Mimo że rozciągno podeszwowe technicznie nie jest ścięgnem, leczenie tego schorzenia jest podobne do leczenia schorzeń związanych ze ścięgnami.

1. Faza odpoczynku i zarządzania obciążeniem

Jeśli objawy dopiero się zaczęły lub trwają kilka tygodni, głównym celem jest złagodzenie bólu i zmniejszenie obciążenia tkanek (tj. zarządzanie obciążeniem). Przez pierwsze kilka tygodni rozważ odpoczywanie stóp częściej niż zwykle. Aktywności obciążające, takie jak chodzenie i bieganie, często zaostrzają ten stan. Dlatego ważne jest, aby tymczasowo ograniczyć te aktywności lub zastąpić je ćwiczeniami o niskim wpływie, takimi jak pływanie lub jazda na rowerze, które wywierają mniejszy nacisk na powięź podeszwową.



Korzystne może być również zbadanie różnych opcji obuwia. Noszenie płaskich, luźnych, niepodtrzymujących butów może nasilać ból. Buty, które oferują wsparcie łuku stopy i sznurowadła dla bezpiecznego dopasowania, są często wygodniejsze. U osób odczuwających ostry ból utrudniający normalne chodzenie, ulgę może przynieść użycie specjalnej wkładki do butów lub wkładki ortopedycznej. Taśmowanie stopy może również zapewnić wsparcie i zmniejszyć ból podczas ruchu. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że ortezy lub taśmowanie nie powinny być jedynymi metodami leczenia, ale raczej częścią kompleksowego podejścia, które obejmuje skuteczne zarządzanie obciążeniem, a także progresywną terapię ćwiczeniami.

Styl życia i zachowania zdrowotne, takie jak kontrola masy ciała, odpowiednia ilość snu, prawidłowa dieta i ogólne dobre samopoczucie, również odgrywają znaczącą rolę w zdrowiu układu mięśniowo-szkieletowego i mogą mieć znaczący wpływ na ból pięty.

Wskazówka. *Możesz również spróbować, czy delikatny masaż podeszwy stopy, ewentualnie piłką tenisową lub podobnym przedmiotem, złagodzi twój ból.*


2. Faza obciążania

Po miesiącu lub dwóch, jeśli stan nie ulegnie poprawie, konieczne jest bardziej proaktywne podejście. Samo odpoczywanie może nie wystarczyć, aby rozwiązać problem, ponieważ mięśnie stóp mogą wymagać wzmocnienia. Wiąże się to ze stopniowym zwiększaniem obciążenia tkanki i wzmacnianiem mięśni stóp. W niektórych przypadkach rozciąganie łydek i podeszwy stopy może również okazać się korzystnym dodatkiem.

Ponadto kluczowe jest zarządzanie obciążeniem. Śledzenie kroków i dążenie do ich stopniowego zwiększania może pomóc. Jeśli ból się nasila, warto zwolnić na kilka dni, zanim stopniowo dodasz więcej kroków, aby zwiększyć tolerancję na obciążenie.



Ćwiczenia wzmacniające należy również stopniowo intensyfikować, dostosowując je do objawów. Na tym etapie zaleca się konsultację z fizjoterapeutą lub pracownikiem służby zdrowia specjalizującym się w problemach ze stopami. Mogą oni udzielić spersonalizowanych wskazówek dotyczących ćwiczeń wzmacniających i zarządzania obciążeniem.



Leczenie powięzi podeszwowej wymaga czasu i cierpliwości. Na szczęście inwazyjne zabiegi, takie jak operacja lub zastrzyki, rzadko są konieczne. Jeśli jednak ból utrzymuje się lub objawy ewoluują w poważniejsze stany, takie jak drętwienie palców u stóp lub ból podczas odpoczynku lub w nocy, zasięgnięcie porady lekarskiej jest kluczowe.

Przydatna również jest **metoda P-Dtr**, żeby znaleźć przyczynę przeciążeń

Jak fala uderzeniowa wpływa na zapalenie?

Terapia falą uderzeniową (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy) to skuteczna metoda leczenia bólu i stanu zapalnego w obrębie przyczepów mięśni. W przypadku zapalenia powięzi, fale uderzeniowe dostarczają intensywne impulsy mechaniczne do zmienionych chorobowo tkanek, co przynosi liczne korzyści terapeutyczne.

Korzyści terapii falą uderzeniową:

1. **Redukcja bólu:** Impulsy mechaniczne blokują receptory bólu, co przynosi szybką ulgę w dolegliwościach.
2. **Zwiększenie ukrwienia:** Fala uderzeniowa stymuluje mikrokążenie w obrębie przyczepów mięśni, przyspieszając regenerację tkanek.
3. **Przyspieszenie gojenia:** Terapia stymuluje produkcję kolagenu, kluczowego składnika tkanki ścięgnowej, co wzmacnia uszkodzone struktury.
4. **Rozbijanie zwłóknień i zrostów:** Fala uderzeniowa pomaga w rozbijaniu patologicznych zmian w tkance, które mogą ograniczać funkcjonalność łokcia.

Dlaczego fala uderzeniowa jest skuteczna w leczeniu?

W przeciwieństwie do wielu innych metod, terapia falą uderzeniową działa nie tylko objawowo, ale również przyczynowo. Poprawiając mikrokążenie i przyspieszając regenerację tkanek, pozwala na odbudowę uszkodzonych przyczepów mięśniowych i przywrócenie pełnej funkcji ręki.

Jak wygląda terapia?

Zabieg jest nieinwazyjny i trwa zaledwie kilka minut. Specjalna głowica dostarcza fale uderzeniowe bezpośrednio w okolice przyczepów mięśni. Dla uzyskania najlepszych efektów zazwyczaj konieczna jest seria kilku zabiegów.



Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać
dostęp do
odnośników do
artykułów:

