



# ZROZUMIENIE CUKRZYCY

*Cukrzyca typu 1, typu 2 i cukrzyca ciążowa*

## **Zrozumieć cukrzycę**

Cukrzyca to grupa chorób charakteryzujących się wysokim poziomem glukozy we krwi lub cukru we krwi (hiperglikemia). Ważne jest, aby pamiętać, że cukrzyca nie jest jedną chorobą, ale serią złożonych zaburzeń metabolicznych wynikających z defektów wydzielania insuliny, działania insuliny lub obu.

Najczęściej cukrzycę klasyfikuje się jako cukrzycę typu 1 (T1D), cukrzycę typu 2 (T2D) i cukrzycę ciążową (GDM). Przed omówieniem tych typów cukrzycy, być może pomocne byłoby wyjaśnienie, jak działa organizm bez cukrzycy.

Wyobraź sobie swoje ciało jako maszynę. Wszystkie maszyny potrzebują zbiornika paliwa, aby działać. W przypadku twojego ciała tym paliwem jest glukoza. Glukoza to cukier dostarczający twojemu ciału energii. Cukier otrzymujesz z pożywienia, które spożywasz. Jest on albo natychmiast wykorzystywany, albo magazynowany w wątrobie, aż będzie potrzebny. Jednak twoje ciało nie może używać glukozy bezpośrednio, więc potrzebuje hormonu zwanego insuliną, który mu w tym pomoże.

Insulina jest produkowana w trzustce. Pomyśl o insulinie jako o kluczu do zbiornika paliwa. Otwiera drzwi do komórek, pozwalając na wejście glukozy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, poziom glukozy i insuliny we krwi powinien być zawsze zrównoważony.

Jeśli występuje problem z ilością insuliny w organizmie, glukoza pozostanie we krwi, nie mogąc dostać się do komórek. To powoduje wzrost poziomu cukru we krwi. Ostatecznie nadmiar glukozy przedostanie się do moczu. W ciągu kilku dni lub tygodni możesz zauważyć takie objawy, jak częstsze wizyty w toalecie, pragnienie, utrata wagi (bez stosowania diety) i ochota na słodkie pokarmy. Możesz odczuwać ogólne zmęczenie, ponieważ organizm nie był w stanie uzyskać wystarczającej ilości glukozy z krwi.

### **Cukrzyca typu 1 (T1D)**

T1D jest wynikiem autoimmunologicznego zniszczenia komórek beta w trzustce, co zazwyczaj prowadzi do całkowitego niedoboru insuliny. Początek T1D często następuje szybko. Bez odpowiedniego leczenia insuliną poziom cukru we krwi będzie nadal rósł (hiperglikemia), a organizm może przejść w kwasicę ketonową, stan potencjalnie zagrażający życiu.

Aby utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, osoby z cukrzycą typu 1 zawsze wymagają terapii zastępczej insuliną, aby utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi. Hipoglikemia, czyli niski poziom cukru we krwi, jest częstym schorzeniem u osób z cukrzycą typu 1, które stosują insulinę. Leczenie hipoglikemii zawsze polega na podawaniu cukru (miodu, soku, napojów gazowanych, owoców), nigdy na podawaniu insuliny.

Do tej pory T1D nie można zapobiec poprzez interwencje w stylu życia lub dietę. Dlatego też, poprawiając swoje samopoczucie fizyczne, psychiczne i społeczne, osoby z T1D są lepiej przygotowane do radzenia sobie z cukrzycą w życiu codziennym.

### **Cukrzyca typu 2 (T2D)**

T2D często rozwija się stopniowo, gdy organizm staje się oporny na działanie insuliny. Trzustka musi więc pracować coraz ciężiej, aby produkować więcej insuliny, aby pokonać tę oporność. Osoby z T2D mogą również doświadczać otyłości brzusznej, wysokiego ciśnienia krwi, nieprawidłowego poziomu cholesterolu i problemów z funkcją naczyń krwionośnych. To skupisko nieprawidłowości jest powszechniej określane jako zespół metaboliczny.



W przypadku T2D wysoki poziom cukru we krwi jest zazwyczaj kontrolowany poprzez połączenie diety i zmian stylu życia. Czasami dieta i zmiany stylu życia są niewystarczające do utrzymania optymalnego poziomu glukozy we krwi. Jeśli te środki okażą się niewystarczające, w razie potrzeby można rozpocząć leczenie farmakologiczne. Jeśli trzustka w ogóle nie produkuje insuliny, osoby z T2D wymagają leczenia insuliną.

Podstawą leczenia cukrzycy typu 2 są regularne i zdrowe nawyki, obejmujące dietę i ćwiczenia, a także radzenie sobie ze stresem i odpowiednia ilość snu.

### **Cukrzyca ciążowa (GDM)**

GDM definiuje się jako każdy stopień nietolerancji glukozy, który po raz pierwszy rozpoznano w czasie ciąży. Zaleca się, aby każda kobieta bez znanej historii cukrzycy poddała się badaniu przesiewowemu glukozy między 24. a 28. tygodniem ciąży.

Zmiany w diecie i stylu życia są podstawowymi sposobami zapobiegania i leczenia GDM. W niektórych przypadkach leki lub nawet insulina mogą być konieczne do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Podczas gdy poziom cukru we krwi zwykle wraca do normy po porodzie, ważne jest, aby pamiętać, że GDM znacznie zwiększa ryzyko rozwoju T2D w przyszłości. Dlatego każda kobieta z GDM powinna przejść test tolerancji glukozy i zostać ponownie oceniona pod kątem cukrzycy, prawidłowej tolerancji glukozy, upośledzonej tolerancji glukozy lub upośledzonej glikemii na czczo co najmniej 6 tygodni po porodzie.

Osoby żyjące z cukrzycą, niezależnie od jej rodzaju, odnoszą korzyści z dbania o siebie poprzez zdrowe odżywianie, codzienne pozostawanie aktywnym, wysypianie się i znajdowanie sposobów na odpoczynek i radzenie sobie ze stresem. Oprócz leków na cukrzycę lub leczenia insuliną, te nawyki związane ze stylem życia przyczyniają się do ogólnego dobrego samopoczucia i ułatwiają radzenie sobie z cukrzycą w życiu codziennym.



## Zapobieganie cukrzycy typu 2

Nie ma jednego powodu, dla którego ludzie rozwijają cukrzycę typu 2 (T2D), ale różne czynniki wpływają na wystąpienie T2D. Czynniki genetyczne i środowiskowe, a także wiek, mogą zwiększać ryzyko T2D. Nadal jednak masz szansę zapobiec lub zmniejszyć ryzyko poprzez wybory dotyczące stylu życia:

Podstawą zapobiegania cukrzycy typu 2 jest „zdrowsze odżywianie, więcej ruchu, mniej stresu i wystarczająca ilość snu”.

### Stan przedcukrzycowy i cukrzyca typu 2

T2D charakteryzuje się insulinoopornością, ponieważ komórki organizmu stają się odporne na działanie insuliny w mięśniach i początkowo względnym niedoborem wydzielania insuliny przez trzustkę. Ponieważ zdolność organizmu do wykorzystywania glukozy jako paliwa pogorszyła się, poziom cukru we krwi zaczyna rosnąć (hiperglikemia). Powoduje to takie objawy, jak pragnienie, częstsze wizyty w toalecie i niewyjaśnioną utratę wagi.



„Przedcukrzyca” odnosi się do sytuacji, w której poziom cukru we krwi nie spełnia jeszcze kryteriów cukrzycy typu 2, ale zaszły już zmiany w sposobie, w jaki organizm może wykorzystywać glukozę jako paliwo. Przecukrzyca jest często związana z nadwagą (szczególnie tłuszczem brzuszny lub trzewny), nieprawidłowym poziomem cholesterolu i wysokim ciśnieniem krwi. Przecukrzyca jest czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, a także chorób sercowo-naczyniowych.

## **Zapobieganie cukrzycy typu 2**

Jeśli wiesz, że w Twojej historii rodzinnej występuje T2D lub masz wysoki poziom cukru we krwi, zdiagnozowano u Ciebie zespół metaboliczny lub stan przedcukrzycowy, nadszedł czas, aby zmienić kurs. Możesz zapobiec lub opóźnić wystąpienie T2D, stawiając na pierwszym miejscu swoje zdrowie i przyjmując zdrowe nawyki związane ze stylem życia. To samo dotyczy sytuacji, gdy już masz T2D; nadal możesz wpływać na postęp choroby, stosując nawyki związane ze stylem życia i dbając o swoje ogólne samopoczucie.

## **Jak dieta i ćwiczenia wpływają na poziom glukozy w organizmie**

Dieta bogata w cukier i tłuszcze nasycone powoduje przyrost masy ciała. Ta dodatkowa masa ciała powoduje większy nacisk na trzustkę, która musi produkować więcej insuliny, aby poradzić sobie ze zwiększonym poziomem glukozy. Z czasem może to prowadzić do niewydolności trzustki, w której trzustka nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej ilości insuliny na potrzeby organizmu. Kiedy tak się dzieje, poziom glukozy we krwi naturalnie zaczyna rosnąć, co zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu 2.

Utrata wagi może pomóc zmniejszyć obciążenie trzustki i utrzymać produkcję insuliny na stabilnym poziomie, a nie nadmiernym. Może to pomóc jej pracować dłużej i wydajniej. Możesz czuć, że utrata wagi jest frustrująca i niemożliwa. Ale zaufaj sobie, utrata wagi i utrzymanie jej jest możliwe. To ciężka praca, wymaga dyscypliny i może zająć trochę czasu, ale są sposoby, aby zrobić to skutecznie.

Zapobieganie i dobre zarządzanie T2D leży przede wszystkim w gestii jednostki. Dlatego samoopieka i wybory dotyczące stylu życia są kluczowe dla poprawy wyników leczenia i jakości życia.



## Co możesz zrobić?

### 1. Zdrowe odżywianie i picie

Jedz regularne posiłki zamiast przekąsek w ciągu dnia i zwracaj uwagę na wielkość porcji. Używaj modelu talerza, ponieważ pomaga on w przygotowaniu zbilansowanego posiłku. Dodawaj świeże warzywa do każdego posiłku i jako przekąski. Wybieraj chude mięso, owoce, nabiał o niskiej zawartości tłuszczu, produkty pełnoziarniste i bogate w błonnik płatki zbożowe, aby skutecznie kontrolować wagę. Uważaj na sól i tłuszcze nasycone.

#### Może pomóc Ci zachować zdrowe nawyki, jeśli

- Rób zakupy z listą i unikaj chodzenia do sklepu spożywczego, gdy jesteś głodny. Sprawdzaj etykiety produktów pod kątem zawartości cukru i soli.
- Ograniczaj jedzenie na wynos i gotowe posiłki, ponieważ często zawierają dużo cukru i tłuszczów nasyconych. Gdy jesteś spragniony, wybieraj wodę i ogranicz słodkie napoje i alkohol.

### 2. Zarządzaj swoją aktywnością fizyczną

Zwiększ swoją codzienną aktywność i ćwiczenia. Oficjalne minimalne zalecenie dotyczące ćwiczeń aerobowych to:

- 2 godz. 30 min intensywnych ćwiczeń tygodniowo lub 1 godz. 15 min intensywnych ćwiczeń (osoba nie jest w stanie wyraźnie mówić) tygodniowo, obejmujących wzmacnianie mięśni wszystkich głównych grup mięśni, 2 lub więcej dni w tygodniu.

Nie musisz wykonywać wszystkich zalecanych ćwiczeń na raz; możesz gromadzić minuty w małych porcjach przez cały tydzień. Staraj się być przynajmniej trochę aktywny każdego dnia i ogranicz ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej (tj. bezczynnej) każdego dnia.

Jeśli masz słabą kondycję lub brakuje Ci motywacji, zacznij od krótkich okresów aktywności fizycznej, a następnie stopniowo zwiększaj częstotliwość, intensywność i czas trwania ćwiczeń.



Zwiększ poziom swojej aktywności w codziennej rutynie, np. parkując na końcu parkingu, korzystając ze schodów lub chodząc energicznie podczas załatwiania sprawunków. Stań podczas wykonywania połączeń telefonicznych i ruszaj się podczas przerw na reklamy telewizyjne.

Pamiętaj, że każdy krok się liczy, a pewna aktywność fizyczna jest lepsza niż jej brak.

### **3. Dbaj o swoje ogólne samopoczucie**

Niewystarczająca ilość snu lub jego słaba jakość może zwiększyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2. Zbyt krótki sen zaburza poziom cukru we krwi, podnosi ciśnienie krwi i utrudnia kontrolę masy ciała. Utrzymanie zdrowych nawyków może być również trudniejsze, gdy jest się zmęczonym.

Staraj się przestrzegać regularnego planu dnia i harmonogramu posiłków. Ogranicz spożycie kofeiny i spędzaj czas na świeżym powietrzu. Pamiętaj, że urządzenia elektroniczne mogą zakłócać sen, ponieważ utrzymują Cię w stanie czujności.

Dbaj o swój nastrój i dobre samopoczucie psychiczne, ponieważ są one zasobem, fundamentem, który wspiera ogólne zdrowie i wydolność funkcjonalną. Staraj się unikać negatywnego stresu i znajdź sposoby na radzenie sobie ze stresem. Możesz poprawić swoje samopoczucie psychiczne małymi działaniami. Odkryjesz metody, które najbardziej Ci odpowiadają, ćwicząc na przykład ćwiczenia uważności.

Zdrowe nawyki związane ze stylem życia również wspierają Twoją odporność w życiu codziennym. Zaczynanie od małych decyzji jest często korzystne przy dokonywaniu zmian w stylu życia. Z czasem decyzje te ukształtują nowe nawyki.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów:

