



Para Leczy

BÓL PRZEDNIEJ CZĘŚCI KOLANA

Co jest przyczyną bólu kolana?

Ból przedniej części kolana jest często uważany za spowodowany przeciążeniem stawu, np. skakaniem lub bieganiem więcej, niż kolano może w danym momencie wytrzymać. Jednak nie zawsze możemy zidentyfikować jedną konkretną przyczynę bólu kolana. Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją również czynniki inne niż tylko uszkodzenie tkanek związane z bólem.

Czasami ból utrzymuje się nawet po wyleczeniu urazu. Niektóre z czynników wpływających na ból i być może powody, dla których może się utrzymywać, to wcześniejsze doświadczenia bólu, przekonania o bólu, stan psychiczny (np. wysoki poziom stresu lub lęku) i jakość snu.

Co mogę zrobić, żeby było lepiej?

Czasami zmiana poziomu aktywności fizycznej może mieć znaczenie. Nie oznacza to, że powinieneś całkowicie przestać się ruszać i unikać bólu.

Oznacza to, że powinieneś zarządzać obciążeniami wpływającymi na kolano, aby zmniejszyć poziom bólu.

Oto kilka przykładów, które możesz zastosować w swoim życiu i w wykonywanej przez siebie aktywności.



01

Na początku niezbędna jest terapia P-Dtr, by znaleźć źródło problemu, oraz przygotować układ nerwowy do wzmacniania mięśni.

Jest to niezbędny krok przed aktywnością fizyczną

02

Przez pierwsze dwa miesiące należy ograniczyć lub zmienić czynności, które nasilają ból.

Na przykład, jeśli działa, możesz wypróbować dowolną z poniższych zmian:

- przejdź na kombinację chodzenia i truchtu, skróć czas biegania,
- zmniejsz czas biegania w tygodniu, zmniejsz prędkość, skróć czas trwania, ale zwiększ częstotliwość,
- zmień rodzaj biegania, zmień rytm biegu itd.
- zmień na jakiś czas aktywność na taką, która będzie wywierała mniejsze siły na twoje kolano, np. pływanie, bieganie w wodzie, jazda na rowerze, ćwiczenia na maszynie eliptycznej itp.

03

Po kilku miesiącach i zmniejszeniu bólu ważne jest, aby robić postępy powoli. Unikaj szybkiego powrotu do normalnego treningu lub aktywności, które wykonywałeś, zanim kolano zaczęło boleć.

Zwiększaj obciążenie stopniowo. Jeśli ból nie nasila się podczas aktywności i jest mniejszy niż dwa (2) w skali bólu od 0 do 10 (0 = brak bólu, 10 = najgorszy ból w życiu), wówczas zwiększenie obciążenia było właściwe.

Jeśli zbyt szybko powrócisz do zbyt dużych obciążeń, ból może się nasilić. Jednak niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że nawet jeśli czasami ból może się nasilić, nie ma powodu do niepokoju. Należy zrozumieć, że zwiększony ból po prostu wskazuje, że powrót do normalnego poziomu aktywności nie był wystarczająco stopniowy. Nie oznacza to, że wydarzyło się coś nieodwracalnego.



Skoro odpoczynek łagodzi ból, po co miałbym się ruszać?

Możesz myśleć, że jeśli bycie aktywnym i poruszanie się powoduje ból kolana, to powinieneś przestać się ruszać, jednak to nieprawda. Brak aktywności wpływa na ogólną sprawność i siłę oraz może dodatkowo zmniejszyć tolerancję obciążenia kolana. Dlatego powinieneś pozostać aktywny, ale znajdź zajęcia, które możesz wykonywać, odciążając kolano przez jakiś czas. Na przykład ogranicz jogging lub gry w piłkę, które obejmują bieganie, nagłe zatrzymania i zwroty, i zacznij jeździć na rowerze lub pływać lub uprawiać inną aktywność, która powoduje mniejsze siły uderzeniowe działające na kolano.

Czasami ćwiczenia rehabilitacyjne mogą wydawać się nudne. Jednak niezwykle ważne jest, aby zobowiązać się do wykonywania ich zgodnie z zaleceniami. Zbyt dużo może wywołać ból i wydłużyć czas rekonwalescencji - zbyt mało i zbyt rzadko nie pozwala na poprawę.

Poświęć trochę czasu na wzmocnienie mięśni. Chociaż główny nacisk kładzie się na mięśnie podudzia i bioder, ważne jest również, aby pamiętać, że kluczem jest wzmocnienie tułowia i górnej części ciała, ponieważ równowaga jest kluczem. Miej pewność siebie i swojego ciała.

Monitorowanie bólu

Ogólnie rzecz biorąc, skupianie się na bólu nie jest zalecane, ponieważ ból lub poziom bólu nie zawsze odzwierciedlają zdrowie tkanek. Jednak monitorowanie bólu jest przydatne, gdy przeciążenie jest częścią problemu. Wtedy zaleca się monitorowanie wpływu aktywności na ból. Może być przydatne monitorowanie tego, ile możesz zrobić i jak możesz robić postępy, bez znacznego zwiększenia bólu. Jednak dobrze jest pamiętać, że inne rzeczy również wpływają na nasze doświadczenie bólu.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do odnośników do artykułów:

