

- [1] J.-M. Lehn, *Supra. Chem.* VCH, Weinheim 1995; P. Ball, L. Garwin, *Nature* **1992**, 355, 761; M. Emmelius, G. Pawlowski, H. W. Vollmann, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1989**, 28, 1445; I. Willner, B. Willner, *Adv. Mater.* **1995**, 17, 587.
- [2] Review see: B. L. Feringa, W. F. Jager, B. de Lange, *Tetrahedron* **1993**, 49, 8267; for a brief review on chirality in nonlinear optics and optical switching see: E. W. Meijer, B. L. Feringa, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **1993**, 235, 169.
- [3] H. Dürr, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1989**, 28, 413.
- [4] M. Irie, M. Mohri, *J. Org. Chem.* **1988**, 53, 803; M. Irie, K. Hayashi, Y. Nakayama, *J. Org. Chem.* **1990**, 55, 2592; J. Daub, S. Gierisch, *Chem. Ber.* **1989**, 122, 69; H. G. Heller, A. P. Glaze, S. A. Harris, W. Johncock, S. N. Oliver, P. J. Strydom, J. Whittall, *J. Chem. Soc. Perkin Trans I* **1985**, 957; Y. Kurita, T. Tanaka, T. Yamane, Y. Yokoyama, *Chem. Lett.* **1991**, 1125.
- [5] S. H. Kawai, S. L. Gilat, J.-M. Lehn, *J. Chem. Soc. Chem. Commun.* **1994**, 1011.
- [6] The term "pseudoeantomers" is used in this context to indicate the opposite helicity of M-2 (M-4) and P-3 (P-5), although these are in fact diastereomers.
- [7] B. L. Feringa, H. Wynberg, *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, 99, 602; W. F. Jager, B. de Lange, A. M. Schoevaars, B. L. Feringa, *Tetrahedron Asymmetry* **1993**, 4, 1481.
- [8] B. L. Feringa, W. F. Jager, B. de Lange, *Tetrahedron Letters* **1992**, 33, 2887; B. L. Feringa, W. F. Jager, B. de Lange, *J. Chem. Soc. Chem. Commun.* **1993**, 288.
- [9] B. L. Feringa, W. F. Jager, B. de Lange, E. W. Meijer, *J. Am. Chem. Soc.* **1991**, 113, 5468; B. de Lange, W. F. Jager, B. L. Feringa, *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* **1992**, 217, 129; *ibid* **1992**, 217, 133.
- [10] W. F. Jager, J. C. de Jong, B. de Lange, N. P. M. Huck, A. Meetsma, B. L. Feringa, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1995**, 34, 348.
- [11] The isomeric composition of the photostationary state upon irradiation at a wavelength is given by  $4/5 \sim \epsilon_5 \Phi_5 \rightarrow 4/\epsilon_4 \Phi_4 \rightarrow 5$ .
- [12] "Photochromism, Molecules and Systems", in *Studies in Organic Chemistry* 40, (Eds: H. Dürr, H. Bouas-Laurent), Elsevier, Amsterdam, **1990**.
- [13] W. E. Moerner, *Jpn. J. Appl. Phys.* **1989**, 28, 221; M. Irie, O. Miyatake, K. Uchida, *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, 114, 8715.
- [14] N. P. M. Huck, B. L. Feringa, *J. Chem. Soc. Chem. Commun.* **1995**, 1095.
- [15] A. M. Schoevaars, R. Hulst, B. L. Feringa, *Tetrahedron Letters* **1994**, 35, 9745.
- [16] B. L. Feringa, N. P. M. Huck, H. A. van Doren, *J. Am. Chem. Soc.* **1995**, 117, 9929; for a related approach to a chiral LC phototrigger, see Y. Zang, G. B. Schuster, *J. Org. Chem.* **1995**, 60, 7192.