

Лабораторная работа №2 (язык Lisp)

Рекурсия

Каждая бригада должна выполнить 3 задачи (номера выбираются из таблицы). В теле функции использование операторов set и setq не допускается! Все функции должны быть рекурсивными, функционалы не использовать.

Номер бригады	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Номера задач для бригады не более, чем из 2-х человек	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Определите функцию:

- 1) Добавляющую заданный параметром символ после каждого неотрицательного элемента списка.
Например, $x=*$, $L=(-1\ d\ 6\ -3\ a\ 0) \rightarrow (-1\ d\ (6\ *)\ -3\ a\ (0\ *))$.
- 2) Преобразующую список в "двойной" список таким образом, чтобы каждый элемент удвоился.
Например, $(1\ a\ b\ 3) \rightarrow (1\ 1\ a\ a\ b\ b\ 3\ 3)$.
- 3) Заменяющую в списке все вхождения x на y .
Например, $x=1$, $y=+$, $L=(2\ 1\ 3\ 5\ 1\ 1\ 8) \rightarrow (2\ +\ 3\ 5\ +\ +\ 8)$.
- 4) Добавляющую заданное параметром x число к каждому числовому элементу списка.
Например, $x=3$, $L=(a\ -1\ 6\ v\ 3) \rightarrow (a\ 2\ 9\ v\ 6)$.
- 5) Удаляющую n первых элементов из списка.
Например, $n=3$, $L=(2\ 6\ 1\ 7\ 0) \rightarrow (7\ 0)$.
- 6) Строящую список "луковица" с уровнем вложенности n для параметра x .
Например, $n=4$, $x=* \rightarrow (((((*))))$.
- 7) Добавляющую заданное параметром x число в упорядоченный по неубыванию числовой список таким образом, чтобы сохранилась упорядоченность.
Например, $x=7$, $L=(0\ 3\ 3\ 6\ 9) \rightarrow (0\ 3\ 3\ 6\ 7\ 9)$.
- 8) Возвращающую список позиций элемента, заданного параметром x , в списке L .
Например, $x=4$, $L=(8\ 3\ 4\ 6\ 4\ 1) \rightarrow (3\ 5)$.
- 9) Возвращающую список из n копий заданного атома x .
Например, $x=4$, $n=5 \rightarrow (4\ 4\ 4\ 4\ 4)$.
- 10) Удаляющую все отрицательные элементы из списка.
Например, $(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0) \rightarrow (6\ s\ 4\ f\ 0)$.

Объединяющую 2 списка в один, чередуя элементы списков.

Например, $L1=(1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8)$, $L2=(a\ s\ d\ f) \rightarrow (1\ a\ 2\ s\ 3\ d\ 4\ f\ 5\ 6\ 7\ 8)$.

11) Возвращающую список из пар соседних элементов, одинаково отстоящих от начала и конца списка.

Например, $(1\ a\ b\ c\ 2\ 3\ f) \rightarrow ((1\ f)\ (a\ 3)\ (b\ 2)\ (c))$

12) Определяющую, сколько раз заданный элемент входит в список.

Например, $x=a$, $L=(1\ a\ x\ a\ 2\ a\ 1\ 2\ d) \rightarrow 3$.

13) Преобразующую список в множество.

Например, $(a\ b\ a\ a\ c\ c) \rightarrow (b\ a\ c)$.

14) Осуществляющую циклический сдвиг в списке L на n элементов влево.

Например, $L = (a\ s\ d\ f\ g)$, $n = 3 \rightarrow (f\ g\ a\ s\ d)$.

15) Осуществляющую циклический сдвиг в списке L на n элементов вправо.

Например, $L = (a\ s\ d\ f\ g)$, $n = 3 \rightarrow (d\ f\ g\ a\ s)$.

16) Удаляющую элементы с четными номерами из списка (нумерация элементов должна начинаться с 1).

Например, $(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0\ z\ x\ r) \rightarrow (-2\ s\ 4\ 0\ x)$.

17) Вычисляющую сумму элементов с нечетными номерами числового списка (нумерация элементов должна начинаться с 1).

Например, $(-2\ 3\ 2\ 5\ -6\ 5\ 2\ 1\ 3) \rightarrow -1$.

18) Добавляющую элемент в конец числового списка, чтобы сумма элементов этого списка стала равна 100.

Например, $(2\ 10\ 15\ 50\ 30) \rightarrow (2\ 10\ 15\ 50\ 30\ -7)$.

19) Вычисляющую количество четных элементов в списке.

Например, $(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0\ z\ x\ r) \rightarrow 4$.

20) Формирующую список, состоящий из сумм первого и последнего, второго и предпоследнего элементов числового списка и т.д. Каждый элемент должен участвовать в сложении не более одного раза.

Например, $(1\ -2\ -3\ 4\ 5\ 6\ -7\ 8\ 9) \rightarrow (10\ 6\ -10\ 10\ 5)$.

21) Удаляющую элементы из первого списка с номерами из второго списка (второй список упорядочен по возрастанию, нумерация элементов должна начинаться с 1).

Например, $L1=(a\ s\ d\ f\ g\ h\ j\ k\ l)$, $L2=(1\ 4\ 5\ 8) \rightarrow (s\ d\ h\ j\ l)$.

22) Формирующую подсписок из n элементов списка L , начиная с k -го элемента. (нумерация элементов должна начинаться с 1).

Например, $L=(-2\ 6\ s\ -1\ 4\ f\ 0\ z\ x\ r)$, $k=3$, $n=4 \rightarrow (s\ -1\ 4\ f)$.

- 23) Переставляющую элементы списка таким образом, чтобы одинаковые элементы оказались рядом. Сортировку не использовать!
Например, (1 5 2 1 4 3 1 2 4 5 4) \rightarrow (1 1 1 5 5 2 2 4 4 4 3).
- 24) Преобразующую список L в новый список, элементы которого имеют вид:
(\langle элемент списка $L \rangle$ \langle кол-во вхождений этого элемента в список $L \rangle$).
Например, $L = (a\ b\ a\ a\ c\ b) \rightarrow ((a\ 3)\ (b\ 2)\ (c\ 1))$.
Указание: Напишите вспомогательную функцию, которая подсчитывает количество вхождений элемента в список.
- 25) Вычисляющую количество атомов в списочной структуре (на всех уровнях).
Например, $((a\ b)\ c\ ((d\ a\ v))) \rightarrow 6$.
- 26) Вычисляющую глубину списка.
Например, $(((((1))))\ 2\ (3\ 4)) \rightarrow 4$.
- 27) Преобразующую инфиксную запись выражения в прединфиксную и возвращающую значение выражения.
Например, $((-8 + 10) * (12/3)) \rightarrow 8$.
- 28) Преобразующую одноуровневый список во вложенный по следующему правилу:
 $(a\ s\ d\ f\ g) \rightarrow (a\ (s\ (d\ (f\ (g))))))$.
- 29) Преобразующую одноуровневый список во вложенный по следующему правилу:
 $(a\ s\ d\ f\ g) \rightarrow (((((a)\ s)\ d)\ f)\ g)$.