Výklad a souvislosti

Rozklad obvykle nezačíná hledáním vzorce naslepo. Nejprve zkus vytknout společný činitel. Potom zkontroluj, zda zbylá závorka odpovídá známému vzorci. Každý získaný činitel ještě prohlédni.

Připomenutí definice

Rozklad na součin mění zápis součtu na součin se stejnou hodnotou pro všechna přípustná dosazení. Ověřujeme jej zpětným roznásobením.

Používej vytýkání, rozdíl čtverců a rozpoznání druhé mocniny dvojčlenu. V některých trojčlenech lze prostřední člen rozdělit a potom seskupovat. Tím neřešíme kvadratickou rovnici; jen kontrolujeme součin podle známého násobení závorek.

Řešené příklady

Příklad 1

Rozlož $3x^3 - 12x$.

Řešení: Nejprve $3x(x^2 - 4)$, potom $3x(x - 2)(x + 2)$. Kdybychom vynechali vytýkání, rozdíl čtverců by nebyl ihned patrný.

Příklad 2

Rozlož $x^4 - 16$ a $x^2 + 5x + 6$.

Řešení: První výraz je $(x^2-4)(x^2+4) = (x-2)(x+2)(x^2+4)$. Druhý rozdělíme na $x^2+2x+3x+6 = x(x+2)+3(x+2) = (x+2)(x+3)$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Rozlož $2a^3 - 8a^2 + 8a$.
b) Rozlož $5x^2 - 45y^2$.
c) Rozlož $x^2 - x - 6$ seskupením.

Řešení:
a) $2a(a^2 - 4a + 4) = 2a(a - 2)^2$.
b) $5(x^2 - 9y^2) = 5(x - 3y)(x + 3y)$.
c) $x^2 - 3x + 2x - 6 = x(x - 3) + 2(x - 3) = (x + 2)(x - 3)$.

Poznámka pro učitele. *Vyžaduj popis prvního rozhodnutí, nejen konečný součin. Důkazem není shoda pro jednu číselnou hodnotu. Součet a rozdíl třetích mocnin ponech příští hodině; tento blok vystačí s vytýkáním a druhými mocninami.*

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Rozlož $x^4 - 2x^2 + 1$.

Řešení: Rozpoznáme druhou mocninu dvojčlenu $x^2 - 1$: $(x^2 - 1)^2 = (x - 1)^2(x + 1)^2$.