

AVALIAÇÃO DO ERRO NA REGRA $1/3$ DE SIMPSON

MAT 271 – Cálculo Numérico – PER3/2021/UFV
Professor Amarísio Araújo DMA/UFV



ERRO COMETIDO NA INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Suponha que a integral $\int_a^b f(x)dx$ exista.

Dividindo o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de mesmo comprimento $h = \frac{b-a}{n}$, podemos obter o polinômio interpolador $p_n(x)$, de grau $\leq n$, usando os pontos:

$$x_0 = a, x_1 = x_0 + h, \dots, x_n = x_{n-1} + h = b.$$

Sendo $p_n(x)$ uma aproximação de $f(x)$ em $[a, b]$, o valor da integral $\int_a^b f(x)dx$ pode ser obtido, de forma aproximada:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b p_n(x)dx.$$

O erro em tal aproximação, $E_n = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b p_n(x)dx$, pode ser expresso pelo seguinte teorema:

TEOREMA

i) Se f possui $n + 1$ derivadas contínuas no intervalo $[x_0, x_n]$ e n é um número ímpar (ou seja, o intervalo $[a, b]$ é subdividido em um número ímpar de subintervalos de mesmo comprimento h), então existe um $\xi \in [x_0, x_n]$ tal que:

$$E_n = \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_0^n u(u-1) \dots (u-n) du$$

ii) Se f possui $n + 2$ derivadas contínuas no intervalo $[x_0, x_n]$ e n é um número par (ou seja, o intervalo $[a, b]$ é subdividido em um número par de subintervalos de mesmo comprimento h), então existe um $\xi \in [x_0, x_n]$ tal que:

$$E_n = \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_0^n \left(u - \frac{n}{2}\right) u(u-1) \dots (u-n) du$$

ERRO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

Na Regra 1/3 de Simpson, a integral $\int_a^b f(x)dx$ é calculada de forma aproximada a partir de uma aproximação de $f(x)$ por um polinômio interpolador $p_2(x)$, usando $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, $x_2 = b$, com a divisão do intervalo $[a, b]$ em 2 subintervalos de mesmo comprimento $h = \frac{b-a}{2}$.

$$\int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b p_2(x)dx.$$

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

ERRO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

Assim, aplicando o item ii) do Teorema, com $n = 2$, se f possui as derivadas $f^{(1)}$, $f^{(2)}$, $f^{(3)}$ e $f^{(4)}$ contínuas no intervalo $[x_0, x_2] = [a, b]$, então existe um $\xi \in [a, b]$ tal que o erro E_2 no cálculo aproximado da integral $\int_a^b f(x)dx$ é:

$$E_2 = \frac{h^5 f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^2 (u-1)u(u-1)(u-2)du$$

ERRO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

Resolvendo a integral $\int_0^2 (u-1)u(u-1)(u-2)du$:

$$\int_0^2 (u-1)u(u-1)(u-2)du = -\frac{4}{15}$$

Assim:

$$E_2 = \frac{h^5 f^{(4)}(\xi)}{4!} \int_0^2 (u-1)u(u-1)(u-2)du = \frac{h^5 f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(-\frac{4}{15}\right) = -\frac{h^5 f^{(4)}(\xi)}{90}$$

$$E_2 = -\frac{h^5 f^{(4)}(\xi)}{90}$$

ERRO ABSOLUTO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON (SIMPLES)

$$|E_2| = \left| -\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \right| = \left| -\frac{h^5}{90} \right| |f^{(4)}(\xi)| = \frac{h^5}{90} |f^{(4)}(\xi)|$$

Como $|f^{(4)}(\xi)| \leq \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$, temos que:

$$|E_2| \leq \frac{h^5}{90} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$

O valor $\frac{h^5}{90} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$ é um **LIMITANTE SUPERIOR PARA O ERRO** na Regra 1/3 de Simpson (Caso simples).

ERRO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON GENERALIZADA

Na Regra 1/3 de Simpson Generalizada, dividimos o intervalo $[a, b]$ em n (n par) subintervalos $[x_{i-1}, x_i], i = 1, \dots, n$ de mesmo comprimento $h = \frac{b-a}{n}$, sendo:

$$x_0 = a, x_1 = x_0 + h, x_2 = x_1 + h, \dots, x_n = x_{n-1} + h = b.$$

Aplicamos o caso simples da Regra a cada integral em $[x_{i-2}, x_i], i = 2, 4, \dots, n$:

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^n \left(\int_{x_{i-2}}^{x_i} f(x)dx \right) \cong \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^n \left(\frac{h}{3} [f(x_{i-2}) + 4f(x_{i-1}) + f(x_i)] \right)$$

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3) \dots + f(x_{n-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{n-2})) + f(x_n)]$$

ERRO ABSOLUTO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON GENERALIZADA

O erro E na Regra 1/3 de Simpson Generalizada é obtido somando-se os erros da Regra 1/3 de Simpson (Caso Simples) aplicada a cada par de subintervalos

$[x_{i-2}, x_{i-1}], [x_{i-1}, x_i]$, que é: $E_{2i} = -\frac{h^5 f^{(4)}(\xi_{2i})}{90}$

Como $|f^{(4)}(\xi_{2i})| \leq \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$: $|E_{2i}| \leq \frac{h^5}{90} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$

Assim:

$$|E| \leq \frac{n h^5}{2 \cdot 90} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} = \frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$

$$|E| \leq \frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$

REGRA 1/3 DE SIMPSON

SIMPLES $n = 2$

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{h}{2} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]$$

$$|E_2| \leq \frac{h^5}{90} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$
 ← LIMITANTE SUPERIOR PARA O ERRO

GENERALIZADA $n \geq 4, n$ PAR

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3) \dots + f(x_{n-1})) + 2(f(x_2) + f(x_4) + \dots + f(x_{n-2})) + f(x_n)]$$

$$|E| \leq \frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$
 ← LIMITANTE SUPERIOR PARA O ERRO

EXEMPLO

Vamos aplicar a Regra 1/3 de Simpson, com $n = 4$, para calcular de forma aproximada a integral $\int_1^4 \sqrt{x} dx$ e obter um limitante superior para o erro.

Temos: $f(x) = \sqrt{x}$; $a = 1$, $b = 4$.

EXEMPLO

$$n = 4 \Rightarrow h = \frac{4-1}{4} = 0.75, \text{ e temos: } x_0 = 1, x_1 = 1.75, x_2 = 2.5, x_3 = 3.25 \text{ e } x_4 = 4.$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4(f(x_1) + f(x_3)) + 2f(x_2) + f(x_4)]$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx \cong \frac{0.75}{3} [f(1) + 4(f(1.75) + f(3.25)) + 2f(2.5) + f(4)]$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx \cong \frac{0.75}{3} [1 + 4(\sqrt{1.75} + \sqrt{3.25}) + 2\sqrt{2.5} + 2] = 4.6662207$$

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx \cong 4.6662207$$

EXATO

$$\int_1^4 \sqrt{x} dx = 4.6666666$$

EXEMPLO

Calculando um limitante superior para o erro: $|E| \leq \frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$

$$f(x) = \sqrt{x}; \quad f^{(1)}(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}; \quad f^{(2)}(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}; \quad f^{(3)}(x) = \frac{3}{8}x^{-5/2}; \quad f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-7/2};$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16(\sqrt{x})^7}; \quad |f^{(4)}(x)| = \left| -\frac{15}{16(\sqrt{x})^7} \right| = \frac{15}{16(\sqrt{x})^7};$$

Como $|f^{(4)}(x)|$ é decrescente em $[1,4]$, $\max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} = |f^{(4)}(1)| = 0.9375$.

$$|E| \leq \frac{(0.75)^4}{180} \times 3 \times 0.9375 = 0.00494$$

$$|E| \leq 0.00494$$

DETERMINANDO UM NÚMERO DE SUBINTERVALOS QUE GARANTA UMA DADA PRECISÃO PARA O ERRO ABSOLUTO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON

Ao usar a Regra 1/3 de Simpson Generalizada para resolver a integral $\int_a^b f(x)dx$, com hipóteses adequadas para a função f , obtivemos uma majoração para o erro absoluto $|E|$ cometido na aproximação, dada por:

$$|E| \leq \frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}, \text{ sendo } h = \frac{b-a}{n} \text{ (} n \text{ par)}.$$

Se quisermos que o erro absoluto seja menor que um dado $\varepsilon > 0$, basta que

$$\frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} < \varepsilon.$$

DETERMINANDO UM NÚMERO DE SUBINTERVALOS QUE GARANTA UMA DADA PRECISÃO PARA O ERRO ABSOLUTO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON

Consideremos, então a inequação $\frac{h^4}{180} (b - a) \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} < \varepsilon$.

Como $h = \frac{b-a}{n}$, temos: $\frac{(b-a)^5}{180n^4} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} < \varepsilon$

$$\Rightarrow n^4 > \frac{(b-a)^5}{180\varepsilon} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}$$

$$\Rightarrow n > \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5}{180\varepsilon} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}}$$

$$\begin{aligned} a &> 0 \\ x^4 > a &\Leftrightarrow x^4 - a > 0 \Leftrightarrow (x^2 - \sqrt{a})(x^2 + \sqrt{a}) > 0 \\ x^2 - \sqrt{a} > 0 &\Leftrightarrow x > \sqrt[4]{a} \text{ ou } x < -\sqrt[4]{a} \\ x > 0 &\Rightarrow x > \sqrt[4]{a} \end{aligned}$$

DETERMINANDO UM NÚMERO MÍNIMO DE SUBINTERVALOS QUE GARANTA UMA DADA PRECISÃO PARA O ERRO ABSOLUTO NA REGRA 1/3 DE SIMPSON

Portanto, ao aplicar a Regra 1/3 de Simpson para resolver a integral $\int_a^b f(x)dx$, para garantir que o erro absoluto cometido na aproximação seja menor que um dado $\varepsilon > 0$, basta que o número n de subintervalos a ser considerado satisfaça a seguinte desigualdade:

$$n > \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5}{180\varepsilon} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}}$$

Assim, o menor natural par n tal que $n > \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5}{180\varepsilon} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}}$ é um número de subintervalos que nos garante que, ao aplicar a Regra 1/3 de Simpson para resolver a integral $\int_a^b f(x)dx$, o erro absoluto cometido na aproximação seja menor que um dado $\varepsilon > 0$.

EXEMPLO

Vamos encontrar o número de subintervalos que garanta que o erro absoluto ao se calcular de forma aproximada a integral $\int_1^4 \sqrt{x} dx$ pela Regra 1/3 de Simpson seja menor que $\varepsilon = 0.001$.

$$n > \sqrt[4]{\frac{(b-a)^5}{180\varepsilon} \max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\}} \quad a = 1, b = 4$$

Como já vimos no exemplo anterior: $\max\{|f^{(4)}(x)|, x \in [a, b]\} = |f^{(4)}(1)| = 0.9375$

$$\Rightarrow n > \sqrt[4]{\frac{(4-1)^5}{180 \times 0.001} \times 0.9375} \quad \Rightarrow n > 5.9645 \quad \Rightarrow n \geq 6$$

Portanto, com $n = 6$ subintervalos, há garantia de que o erro absoluto seja menor que 0.001

Na Regra do Trapézio, encontramos $n = 24$.

(Aula Assíncrona anterior)