
a
Doença de Alzheimer
Doença de Parkinson
Primária: uma estimativa por estudo
Seleção neutra quanto ao tipo de marcador
Intervalos de confiança como publicados
Só estudos com intervalo reportado
Excluindo um estudo por vez (cada ponto)
2000 seleções aleatórias cegas à acurácia
Toda estimativa elegível (ignora correlação)
Mais o estudo da atualização, RT-qPCR
Mais o estudo da atualização, ORCA-Cas
0.82 [0.77–0.85]
0.81 [0.76–0.84]
0.82 [0.77–0.85]
0.83 [0.73–0.89]
0.81–0.83
0.80 [0.79–0.82]
0.79 [0.77–0.81]
0.82 [0.78–0.85]
0.82 [0.78–0.86]
0.80 [0.74–0.85]
0.78 [0.73–0.83]
0.81 [0.75–0.85]
0.77 [0.66–0.85]
0.79–0.81
0.79 [0.77–0.81]
0.78 [0.75–0.80]
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
AUC agregado
b
Doença de Parkinson
Seleção primária
Seleção neutra
Doença de Alzheimer
Seleção primária
Seleção neutra
isolado (n)
painel (n)
painel vs isolado, p
0.76 (12)
0.85 (7)
p = 0.04
0.77 (16)
0.84 (3)
p = 0.37
0.81 (12)
0.83 (6)
p = 0.69
0.81 (14)
0.81 (4)
p = 0.90
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
AUC agregado (IC 95%); quadrado = miRNA isolado, losango = painel; n de estudos entre parênteses