

a
Meias-vidas dos passos, frente aos intervalos de dose
8 h
12 h
24 h diária
48 h
168 h semanal
meias-vidas em 24 h
miR-7
1.7 h
14.1
miR-7, limite superior
5.0 h
4.8
miR-29b
7.0 h
3.4
miR-29c
10.6 h
2.3
miRNA mediano
34.0 h
0.7
miRNA
mRNA de SNCA
6.5 h
3.7
mRNA de BACE1
15.2 h
1.6
mRNA
α-sinucleína
24.0 h
1.0
BACE1
18.6 h
1.3
proteoma do cérebro, mediana
195 h
0.1
Proteína
depuração de Aβ42, controles
9.1 h
2.6
depuração de Aβ42, DA
13.1 h
1.8
Aβ42
1 h
10 h
100 h
1000 h
b
Eliminação
Nível, múltiplo do basal
10
5
2
1
a 10% do basal
0
25
50
75
100
Tempo após um bolus de 10x (h)
c
Custo da instabilidade
diário
miR-7 (1.7 h)
miR-7, limite superior (5 h)
miR-29b (7 h)
miR-29c (10.6 h)
miRNA mediano (34 h)
Pico / média
20
10
5
2
1
1
2
4
8
24
48
Intervalo entre doses (h)
d
Estabilização para dose diária
miR-7
20.0×
miR-7 (5 h)
6.8×
miR-29b
4.9×
miR-29c
3.2×
0
10
20
Aumento da meia-vida (vezes)