

Identificação

Registros identificados na busca em bases de dados (n = 587)
PubMed/MEDLINE (n = 234)
Scopus, novos (n = 326) · Web of Science, novos (n = 27)

Triagem

Registros triados (n = 587)

Excluídos como literatura secundária
(revisão, meta-análise, editorial)
(n = 231)

Estudos primários (n = 356)
reportando medida de acurácia no título/resumo (n = 129)

Verificação de recall dos registros sem
afirmação de acurácia no resumo
(n = 227)
Plausíveis por título/resumo (n = 90)
Sem texto completo aberto, não avaliados (n = 53)
Texto completo não recuperável (n = 3)
Textos completos lidos (n = 34)

Elegibilidade

Textos completos obtidos e avaliados quanto à elegibilidade (n = 82)
48 do braço de acurácia no resumo, 34 da verificação de recall
77 estudos contribuíram 251 estimativas extraídas

Estimativas excluídas do
pool primário, motivo registrado
(n = 134)

Estimativas elegíveis para o pool primário (n = 117)
desenho caso-versus-controle saudável, 47 estudos independentes

Incluídos

Estimativas circulantes com erro-padrão computável,
incluídas na meta-análise agregada PRIMÁRIA (n = 97)
de 37 estudos independentes

Sem erro-padrão computável: sem IC e
sem tamanhos de grupo utilizáveis (n = 17)
Líquido cefalorraquidiano, EP computável
mas não é biofluido circulante:
reportado à parte, não agregado (n = 3)