
ESTRUTURAS DEPOSITADAS


renders das coordenadas depositadas, como ilustração: nenhum resultado é lido deles



Argonauta 2 com um miRNA guia

6N4O · raios X, 2.9 Å
guia, semente (vermelho) e alvo


AD PD



BACE1 com um inibidor

4D8C · raios X, 2.07 Å
aberta; Asp catalíticos em vermelho


AD



Fibrila de Aβ42

5OQV · cryo-EM, 4.0 Å
vista pelo eixo da fibrila

AD



Fibrila de α-sinucleína

6CU7 · cryo-EM, 3.5 Å (FSC 0.5)
vista pelo eixo da fibrila

PD

força da repressão não medida
BACE1 cerca de 50% em células (K047)

ALZHEIMER

Mimético
bolus D
a cada T h

miR-29a, b, c
b 7 h, c 10.6 h
a: sem queda em 12 h
K017–K019

BACE1 mRNA
meia-vida 15.2 h
5 isoformas juntas
K067, K068

Proteína BACE1
meia-vida ≈19 h
BACE1:APP = 1:54
K025, K055, K056

Aβ42 monomero
produção 6.6 %/h
depuração 5.3 %/h
na DA; K001–K004

Nucleação Aβ42
ordens 2 e 2
M* 10 nM
constantes: lacuna
K012–K014, K037

força da repressão não medida
SNCA 30% e 43% em células (K058, K063)

PARKINSON

Mimético
bolus D
a cada T h

miR-7
meia-vida 1.7 h
limite superior 5 h
Cyrano a degrada
K020–K023

SNCA mRNA
meia-vida 6.5 h
neurônios de rato
K066

α-sinucleína
21.6 µM num botão
meia-vida ≥ 24 h
K026, K054

Alongamento
saturante
m½ 46–50 µM
K009, K010

Nucleação
controlada por pH:
nenhuma em pH 7
K011, K042

contorno tracejado: sem constantes medidas barra tracejada: repressão