
a
DP, meta de 30%, ρ = 5.2
Pool do repressor (× basal)
30
10
3
1
miR-7 (1.7 h)
miRNA mediano (34 h)
mRNA (× basal)
1
0
Proteína (× basal)
1.00
0.75
meta: 30% abaixo do basal, na média do ciclo
0
10
20
30
40
50
Tempo (h), dose diária
b
DP, queda de 30%: faixa da varredura, ponto médio, piso
não alcançada
miR-7 (1.7 h)
miR-7, limite superior (5 h)
miRNA mediano (34 h)
Pico do pool do repressor (× basal)
10⁴
1000
100
10
1
8
12
24
48
168
Intervalo entre doses (h)
c
DA, queda de 29.2%: faixa da varredura e ponto médio
miR-29b (7 h)
miR-29c (10.6 h)
miRNA mediano (34 h)
Pico do pool do repressor (× basal)
100
10
1
8
12
24
48
168
Intervalo entre doses (h)
d
Forma fechada contra o ciclo (ponto médio de ρ)
Eficiência
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
8
12
24
48
168
Intervalo entre doses (h)
DP miR-7
DP miR-7 (5 h)
DP mediano
DA miR-29b
DA miR-29c
DA mediano