Dois eixos de microRNA, da cinética medida a um desfecho calculado

Todo numero abaixo e carregado de results/tables/ e data/extracted/ no momento do desenho - nenhum e redigitado de uma frase

EIXO DA DOENÇA DE ALZHEIMER


miR-29b / miR-29c
t½ 7 h / 10.6 h
não são uma espécie só [K017,K018]

-| BACE1
BACE1 : APP ≈ 1 : 54
(116 vs 6284 cópias/botão) [K055,K056]

Produção de Aβ42
6.7 (ctrl) / 6.6 (DA) %/h, n.s.
depuração −30,3% na DA [K001,K002]

Razão Aβ DA / controle
= 1.41×
sem parâmetro livre

Queda de BACE1 necessária
para fechar o hiato: 29%
(< 50% medido, Hebert 2008)



AGO2 carregado com um RNA guia
(PDB 6N4O, AGO2 humano-miR-122)
a etapa de pareamento da semente comum aos dois eixos

Penalidade de dosagem: 7.7× de pico
vs miRNA de estabilidade mediana —
precisa de ~20× de estabilização

miR-7
t½ 1.7 h — a mais curta do
levantamento (mediana 34 h) [K020,K016]

-| SNCA / α-sinucleína
21.6 µM no botão
pré-sináptico [K054, Wilhelm 2014]

Regime de elongação
30–32% da V_máx
abaixo da meia-sat. (m½ 46–50 µM)

Queda medida 30% / 43% (Doxakis 2010)
→ 23–34% de elongação mais lenta

EIXO DA DOENÇA DE PARKINSON

Fontes: Mawuenyega et al. 2010; Hébert et al. 2008; Zhang et al. 2011; Kingston & Bartel 2019; Wilhelm et al. 2014; Buell et al. 2014; Doxakis 2010; Tushev et al. 2018 - derivação completa em docs/pt-BR/METODOS.md seção 11.