

Gesamtschule Scharnhorst

Fundamentalsatz der Analysis

geschrieben von

Benno Schörmann

Thema der Facharbeit:

Eine vollständige Definition und ein vollständiger Beweis des Fundamentalsatzes der Analysis

Inhaltsverzeichnis

I	Geschichtliche Zusammenfassung	2
II	Riemann-Integral	3
III	Mittelwertsatz der Integralrechnung	4
IV	Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung	5
	IV.1 Erster Teil	5
	IV.2 Korollar	8
	IV.3 Zweiter Teil	9
V	Fazit	11
VI	Eigenständigkeitserklärung	13

I Geschichtliche Zusammenfassung

Genutzte Quellen: [Bressoud 2011, vgl.]

Die Geschichte des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung beginnt im 17. Jahrhundert mit Gottfried Leibnitz und Isaac Newton. Leibnitz sah das Integral als eine unendlich große Menge an Flächen die unendlich klein sind. Damit zeigte er den wichtigen Zusammenhang zwischen Integration und Fläche. Isaac Newton nutzte die Geometrie, um den Unterschied zwischen Distanz, Geschwindigkeit und Beschleunigung zu beschreiben. Das ist der Schlüssel, um das Verhältnis zwischen Integral und Ableitung zu verstehen. Krümmung ist die Ableitung von Steigung und Steigung ist die Ableitung von Strecke/Distanz. Distanz ist hingegen das Integral von Steigung und Steigung ist das Integral von Krümmung. 1823 hat Cauchy das Integral per Limes definiert. Im 19. Jahrhundert beschrieb Siméon Denis Poisson das bestimmte Integral als die Differenz der Stammfunktion $[F(b)-F(a)]$. Um 1950 wurden die Theorien zu einem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung zusammengefasst.

II Riemann-Integral

Satz II.0.1.

III Mittelwertsatz der Integralrechnung

Genutzte Quellen: [Reis und Rothe 2015, vgl.]

Satz III.0.1.

Gegeben ist die in \mathbb{R} definierte Funktion auf dem Intervall $[a, b]$ liegende Funktion f und g . g ist außerdem integrierbar und ohne Vorzeichenwechsel, also $g \geq 0$ **oder** $g \leq 0$. Dann existiert mindestens ein ξ , sodass

$$\int_a^b f(t)g(t)dt = f(\xi) \int_a^b g(t)dt$$

Die obige Aussage wird auch als erweiterter Mittelwertsatz bezeichnet. Wenn allerdings $g = 1$ ist, kommt es zu einem spezialgelagerten Sonderfall

$$\int_a^b f(t)dt = f(\xi)(b - a)$$

Wenn man die rechte Seite der Gleichung betrachtet, fällt auf, dass dort ein Rechteck gebildet wird. Dieses Rechteck hat die gleiche Fläche wie das Integral zwischen a und b .

Beweis.

Gegeben ist die in \mathbb{R} definierte Funktion g , wobei $g(x) \geq 0$ und auf dem Intervall $[a, b]$ liegt.

f nimmt zwischen a und b ein Minimum k und ein Maximum K an. Somit ist $k \leq f(x) \leq K$ und bei $g \geq 0$ ist $kg(x) \leq f(x)g(x) \leq Kg(x)$. Daraus erschließt sich

$$k \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq K \int_a^b g(x)dx$$

□

IV Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

Der Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung ist in zwei Hauptsätze und einen Nebensatz aufgeteilt.

Der erste Satz stellt den Zusammenhang zwischen Integral und Differential dar.

IV.1 Erster Teil

Satz IV.1.1.

Gegeben ist die in \mathbb{R} definierte Funktion f in einem geschlossenen Intervall $[a, b]$. Sei F definiert für alle x im Intervall $[a, b]$ durch

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Dann ist F gleichmäßig stetig auf dem Intervall $[a, b]$ und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b) , und

$$F'(x) = f(x)$$

Für alle x in (a, b) , sodass F eine Stammfunktion von f ist.

Beweis.

Für ein gegebenes $f(t)$ sei die Funktion $F(x)$ definiert als

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Für jegliche 2 Zahlen x_1 und Δx im Intervall $[a, b]$ ergibt sich

$$F(x_1) = \int_a^{x_1} f(t)dt$$

und

$$F(x_1 + \Delta x) = \int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)dt$$

Wenn diese beiden Gleichungen nun subtrahiert werden, dann ergibt sich

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = \int_a^{x_1 + \Delta x} f(t)dt - \int_a^{x_1} f(t)dt \quad (1)$$

Die Summe beider Flächen ist

$$\int_a^{x_1} f(t)dt + \int_{x_1}^{x_1+\Delta x} f(t)dt = \int_a^{x_1+\Delta x} f(t)dt$$



Wenn man, wie in dem oben gezeigten Fall, die Flächen zweier Integrale von z.B. 0 bis 4 und 4 bis 5 addiert, dann ergibt das die Fläche des Integrals von 0 bis 5. Generell ausgedrückt ist das also

$$\int_a^b f(t)dt + \int_b^c f(t)dt = \int_a^c f(t)dt$$

, wobei $a \leq b \leq c$.

Die Umformung dieser Gleichungen gibt

$$\int_a^{x_1+\Delta x} f(t)dt - \int_a^{x_1} f(t)dt = \int_{x_1}^{x_1+\Delta x} f(t)dt$$



Wenn man, wie in dem oben gezeigten Fall, die Flächen zweier Integrale von z.B. 0 bis 5 und 0 bis 4 miteinander subtrahiert, dann ergibt das die Fläche des Integrals von 4 bis 5. Generell ausgedrückt ist das also

$$\int_a^c f(t)dt - \int_a^b f(t)dt = \int_b^c f(t)dt$$

, wobei $a \leq b \leq c$.

Nun wird die Gleichung (1) eingesetzt.

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t) dt \quad (2)$$

Laut dem Mittelwertsatz der Integralrechnung gibt es eine Zahl c in $[x_1, x_1 + \Delta x]$, sodass

$$\int_{x_1}^{x_1 + \Delta x} f(t) dt = f(c) * \Delta x \quad (3)$$

Nun wird die Gleichung (2) und (3) zusammengefügt und durch Δx dividiert

$$F(x_1 + \Delta x) - F(x_1) = f(c) * \Delta x \quad | : \Delta x$$

$$\frac{F(x_1 + \Delta x) - F(x_1)}{\Delta x} = f(c)$$

Auffallend ist, dass die linke Seite zu einem Differenzenquotienten umgeformt wurde. Wird nun $\lim_{\Delta x \rightarrow 0}$ angewandt, dann

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x_1 + \Delta x) - F(x_1)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c)$$

Und somit

$$F'(x_1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) \quad (4)$$

Nun fehlt nur noch $f(c)$.

Da $x_1 \leq c \leq x_1 + \Delta x$ ist und Δx gegen 0 läuft wird sich $c \rightarrow x_1$ nähern bis bei $\Delta x = 0$ auch $c = x_1$ ist, beziehungsweise $x_1 \leq c \leq x_1 + 0$ oder $x_1 = c = x_1$ ist.

Zusammenfassend ist also

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) = f(x_1) \quad (5)$$

Und somit, wenn man (4) und (5) zusammenfügt

$$F'(x_1) = f(x_1)$$

Eine andere Schreibweise wäre

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Damit ist der erste Satz der Differential- und Integralrechnung bewiesen. □

IV.2 Korollar

Satz IV.2.1.

Gegeben ist die in \mathbb{R} definierte, auf dem Intervall $[a, b]$ stetige Funktion f und F eine Stammfunktion von f im Intervall $[a, b]$, dann gilt

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Das Korollar erfordert Stetigkeit auf dem ganzen Intervall.

Beweis.

Sei F eine Stammfunktion von f mit Stetigkeit auf dem Intervall $[a, b]$, dann sei

$$G(x) = \int_a^x f(t)dt$$

Durch den ersten Beweis ist bewiesen, dass $G(x)$ eine Stammfunktion von f ist. Da $F'(x) - G'(x) = 0$ ist der Mittelwertsatz der Integralrechnung impliziert, dass $F(x) - G(x)$ eine konstante Funktion ist, das heißt es gibt eine Zahl c , so dass $G(x) = F(x) + c$ für alle x in $[a, b]$. Es gilt also

$$F(a) + c = G(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$$

Das bedeutet, dass $c = -F(a)$. In anderen Worten, $G(x) = F(x) - F(a)$, und somit

$$\int_a^b f(t)dt = G(b) = F(b) - F(a)$$

Somit ist das Korollar des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung bewiesen. □

IV.3 Zweiter Teil

Genutzte Quellen: [Spivak 1980, vgl.]

Satz IV.3.1.

Dieser Teil wird manchmal Zweiter Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung oder das Newton-Leibniz-Axiom genannt.

Gegeben ist die in \mathbb{R} definierte Funktion f auf dem geschlossenen Intervall $[a, b]$, und F , eine Stammfunktion von f auf dem Intervall (a, b)

$$F'(x) = f(x)$$

Wenn f auf dem Intervall $[a, b]$ Riemann-integrierbar ist, dann

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Der zweite Teil ist aussagekräftiger als das Korollar, da er nicht voraussetzt, dass f eine stetige Funktion ist.

Wenn eine Stammfunktion F von f existiert, dann gibt es unendlich viele unterschiedliche Stammfunktionen die erlangt werden, indem eine Konstante, oftmals c genannt, an F addiert wird. Außerdem existiert laut dem ersten Teil eine Stammfunktion F , sobald f kontinuierlich ist, was durch das nicht Vorhandensein einer Stammfunktion von Funktionen, wie e^{-x^2} widerlegt ist.

Beweis.

Dies ist ein Grenzbeweis durch die Riemann-Summe. Sei f Riemann-integrierbar auf dem Intervall $[a, b]$ und lasse f eine Stammfunktion F auf dem Intervall $[a, b]$ zu. $F(b) - F(a)$. Seien $x_0 \cdots x_n$, sodass

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-2} < x_{n-1} < x_n = b$$

Daraus lässt sich erschließen, dass

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0)$$

Nun wird jedes $F(x_k)$ zusammen mit seinem negativen gegenpart addiert, sodass die daraus ergebende menge folgendes ergibt

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= F(x_n) + [-F(x_{n-1}) + F(x_{n-1})] + [-F(x_{n-2}) + F(x_{n-2})] + \cdots + \\ &\quad [-F(x_2) + F(x_2)] + [-F(x_1) + F(x_1)] - F(x_0) \\ &= [F(x_n) - F(x_{n-1})] + [F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})] + \cdots + [F(x_2) - F(x_1)] + [F(x_1) - F(x_0)] \end{aligned}$$

Die obere Menge kann folgendermaßen zusammengefasst werden

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F(x_k) - F(x_{k-1})] \quad (6)$$

Als nächstes wird der Mittelwertsatz der Integralrechnung benötigt. Kurz zusammengefasst:

Sei F stetig auf dem geschlossenen Intervall $[a, b]$ und differenzierbar auf dem offenen Intervall (a, b) , dann existiert ein c im Intervall (a, b) , sodass

$$F'(c) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$$

Daraus folgt

$$F'(c)(b - a) = F(b) - F(a)$$

F ist differenzierbar auf dem Intervall $[a, b]$ und somit auch differenzierbar auf dem Intervall $[x_{k-1}, x_k]$. Laut dem Mittelwertsatz der Integralrechnung ergibt sich somit

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = F'(c_k)(x_k - x_{k-1}) \quad (7)$$

Nun wird das Ergebnis von (7) in die Gleichung von (6) eingesetzt

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [F'(c_k)(x_k - x_{k-1})]$$

Vorausgesetzt wird, dass $F'(c_k) = f(c_k)$ ist. Außerdem kann einfachheitshalber $(x_k - x_{k-1})$ als Δx des Teils k geschrieben werden, also Δx_k

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n [f(c_k)(\Delta x_k)] \quad (8)$$

Mit dem oberen Ausdruck in der Summe wird die Fläche eines Rechtecks mit der Breite Δx und Höhe $f(c_k)$ beschrieben. Diese Fläche ist eine Annäherung der Fläche unter dem Graphen f jeder Partition. Jede einzelne Partition wird nun addiert, um sich der Fläche unter der Funktion f im Intervall $[a, b]$ anzunähern. Je kleiner Δx wird, desto genauer spiegeln die Rechtecke die Fläche unter der Funktion wieder, da es weniger Unterer/Überschuss gibt. Wenn in der Theorie $\Delta x = 0$ erreicht ist, dann würde die exakte Fläche herauskommen. Da in dem Falle die Höhe von f aber immer mit 0 addiert werden würde, also 0 herauskommen würde, und b niemals erreicht werden würde ist dies in der Praxis natürlich nicht umzusetzen. Deswegen wird Limes $\Delta x_k \rightarrow 0$ angewendet. Dies bewirkt, dass die Partitionen gegen 0 gehen und die Genauigkeit des Intervalls immer besser wird, da es immer weniger Ungenauigkeiten gibt.

$$\lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} F(b) - F(a) = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k)(\Delta x_k)]$$

Da $F(b) - F(a)$ kein Δx_k beinhaltet bleibt diese Seite der Gleichung unverändert bestehen und somit bleibt

$$F(b) - F(a) = \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n [f(c_k)(\Delta x_k)]$$

Die rechte Seite der Gleichung definiert das Integral von f von a bis b . Somit ergibt sich

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

Somit ist der Zweite Teil des Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung bewiesen. □

V Fazit

joa, is halt toll gewesen, nech?

Literaturverzeichnis

- Bressoud, David Marius (2011). „Historical reflections on teaching the fundamental theorem of integral calculus.“ In: *The American Mathematical Monthly*, S. 99–115.
- Koballa, Winfried (2000). „Einführung in die Analysis I“. In: S. 168–175.
- Reis, Timo und Kai Rothe (2015). *Mittelwertsatz der Integralrechnung*. Zugegriffen: 14-03-2022. URL: https://www.math.uni-hamburg.de/teaching/export/tuhh/cm/a2/15/vorlesungen/vl6_dv.pdf.
- Sanderson, Grant (2017). *Integration and the fundamental theorem of calculus*. Zugegriffen: 10-03-2022. URL: <https://www.3blue1brown.com/lessons/integration>.
- Spivak, Michael (1980). „Calculus (2nd ed.)“ In: *Publish or Perish Inc.*

VI Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre, dass ich die Facharbeit ohne fremde Hilfe angefertigt und nur die im Literaturverzeichnis angeführten Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

(Unterschrift)

(Datum)