


PROPRIÉTÉ TÉLÉSIÈGE 6 S.E.C.



Délimitation des milieux humides et hydriques, Lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



LM Landry - Services professionnels en environnement

Janvier 2022
N/Réf. : 210423


Propriété Télésiège 6 S.E.C.

112, rue du Languedoc
Saint-Lambert (Québec) J4S 1T2

*Délimitation des milieux humides et hydriques,
Lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton
(N/Réf. : 210423)*

Rapport technique - Janvier 2022

Préparé par :


Louis-Marie Landry, biol. abq 2027

Botaniste-écologiste sénior



Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Contenu

1.	INTRODUCTION.....	2
1.1.	Mise en contexte et objectifs.....	2
1.2.	Localisation de la zone d'étude.....	2
2.	MÉTHODOLOGIE.....	4
2.1.	Consultation des données existantes.....	4
2.2.	Caractérisation des espaces boisés.....	5
2.3.	Caractérisation floristique	5
2.4.	Caractérisation faunique	5
2.5.	La taxinomie	6
2.6.	Identification des lits d'écoulement.....	6
2.7.	Identification, délimitation et caractérisation des milieux humides.....	6
2.8.	Limitations relatives à la caractérisation du milieu naturel.....	7
3.	RÉSULTATS – COMPOSANTES PHYSIQUES DES HABITATS	8
3.1.	Topographie.....	8
3.2.	Géologie, géomorphologie et pédologie.....	8
3.3.	Hydrologie et régime hydrique	8
4.	RÉSULTATS – COMPOSANTES FLORISTIQUES	9
4.1.	Peuplements forestiers	9
4.2.	Associations végétales – groupes élémentaires	11
4.3.	Espèces floristiques rencontrées.....	11
5.	RÉSULTATS – MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES	14
6.1.	Milieux hydriques.....	14
6.1.1.	Ligne des hautes eaux et bandes de protection riveraines	14
6.2.	Milieux humides.....	14
6.2.1.	Les milieux humides potentiels et présumés.....	15
6.2.2.	Les milieux humides réels	16
6.2.3.	Types de milieux humides	17
6.3.	Bandes de protection riveraines	18
6.	CONCLUSION	21
7.	RÉFÉRENCES CITÉES OU CONSULTÉES	22

1. INTRODUCTION

1.1. Mise en contexte et objectifs

Nous avons été mandatés par la firme *Propriété Télésiège 6 S.E.C.* afin de vérifier la présence de milieux humides et hydriques sur les lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944 du cadastre rénové du Québec à Sutton, et le cas échéant, de les délimiter et d'en identifier le type. Cette vérification visait notamment à rencontrer les exigences précisées à la réglementation municipale et provinciale à l'égard du potentiel de développement desdits lots par rapport aux milieux humides et hydriques.

L'objectif du mandat consistait donc à vérifier la présence de milieux humides et hydriques selon les guides applicables et pertinents du *ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques* (MELCC), soit les suivants :

- *Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional;*
- *Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains;*
- *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;*
- *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Note explicative sur la ligne des hautes eaux : la méthode botanique experte.*

Le mandat consistait donc à documenter et à décrire sommairement les conditions abiotiques et biotiques des habitats, dont la topographie, la pédologie, l'hydrologie, les milieux humides et hydriques ainsi que les associations végétales. Dans ce contexte, une visite de terrain a été effectuée le 27 avril 2021. Cette visite initiale a été suivie d'une seconde visite de terrain effectuée le 13 septembre 2021. Le présent rapport technique fait état des observations notées lors de ces visites.

1.2. Localisation de la zone d'étude

La zone d'étude est constituée des lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944 du cadastre rénové du Québec à Sutton, lesquels couvrent une superficie d'environ 10,67 hectares. Le centre approximatif de la zone d'étude correspond aux coordonnées géographiques suivantes : 45° 06' 26" Nord et 72° 35' 53" Ouest.

Cette zone d'étude est accessible par la rue Maple et par le chemin Poissant. Le lot 4 848 919 est circonscrit au nord et à l'est par la rivière Sutton, au sud par le chemin Poissant et à l'ouest par un lot résidentiel. Le lot 4 848 596 est circonscrit au nord et à l'est par le chemin Poissant, au sud par la rue Maple et à l'est par des terrains résidentiels. Enfin, le lot 4 847 944 est circonscrit au nord par la rue Maple, à l'est par un

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

parc de maisons mobiles associées à la rue de la Granuleuse, et au sud-ouest par des résidences associées au chemin des Pinsons.

Les lots visés sont illustrés sur l'extrait suivant de la cartographie interactive du site Internet de la *Commission sur la protection du territoire agricole du Québec* (CPTAQ).



Figure 1. Extrait du site Internet de la CPTAQ illustrant les lots visés.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Consultation des données existantes

Tout d'abord, les données existantes concernant les caractéristiques environnementales de la zone d'étude ont été consultées. Cela comprend une revue de la littérature des composantes écologiques de la zone d'étude. Les sources de données consultées sont présentées ci-après et dans la section portant sur les références.

Consultation des cartes écoforestière, pédologique et topographique

Les dernières versions des cartes suivantes, à l'échelle de 1 : 20 000, ont été consultées.

- ☒ Cartes écoforestières du MRNF
Feuillet 31H02SE, 4^e et 5^e programmes d'inventaire.
- ☒ Cartes pédologiques (IRDA)
Feuillet 31H02102 (2008) – Carte pédologique de l'*Institut de recherche et de développement en agroenvironnement* (IRDA).
- ☒ Cartes topographiques (MRNF et Toporama)
Feuillet 31H02-200-0102 (2003)
- ☒ Données géomatiques (CPTAQ)
Les données géomatiques de la *Commission de protection du territoire agricole* (CPTAQ, 2021) ont été consultées, notamment en regard des classes et sous-classes de sol et du potentiel acéricole.
- ☒ Données géomatiques du *ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec* (MAPAQ)
La carte interactive *Info-sols.ca* du MAPAQ a été consultée.

Consultation des photographies aériennes et d'images satellitaires

- ☒ Images satellites de Google Earth Pro
Les images satellitaires des années 1985 à 2015, disponibles sur Google Earth Pro, ont été consultées. La disponibilité des images satellitaires correspondant aux périodes printanière, estivale et automnale permet de distinguer diverses caractéristiques, dont la distribution

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

des peuplements feuillus et résineux, la dominance des groupes d'espèces et la présence potentielle de milieux humides et hydriques.

À l'aide des informations consultées, une photo-interprétation a été effectuée afin d'identifier les types d'habitats. Cette photo-interprétation a permis d'avoir une vue d'ensemble des habitats environnants, dont les cours d'eau et les milieux humides *potentiels*.

Consultation des données des milieux humides potentiels/présumés

Les données cartographiques et géomatiques des milieux humides actuels et potentiels ont été consultées d'après les sources suivantes :

- ☒ Données géomatiques de la *Base de données topographiques du Québec* (BDTQ) ;
- ☒ Carte interactive des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec;
- ☒ Carte interactive de l'Inventaire canadien des milieux humides (ICMH).

2.2. Caractérisation des espaces boisés

Les peuplements forestiers recoupant les lots visés ont été consultés en fonction de la dernière version de la carte écoforestière ainsi que selon les photographies aériennes et les images satellitaires. Les peuplements forestiers ont ensuite été vérifiés sommairement lors de la visite de terrain.

2.3. Caractérisation floristique

Aucun inventaire floristique détaillé n'a été effectué dans le cadre de la présente. Toutefois, la visite de terrain a permis de dresser la liste des principales espèces rencontrées et de décrire sommairement les associations végétales présentes. Les photographies présentées en annexe permettent de voir les principales caractéristiques des associations végétales considérées représentatives.

2.4. Caractérisation faunique

Aucun inventaire faunique n'a été réalisé dans le cadre de la présente.

2.5. La taxinomie

Le système de classification des espèces (la taxinomie) utilisé pour nommer les espèces floristiques provient de VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada (Brouillet et coll., 2010+).

2.6. Identification des lits d'écoulement

Tous les cours d'eau présents dans la zone d'étude, le cas échéant, et qui correspondent à la définition de cours d'eau de la *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables* (MELCC, 2015) ont été localisés par à l'aide de ruban forestier et à l'aide d'un GPS de marque Trimble, modèle TDC600, muni d'un récepteur R2 d'une précision maximale de $\pm 0,5$ m. Les lits d'écoulement ont été caractérisés en fonction du document de référence suivant, lequel est présenté en annexe :

- ☒ MELCC. 2015. *Identification et délimitation des milieux hydriques*.

2.7. Identification, délimitation et caractérisation des milieux humides

Les milieux humides ont été identifiés, délimités et caractérisés au type de milieu en accord avec les critères biophysiques pertinents rencontrés (botanique, hydrologique et pédologique), suivant les critères indiqués dans les documents de référence suivants :

- ☒ MDDELCC. 2015. *Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional*;
- ☒ MDDELCC. 2015. *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*.
- ☒ MDDEP. 2012. *Les milieux humides et l'autorisation environnementale*.
- ☒ MDDEP. 2008, version révisée 2015. *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, Note explicative sur la ligne naturelle des hautes eaux : la méthode botanique experte*.

Identification des types de milieux humides

- ☒ Les types de milieux humides rencontrés ont été caractérisés selon les classes étang, marais, marécage et tourbière.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Délimitation des milieux humides

- ☑ Les milieux humides ont été délimités en fonction de la rencontre des indices topographiques, hydrologiques, pédologiques et biologiques.

- ☑ *Sondages pédologiques*

Des sondages pédologiques ont été effectués à l'aide d'une tarière hollandaise pour mesurer l'épaisseur déterminante de tourbe qui permet d'identifier la présence d'une tourbière (30 cm et plus). Pour ce qui est des sols minéraux, des sondages ont été effectués afin de déceler la présence de mouchetures et/ou d'une matrice gleyifiée, et pour vérifier la texture des sols.

- ☑ *Délimitation par GPS*

Les limites des milieux humides ont été localisées avec un GPS de marque Trimble, modèle TDC600, muni d'un récepteur R2 ayant une précision planimétrique de $\pm 0,5$ m. L'habitat a été photographié aux points GPS représentatifs. Les points d'échantillonnage ont été positionnés aux endroits représentatifs. Comme pour la LNHE, des rubans forestiers bleus ont été attachés à la végétation à l'endroit des points GPS correspondant à la limite des milieux humides.

2.8. Limitations relatives à la caractérisation du milieu naturel

Le présent rapport a été rédigé en fonction des informations disponibles lors de sa rédaction et des observations notées lors des visites de terrain effectuées le 27 avril et le 13 septembre 2021. Cela étant dit, nous invitons le lecteur à garder à l'esprit que toute étude, aussi détaillée qu'elle soit, représente un portrait simplifié de l'écosystème, constitué d'éléments dynamiques, en interaction et en évolution, et dont les éléments, les structures et les fonctions varient dans le temps et dans l'espace. Les données écologiques présentées dans ce rapport représentent donc un portrait « instantané » du milieu naturel.

3. RÉSULTATS – COMPOSANTES PHYSIQUES DES HABITATS

3.1. Topographie

Sur le plan topographique, les lots visés sont généralement inclinés vers le nord-ouest, soit vers la rivière Sutton.

3.2. Géologie, géomorphologie et pédologie

Selon les données pédologiques, les dépôts de surface de l'aire visée incluent des sols de la série Saint-François loam sableux en bas de pente (lot 4 848 919) et de la série Blandford loams phase mince en haut de pente (lots 4 848 596 et 4 847 944). La visite de terrain a permis de valider la présence de ces types de sols, mais aussi d'affleurements rocheux, notamment dans la partie est du lot 4 848 596.

3.3. Hydrologie et régime hydrique

Les cartes topographique, pédologique et écoforestière consultées permettent de noter la présence de la rivière Sutton à la limite nord du lot 4 848 919. La visite de terrain permet de valider la présence de ce cours d'eau (CE-01). La visite de terrain a aussi permis de noter la présence de quelques autres lits d'écoulement, dont un fossé et des cours d'eau intermittents (CE-02, CE-03 et CE-04) dans la partie est du lot 4 848 596.

La visite de terrain a permis de constater certaines résurgences et écoulement latéral donnant naissance à des milieux humides et à des cours d'eau intermittents. Il appert que les eaux percolent dans les dépôts de surface jusqu'à ce qu'elles rencontrent le socle rocheux sous-jacent, où les écoulements émergent sous forme de sources, lesquelles alimentent notamment quelques anciens puits de surface, dont la résidence du 2342, chemin Poissant.

Les données de la CPTAQ indiquent des limitations de sous-classes R et T relatives au potentiel des sols. La sous-classe R (proximité de la roche-mère consolidée) correspond aux sols où la profondeur de la roche-mère consolidée à moins de 100 cm (1 m) de la surface réduit la capacité de rétention en eau du sol et la profondeur accessible aux racines. La proximité de la roche-mère, combinée aux micro-dépressions sur le plan de la topographie sont des facteurs favorables à un excès d'eau dans les dépressions, ce qui à son tour favorise le potentiel de développement de milieux humides.

4. RÉSULTATS – COMPOSANTES FLORISTIQUES

4.1. Peuplements forestiers

Selon les données écoforestières de la carte interactive du MFFP, disponible sur Internet, divers peuplements écoforestiers recoupent la zone d'étude, lesquels sont décrits sommairement ci-après. Les peuplements forestiers sont présentés sur la carte en annexe de la présente étude.

1 : Peuplements forestiers sur le lot 4 848 919

Dans la partie nord du site, au nord du chemin Poissant et jusqu'à la rivière Sutton, trois peuplements feuillus (F) recoupe le lot 4 848 919, incluant deux érablières à érable rouge (ERFT) et une bétulaie jaune à érable rouge (BJER).

Ces peuplements sont dominés par l'érable rouge (ER), l'érable à sucre (EO), le bouleau jaune (BJ) et des feuillus d'essences indéterminées et tolérantes à l'ombre (FT).

Ces jeunes peuplements de moins de 80 ans (JIN) ont des classes de densité de 85 % à 95 % (A) et de hauteur de 17 m (2) à 22 m et plus (1).

Les peuplements reposent sur un dépôt de surface de type fluvio-glaciaire, pro-glaciaire, delta fluvio-glaciaire, de drainage modéré avec drainage latéral.

Le type écologique de la végétation potentielle des peuplements écoforestiers est soit l'érablière à tilleul (FE2) sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage xérique ou mésique (FE21) ou sur station au dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique (FE22) ou soit la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique (MJ14).

Comme le précise la description écoforestière, on rencontre un drainage latéral, lequel émerge en bas de pente et donne lieu à quelques milieux humides de type marécage arborescent.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

2 : Peuplements forestiers sur le lot 4 848 596

Sur le lot 4 848 596 localisé au sud du chemin Poissant et au nord de la rue Maple, quatre peuplements écoforestiers recoupent la superficie du lot, incluant trois peuplements feuillus et un peuplement de résineux.

Les peuplements feuillus incluent principalement l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau jaune, les feuillus tolérants indéterminés. Le peuplement résineux est caractérisé par une plantation de résineux indéterminés, bien que la visite de terrain ait pu permettre de constater qu'il s'agit de pin rouge.

Ces jeunes peuplements de moins de 80 ans (JIN) ont des classes de densité de 65 % à 75 % (B) et de 85 % à 95 % (A) et de classes de hauteur de 7 à 11 m (4), de 17 à 21 m (2) et de 22 m et plus (1).

Ces peuplements sont rencontrés sur un dépôt de surface d'origine glaciaire, sans morphologie particulière, constitué de till indifférencié, et de drainage modéré.

Le type écologique de la végétation potentielle est soit l'érablière à tilleul sur station au dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique (FE22) ou soit la bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt minéral de mince à épais, de texture grossière, de drainage subhydrique (MJ14).

3 : Peuplements forestiers sur le lot 4 847 944

Sur le lot 4 847 944, localisé au sud de la rue Maple, trois peuplements écoforestiers recoupent la superficie du lot, incluant deux peuplements feuillus et un peuplement de résineux.

Les peuplements feuillus incluent principalement l'érable à sucre, l'érable rouge, ainsi que des feuillus tolérants indéterminés. Le peuplement résineux est caractérisé par une plantation de résineux, soit le pin rouge (identifié lors des visites de terrain).

Ces jeunes peuplements de moins de 80 ans (JIN) ont des classes de densité de 65 % à 75 % (B) et de 85 % à 95 % (A) et de classes de hauteur de 7 à 11 m (4), de 17 à 21 m (2) et de 22 m et plus (1).

Ces peuplements sont rencontrés sur un dépôt de surface d'origine glaciaire, sans morphologie particulière, constitué de till indifférencié, et de drainage modéré.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Le type écologique de la végétation potentielle est soit l'érablière à tilleul sur station au dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne, de drainage mésique (FE22).

4.2. Associations végétales – groupes élémentaires

De manière générale, les milieux terrestres de la zone sont dominés par l'érable à sucre, accompagné du hêtre à grandes feuilles, de la pruche du Canada et du peuplier à grandes dents. Les espèces herbacées typiques incluent le framboisier sauvage, la fougère-aigle de l'Est, le maianthemum du Canada, l'érythrone d'Amérique et la dryoptère spinuleuse.

Par contraste, les milieux humides sont dominés par l'érable rouge, le peuplier baumier, l'aulne rugueux, le houx verticillé et le némopanthé mucroné, le cornouiller stolonifère et pour la strate herbacée, plus particulièrement par l'onoclée sensible. Quelques autres espèces indicatrices des milieux humides incluent des gadelliers, et à l'occasion, la matteuccie fougère à l'autruche et la dentaire à deux feuilles.

4.3. Espèces floristiques rencontrées

Les espèces floristiques rencontrées sur les lots visés sont présentées dans les tableaux suivants. La troisième colonne des tableaux suivants indique l'affinité des espèces floristiques pour les milieux humides selon le MELCC (2015), où la codification est définie de la manière suivante : NI : espèce non indicative des milieux humides, FACH : facultative des milieux humides, OBL : obligée des milieux humides ou NT : espèce non traitée dans les documents du MELCC. Les espèces non traitées (NT) sont considérées non indicatrices des milieux humides, et par conséquent indicatrices des milieux terrestres.

Tableau 1. Liste des espèces floristiques arborescentes rencontrées

Nom latin	Nom commun	Affinité
<i>Abies balsamea</i> (Linnaeus) Miller	sapin baumier	NI
<i>Acer pensylvanicum</i> Linnaeus	érable de Pennsylvanie	NI
<i>Acer rubrum</i> Linnaeus	érable rouge	FACH
<i>Acer saccharum</i> Marshall	érable à sucre	NI
<i>Betula alleghaniensis</i> Britton	bouleau jaune	NI
<i>Betula papyrifera</i> Marshall	bouleau à papier	NI
<i>Fagus grandifolia</i> Ehrhart	hêtre à grandes feuilles	NI
<i>Fraxinus americana</i> Linnaeus	frêne blanc	NI
<i>Fraxinus nigra</i> Marshall	frêne noir	FACH
<i>Larix laricina</i> (Du Roi) K. Koch	mélèze laricin	FACH
<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	épinette blanche	NI

LM Landry - Services professionnels en environnement

3-7195, Léonard-de-Vinci, Montréal (Québec) H2A 2N8 ; 418-575-7557 ; LM.Landry@videotron.ca

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Nom latin	Nom commun	Affinité
<i>Pinus resinosa</i> Solander ex Aiton	pin rouge	NI
<i>Populus balsamifera</i> Linnaeus	peuplier baumier	FACH
<i>Populus deltoides</i> subsp. <i>deltoides</i> W. Bartram ex Marshall	peuplier deltoïde	FACH
<i>Populus grandidentata</i> Michaux	peuplier à grandes dents	NI
<i>Populus tremuloides</i> Michaux	peuplier faux-tremble	NI
<i>Tilia americana</i> Linnaeus	tilleul d'Amérique	NI
<i>Tsuga canadensis</i> (Linnaeus) Carrière	pruche du Canada	NI

Tableau 2. Liste des espèces floristiques arbustives rencontrées

Nom latin	Nom commun	Affinité
<i>Alnus incana</i> subsp. <i>rugosa</i> (Du Roi) R.T. Clausen	aulne rugueux	FACH
<i>Amelanchier</i> sp.	amélanchier sp.	NI
<i>Cornus sericea</i> Linnaeus	cornouiller hart-rouge	FACH
<i>Corylus cornuta</i> subsp. <i>cornuta</i> Marshall	noisetier à long bec	NI
<i>Crataegus</i> sp.	Aubépine sp.	NI
<i>Ilex mucronata</i> (Linnaeus) M. Powell, V. Savolainen & S. Andrews	némopanthé mucroné	FACH
<i>Ilex verticillata</i> (Linnaeus) A. Gray	houx verticillé	FACH
<i>Rubus idaeus</i> subsp. <i>strigosus</i> (Michaux) Focke	framboisier sauvage	NI
<i>Spiraea alba</i> var. <i>latifolia</i> (Aiton) Dippel	spirée à larges feuilles	NI
<i>Taxus canadensis</i> Marshall	if du Canada	NI

Tableau 3. Liste des espèces floristiques herbacées rencontrées

Nom latin	Nom commun	Affinité
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> Linnaeus	petite herbe à poux	NT
<i>Aralia nudicaulis</i> Linnaeus	aralie à tige nue	NI
<i>Arisaema triphyllum</i> subsp. <i>triphyllum</i> (Linnaeus) Schott	arisème petit-prêcheur	FACH
<i>Athyrium filix-femina</i> var. <i>angustum</i> (Willdenow) G. Lawson	athyrie étroite	NI
<i>Bidens frondosa</i> Linnaeus	bident feuillu	FACH
<i>Calamagrostis canadensis</i> var. <i>canadensis</i> (Michaux) Palisot de Beauvois	calamagrostide du Canada	FACH
<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michaux) T. Moore	dennstaedtie à lobules ponctués	NI
<i>Doellingeria umbellata</i> var. <i>umbellata</i> (Miller) Nees	aster à ombelles	FACH
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs	dryoptère spinuleuse	NI
<i>Epilobium palustre</i> Linnaeus	épilobe palustre	OBL
<i>Equisetum sylvaticum</i> Linnaeus	prêle des bois	FACH
<i>Eurybia macrophylla</i> (Linnaeus) Cassini	aster à grandes feuilles	NI
<i>Fragaria virginiana</i> subsp. <i>virginiana</i> Miller	fraisier des champs	NI
<i>Geum macrophyllum</i> var. <i>macrophyllum</i> Willdenow	benoîte à grandes feuilles	FACH
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman	gymnocarpe du chêne	NI
<i>Hylotelephium telephium</i> (Linnaeus) H. Ohba	orpin pourpre	NT

LM Landry - Services professionnels en environnement

3-7195, Léonard-de-Vinci, Montréal (Québec) H2A 2N8 ; 418-575-7557 ; LM.Landry@videotron.ca

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Nom latin	Nom commun	Affinité
<i>Impatiens capensis</i> Meerburgh	impatiente du Cap	FACH
<i>Lysimachia nummularia</i> Linnaeus	lysimaque nummulaire	FACH
<i>Maianthemum canadense</i> subsp. <i>canadense</i> Desfontaines	maïanthème du Canada	NI
<i>Matteuccia struthiopteris</i> var. <i>pennsylvanica</i> (Willdenow) C.V. Morton	matteucie fougère-à-l'autruche d'Amérique	FACH
<i>Oclemena acuminata</i> (Michaux) Greene	aster acuminé	NI
<i>Onoclea sensibilis</i> Linnaeus	onoclée sensible	FACH
<i>Osmunda claytoniana</i> Linnaeus	osmonde de Clayton	NI
<i>Osmunda regalis</i> var. <i>spectabilis</i> (Willdenow) A. Gray	osmonde royale d'Amérique	FACH
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (Linnaeus) C. Presl	osmonde cannelle	FACH
<i>Oxalis stricta</i> Linnaeus	oxalide d'Europe	NI
<i>Phegopteris connectilis</i> (Michaux) Watt	phégoptère du hêtre	NI
<i>Prunella vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Linnaeus	brunelle commune	NI
<i>Pteridium aquilinum</i> var. <i>latiusculum</i> (Desvaux) Underwood ex A. Heller	fougère-aigle de l'Est	NI
<i>Rubus pubescens</i> Rafinesque	ronce pubescente	FACH
<i>Scirpus atrovirens</i> Fernald	scirpe à ceinture noire	OBL
<i>Setaria pumila</i> subsp. <i>pumila</i> (Poir.) Roemer & Schultes	sétaire glauque	NT
<i>Solidago rugosa</i> subsp. <i>rugosa</i> var. <i>rugosa</i> P. Miller	verge d'or rugueuse	NI
<i>Symphyotrichum puniceum</i> var. <i>puniceum</i> (Linnaeus) Á. Löve & D. Löve	aster ponceau	FACH
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wiggers	pissenlit officinal	NI
<i>Thelypteris noveboracensis</i> (Linnaeus) Nieuwland	thélyptère de New York	NI
<i>Tussilago farfara</i> Linnaeus	tussilage pas-d'âne	NT
<i>Veratrum viride</i> var. <i>viride</i> Aiton	vérâtre vert	FACH
<i>Veronica officinalis</i> Linnaeus	véronique officinale	NI

5. RÉSULTATS – MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES

6.1. Milieux hydriques

La vérification des données topographiques et hydrologiques permet de déceler la présence d'un cours d'eau à la limite nord du lot 4 848 919, identifié comme la rivière Sutton (CE-01). La visite de terrain a permis de constater la présence de ce cours d'eau à débit permanent. Par ailleurs, quelques autres cours d'eau à débit intermittent ont été identifiés dans la partie est du lot 4 848 596 (CE-02, CE-03 et CE-04). Ces derniers résultent de l'émergence des eaux souterraines de bas de pente. Ils sont illustrés sur l'extrait de Google Earth dans la section suivante portant sur les milieux humides, ainsi que sur les cartes produites et présentées en annexe.

6.1.1. Ligne des hautes eaux et bandes de protection riveraines

Lors de la visite de terrain, la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) a été localisée le long de la rive gauche de la rivière Sutton, ainsi que le long des cours d'eau à débit intermittent. Cette dernière a été localisée en fonction des indicateurs topographiques, hydrologiques et botaniques. En ce sens, la LNHE correspond à la limite inférieure de la litière forestière, ou autrement dit, à la limite supérieure de la litière forestière lessivée. Elle correspond aussi à l'endroit d'un changement abrupt de la topographie en raison de l'érosion dû au passage de l'eau.

Dans une moindre mesure, dans le cas de la rivière Sutton, la LNHE correspond à l'arrêt la végétation terrestre en direction du cours d'eau. Des rubans forestiers bleus ont été attachés à la végétation considérée comme correspondant à l'endroit de la LNHE. Dans le cas des endroits où l'érosion a créé des falaises, les rubans forestiers ont été attachés en haut de ces falaises puisqu'il était impossible de les positionner verticalement à l'endroit de la LNHE. Le positionnement horizontal des rubans est toutefois considéré comme représentatif de la localisation de la LNHE.

6.2. Milieux humides

Cette section présente les résultats de l'analyse des données concernant les milieux humides *potentiels*, laquelle est suivie des résultats des milieux humides *réels*. Ces derniers ont été délimités et caractérisés lors de la visite de terrain.

6.2.1. Les milieux humides potentiels et présumés

Dans un premier temps, nous avons consulté les sources de données identifiées dans la section du présent rapport portant sur la méthodologie : les cartes écoforestières, pédologiques et topographiques, les données géomatiques ainsi que les photos aériennes et les images satellitaires. Les résultats de notre analyse préliminaire d'identification des milieux humides *présumés* sont présentés ci-après et sont suivis par les résultats des milieux humides *réels* validés et délimités lors de la visite de terrain.

Consultation de cartes écoforestière, pédologique et topographique

D'après la carte écoforestière consultée, les polygones écoforestiers recoupant la zone d'étude sont caractérisés par un drainage de bon à modéré. Habituellement, ces types de drainage ne sont pas associés à la présence de milieux humides. Toutefois, la présence de l'érable rouge dans certains des peuplements soulève la possibilité de présence *potentielle* de milieux humides.

Par ailleurs, la présence de drainage latéral associé au polygone écoforestier recoupant le lot 4 848 919 soulève également la possibilité d'un milieu humide de bas de pente à l'endroit de ce lot. Cette présence d'eau est d'ailleurs favorisée par la présence de dépôt de surface plutôt mince (moins de 1 m) sur une roche-mère consolidée, notamment à l'endroit du polygone écoforestier recoupant les lots 4 848 596 et 4 847 944.

Par contraste, les données géomatiques de la CPTAQ (2021) ne permettent pas de soulever l'hypothèse de la présence *potentielle* de milieu humide en raison de l'absence de la sous-classe W, indicatrice de limitations relatives à un excès d'eau.

Toutefois, ces données topographiques, pédologiques et hydrographiques ne permettent pas de préciser la localisation des milieux humides *potentiels* susceptibles d'être présents en raison des conditions environnementales potentiellement favorables.

Consultation des photographies aériennes et des images satellitaires

Les photographies aériennes et les images satellitaires consultées ne permettent pas d'observer de milieu humide. Ces données permettent toutefois de constater la présence de divers peuplements qui pourraient être associés à la présence de milieux humides, notamment la présence de résineux dans la partie est du lot 4 848 596 ainsi qu'à l'endroit des plantations de résineux à l'extrémité ouest de ce même lot et du lot 4 847 944, comme il peut être constaté dans l'extrait de l'image satellitaire du 22 avril 2013 présentée ci-dessous.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Consultation des données géomatiques des milieux humides potentiels

D'après les données de 2009-2020 de *Canards Illimités Canada* (CIC) et du *ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques* (MELCC), notamment de la *Cartographie des milieux humides potentiels des régions habitées du sud du Québec*, un milieu humide potentiel de type marécage recouperait une partie du lot 4 848 919 de la zone d'étude. Le milieu humide potentiel a été ajouté sur l'extrait de l'image satellitaire suivante.



Photo 1. Image satellitaire de Google Earth du 22 avril 2013. Les polygones rouges représentent les trois lots visés. Le polygone jaune représente un milieu humide potentiel selon Canards Illimités Canada et le ministère de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC), 2020. Cartographie détaillée des milieux humides des secteurs habités du sud du Québec – Données du projet global.

6.2.2. Les milieux humides réels

Les milieux humides *réels* ont été identifiés et délimités en fonction de tous les critères pertinents et des méthodes préconisées par le MELCC. Les principaux indicateurs hydrologiques, pédologiques et biologiques rencontrés et ayant été utilisés pour délimiter les milieux humides sont les suivants :

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Indices hydrologiques :

☒ Saturé à <30 cm

☒ Litière noirâtre

☒ Feuilles tachées

Indices pédologiques :

☒ Mouchetures

☒ Drainage imparfait (4)

Indices biologiques :

☒ > 50 % d'hydrophytes

☒ Racines superficielles

☒ Racines hors-sol

6.2.3. Types de milieux humides

Les milieux humides rencontrés sont tous des milieux humides de type marécage arborescent. Ils sont tous des milieux humides isolés au sens de la *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous la ligne naturelle des hautes eaux. Par conséquent, ils ne bénéficient pas de bande de protection riveraine, bien que certains d'entre eux soient recoupés par la bande riveraine des cours d'eau à début intermittent et à débit régulier.

De manière générale, les polygones des milieux humides *réels* ne correspondent pas tout à fait au polygone du milieu humide *potentiel* tel qu'identifié par CIC et le MELCC (2020), comme c'est habituellement le cas, en raison des limitations relatives à la technologie de télédétection actuelle.

Les paragraphes suivants décrivent sommairement les milieux humides rencontrés. Le plan de localisation présenté en annexe indique la localisation et l'étendue de ces milieux humides dans la zone d'étude. L'annexe photographique permet de visualiser les caractéristiques de ces milieux humides.

Milieu humide sur le lot 4 848 919

Deux milieux humides isolés recoupent le lot 4 848 919. Le milieu humide MH-01 est d'une superficie d'environ 1 071 m² et le milieu humide MH-02 est d'une superficie de quelque 163 m². Ils sont caractérisés par la présence de dépressions noirâtres, de mouchetures à moins de 30 cm de la surface du sol et d'une strate herbacée caractéristique des milieux humides dominés par l'onoclée sensible. Des arbres surplombent ces deux milieux humides ce qui en fait des marécages. La strate arbustive est présente dans le MH-01, incluant l'aulne rugueux, le houx verticillé et le némopanthé mucroné, mais elle est absente dans le MH-02.

Les résultats de la délimitation des milieux humides sur le lot 4 848 919 sont présentés en annexe.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

Milieu humide sur le lot 4 848 596

Le lot 4 848 596 comprend deux milieux humides, identifiés MH-03 et MH-04. Le milieu humide MH-03 est de type marécage arborescent et couvre environ 1 778 m². Le milieu humide MH-04 est de type marécage arborescent et couvre environ 1 856 m².

Ces milieux humides sont caractérisés par la présence de résurgences, lesquelles sont parfois diffuses et forment des marécages arborescents en pentes. Aux endroits où l'écoulement latéral se concentre, celui-ci forme alors des cours d'eau à débit intermittent, avec un lit d'écoulement assez bien défini (CE-02, CE-03 et CE-04).

Les milieux humides du lot 4 848 596 sont caractérisés par des sols de surface saturés en eau à certaines périodes de l'année, par la présence de litière noirâtre, par la présence de mouchetures et leur strate herbacée est généralement dominé par l'onoclee sensible.

Les écoulements diffus émergent du sol et sont généralement restreint par le relief qui forment des creux entrecoupés de crêtes rocheuses qui en limite et concentre l'écoulement latéral, ce qui favorise le développement de milieux humides dans ces creux linéaires orientés vers le bas de pente.

Les résultats de la délimitation des milieux humides sur le lot 4 848 596 sont présentés en annexe.

6.3. Bandes de protection riveraines

En fonction de la réglementation provinciale, soit selon la *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables* (PPRLPI), puisque les pentes latérales des cours d'eau ont une pente moyenne de moins de 30 %, les bandes riveraines, mesurées perpendiculairement à la ligne des hautes eaux, ont une largeur de 10 m.

Toutefois, alors que le *Règlement de contrôle intérimaire 03-0315* de la MRC de Brome-Missisquoi concorde avec la PPRLPI de manière générale, il est toutefois précisé que si les lots sont subdivisés, la bande riveraine est automatiquement de 15 m. Par conséquent, puisque les lots 4 848 596 et 4 847 944 de la présente feront l'objet de subdivisions, la bande de protection riveraine applicable est de 15 m.

Comme le précise le dernier paragraphe de l'extrait du Règlement 03-0315 l'indique :

« 4.2 ÉLÉMENTS ASSUJETTIS

Les dispositions relatives aux rives et au littoral s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent ainsi qu'aux milieux humides.

4.3 MESURES RELATIVES AUX RIVES

4.3.1 Largeur de la rive

La largeur minimale de la rive à protéger est la suivante :

La rive a un minimum de 10 mètres :

- lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres :

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain, menant à la création d'un ou plusieurs lots, effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent règlement la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres. »

Par ailleurs, à la section 4.2 dudit Règlement 03-0315 de la MRC, il est précisé que les dispositions relatives aux rives et au littoral s'appliquent à tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent ainsi qu'aux milieux humides. Toutefois, à la section 2.5 du Règlement 03-0315 de la MRC, les milieux humides visés sont définies comme suit :

« Site avec ou sans lien hydrologique ayant une superficie de plus de 0,5 hectare qui est saturé d'eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. »

Or, les milieux humides sur les lots visés ont tous des superficies de moins de 0,5 hectares (MH-01 : 1 071 m², MH-02 : 163 m², MH-03 : 1 778 m², et MH-04 : 1 857 m²). Par conséquent, les bandes riveraines *applicables aux milieux humides*, selon

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

la réglementation de la MRC, ne s'appliquent pas aux milieux humides rencontrés sur les lots visés puisqu'ils ont une superficie moindre que celle définie à la section 2.5 dudit *Règlement*.

De plus, à la section 1.6 (Aire de protection des cours d'eau à l'extérieur des périmètres urbains) du chapitre 8 du *Règlement de zonage 115-2* de la Ville de Sutton, il est indiqué ce qui suit :

« 1.6 : Aire de protection des cours d'eaux à l'extérieur des périmètres urbains

Aucune construction principale ou accessoire ne peut être implantée à moins de 15 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux de tout cours d'eau situé hors des périmètres urbains. Les périmètres urbains sont ceux désigné au Plan d'urbanisme en vigueur. »

À cet effet, la carte 13 *Périmètres d'urbanisation Secteur Centre-ville* du Schéma d'aménagement révisé 2^e remplacement MRC Brome-Missisquoi (2008) permet de noter que les lots 4 848 596 et 4 847 944 sont dans le périmètre d'urbanisme « résidentiel » tandis que le lot 4 848 919 au nord du chemin Poissant et adjacent à la rivière Sutton est en dehors du périmètre d'urbanisation.

Par conséquent, en considération du *Règlement de zonage 115-2* de la Ville de Sutton, la bande de protection riveraine à conserver sur le lot 4 848 919 (en dehors du périmètre urbain), est de 15 m.

6. CONCLUSION

Dans le cadre d'un projet de développement, nous avons été mandatés par la firme *Propriété Télésiège 6 S.E.C.* afin de vérifier la présence de milieux humides et hydriques, et le cas échéant de les délimiter et de les caractériser sommairement.

Les visites de terrain du 27 avril et du 13 septembre 2021 ont permis d'identifier quatre cours d'eau (CE), dont la rivière Sutton (CE-01) à la limite nord du lot 4 848 919, ainsi que trois autres cours d'eau à débit intermittent (CE-02, CE-03 et CE-04) dans la partie est du lot 4 848 596. La ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) a été localisée le long de la rive gauche de la rivière Sutton, le long des rives droites et gauches des cours d'eau CE-02, CE-03 et CE-04.

Les visites de terrain ont permis de constater la présence de milieux humides de type marécage isolé. Les milieux humides sont identifiés MH-01, MH-02, MH-03 et MH-04 et ils ont une superficie de 1 071 m², 163 m², 1 778 m² et de 1 857 m², respectivement. Les milieux humides MH-01 et MH-02 sont localisés sur le lot 4 848 919. Les milieux humides MH-03 et MH-04 sont localisés dans la partie est du lot 4 848 596. Enfin, aucun milieu humide ou hydrique n'a été rencontré sur le lot 4 847 944.

D'après la *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*, en considération des pentes latérales de moins de 30 %, les bandes de protection riveraines applicables aux plans d'eau et aux cours d'eau ont une largeur de 10 m.

Toutefois, selon le *Règlement de contrôle intérimaire sur la gestion des eaux de ruissellement et le contrôle de l'érosion* n° 03-0315 de la MRC de Brome-Missisquoi, pour toute nouvelle subdivision de terrain effectuée après la date d'entrée en vigueur du règlement, la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres. Notre compréhension est à l'effet que les lots 4 848 596 et 4 847 944 seront subdivisés et une bande riveraine d'une largeur de 15 devra être conservée. Il est à noter que selon ledit Règlement de la MRC, les bandes riveraines s'appliquent aussi aux milieux humides de plus de 0,5 hectares. Considérant que les milieux humides sur les lots visés ont moins de 0,5 hectares, aucune bande de protection riveraine ne s'applique.

Par ailleurs, selon le *Règlement de zonage 115-2* de la Ville de Sutton, la bande de protection riveraine à conserver sur les lots en dehors du périmètre urbain est de 15 m. Puisque le lot 4 848 919 est en dehors du périmètre d'urbanisation, une bande riveraine de 15 m devra être conservée le long du cours d'eau sur ce lot.

Pour conclure, une bande de protection riveraine d'une largeur de 15 m devra être appliquée à l'ensemble des cours d'eau rencontrés sur les lots visés.

7. RÉFÉRENCES CITÉES OU CONSULTÉES

- Bazoge, A., D. Lachance et C. Villeneuve. 2015. *Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains*. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Direction de l'expertise en biodiversité et Direction de l'aménagement et des eaux souterraines, 64 pages + annexes.
- Braun-Blanquet, J. 1965. *Plant sociology: the study of plant communities*. (Traduction anglaise de la 2^e édition) (Traduit, révisé et édité par C. D. Fuller et H. S. Conard) Hafner, Londres. 439 p.
- Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle et P. Desmet. 2010+. *VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada*.
- Canards Illimités Canada et ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2009-2020. *Carte interactive des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec*. Données du projet global [ESRI Canada], Québec (Québec).
- Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 2021. *Démeter* [carte interactive].
- Groupe de travail sur les interprétations agronomiques. 1995. *Système de classification des terres selon leurs aptitudes pour les cultures : 1. La production des céréales de printemps*. Révisé par W.W. Pettapiece. Bull. techn. 1995-6F. Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa. 94 pages, 2 cartes.
- Institut de recherche et de développement en agroenvironnement. 2008. *Carte pédologique*.
- Marie-Victorin, Fr. 1995. *Flore laurentienne*. 3^e édition mise à jour par L. Brouillet, S.G. Hay et I. Goulet en collaboration avec M. Blondeau, J. Cayouette et J. Labrecque. Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal. 1093 p.
- Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2008. *Norme de stratification écoforestière, Quatrième inventaire écoforestier*. MRNF, Direction des inventaires forestiers. 52 p.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. *Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional*.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. *Guide d'interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 2015. *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables*. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction des politiques de l'eau.
- Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 2008. Version révisée 2015. *Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Note explicative sur la ligne des hautes eaux : la méthode botanique experte*, 9 pages + annexes.
- Tiner, R. W. 2016. *Wetland Indicators: A Guide to Wetland Formation, Identification, Delineation, Classification, and Mapping*. CRC Press.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton









**ANNEXE 1. DÉLIMITATION APPROXIMATIVE DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
(VOIR PLAN D'ARPENTAGE POUR PLUS DE PRÉCISIONS)**

Localisation du projet
Lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944
Sutton

Localisation du projet
Lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944
Sutton

Lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944

Sutton



1:8,000 (Au format original 11x17)
Système de coordonnées: NAD 1983 CSRS MTM 8

1:8,000 (Au format original 11x17)
Système de coordonnées: NAD 1983 CSRS MTM 8




Sources :
Milieu hydrique et cadastre : MERN, 2021
Limite municipale : SDA, 2021
Réseau routier : AGréseau, 2021
Image : World Imagery, 2020
Édition : 2021-09-20

Sources :
Milieu hydrique et cadastre : MERN, 2021


Limite municipale : SDA, 2021
Réseau routier : AGréseau, 2021
Image : World Imagery, 2020

Edition : 20121-09-20

1000000



Inventaire du milieu naturel
Lots 4 848 596, 4 848 919 et 4 847 944
Sutton



Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

ANNEXE 2. PHOTOGRAPHIES REPRÉSENTATIVES DE LA ZONE D'ÉTUDE

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 1. Points GPS 004. Vue vers l'aval de la rivière Sutton (CE-01). La ligne naturelle des hautes eaux (LNHE), représentée par le trait pointillé bleu, correspond à la limite supérieure de la litière forestière délavée. En d'autres mots, la LNHE correspond à la limite inférieure de la litière forestière. Les points GPS font référence aux photographies représentatives présentées ci-après. Voir les cartes en annexe pour plus les détails.



Photo 2. Points GPS 009. Vue vers l'aval de la rivière Sutton.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 3. Points GPS 014. Vue vers l'aval. Noter le lessivage de la litière forestière.



Photo 4. Points GPS 024. Vue vers l'amont. Noter le ruban forestier bleu localisé à l'endroit de la LNHE.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 5. Point GPS 035. Vue vers l'aval.



Photo 6. Point GPS 035. Milieu humide MH-01, vue vers le nord-est. Ce milieu humide de type marécage arbustif / arborescent, est un milieu humide isolé, au sens qu'il n'est pas localisé sous la LNHE.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 7. Point GPS 073. Autre point de vue du MH-01, vue vers le sud-est. Le drainage latéral résulte en des résurgences de bas de pente favorables au développement de milieux humides.



Photo 8. Vue du milieu humide MH-01 le 13 septembre 2021.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 9. Point GPS 074. Milieu humide MH-02. Ce milieu humide de bas de pente, de type marécage isolé en raison de la canopée, est caractérisé par une strate herbacée dominée par l'onoclée sensible. La présence d'une dépression noirâtre est un indicateur des conditions hydriques saturées en eaux, dans ce cas, à la surface du sol.



Photo 10. Vue du milieu humide MH-02 le 13 septembre 2021. En septembre, il est plus évident de constater que ce milieu humide est caractérisé par une strate herbacée dominée par l'onoclée sensible.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 11. Point GPS 081. Milieu terrestre. Vue vers l'ouest, notamment de la maison sise au 2342, chemin Poissant.



Photo 12. Point GPS 084. Vue vers nord du lot 4 848 919. Noter la rivière Sutton en arrière-plan.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 13. Point GPS 086. Vue vers l'est de la plantation de pin rouge sur le lot 4 848 956.



Photo 14. Point GPS 087. Autre point de vue de la plantation de pin rouge.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 15. Point GPS 088. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 848 956.



Photo 16. Point GPS 090. Vue vers l'amont d'un petit cours d'eau intermittent (CE-02).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 17. Point GPS 092. Vue vers l'aval du petit cours d'eau intermittent.



Photo 18. Point GPS 096. Vue vers le nord d'un milieu humide (MH-03) restreint à l'espace entre les crêtes rocheuses affleurantes dans la partie est du lot 4 848 956.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 19. Point GPS 106. Vue vers l'aval d'un fossé de contournement en amont de la maison sise au 2342, chemin Poissant.



Photo 20. Point GPS 109. Vue vers l'aval du fossé avant sa jonction avec le cours d'eau (CE-02).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 21. Point GPS 130. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.



Photo 22. Point GPS 131. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 23. Point GPS 132. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.



Photo 24. Point GPS 133. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 25. Point GPS 134. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.



Photo 26. Point GPS 136. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944, à l'endroit d'une plantation de pin rouge.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 27. Point GPS 137. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.



Photo 28. Point GPS 138. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 29. Point GPS 139. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 847 944.



Photo 30. Point GPS 140. Vue du milieu terrestre sur le lot 4 848 956.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 31. Point GPS 142. Vue vers l'aval d'un cours d'eau intermittent (CE-04) sur le lot 4 848 956.



Photo 32. Point GPS 147. Vue vers l'aval du cours d'eau intermittent CE-04 sur le lot 4 848 956.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 33. Vue vers l'amont du cours d'eau intermittent CE-04, près du point GPS 158, le 13 septembre 2021.



Photo 34. Point GPS 158. Vue vers l'amont de la rivière Sutton (CE-01).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 35. Point GPS 160. Milieu humide (MH-03) caractérisé par des sols saturés en eau en raison de l'écoulement latéral. Le milieu humide est discernable par la présence d'une litière noirâtre.



Photo 36. Point GPS 177. Photo des sols saturés en eau (MH-03).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 37. Point GPS 188. La présence d'eau dans le sol favorise le développement de racines superficielles et rend les arbres susceptibles au chablis (MH-03).



Photo 38. Point GPS 216. Vue vers l'aval de l'écoulement latéral donnant lieu à des résurgences diffuses et des milieux humides en pente (MH-03).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 39. Point GPS 239. Vue vers l'amont du cours d'eau intermittent CE-03. Ce cours d'eau intermittent, caractérisé par la présence d'un lit d'écoulement naturel relativement bien définie, provient du drainage latéral d'un milieu humide de résurgences (MH-04), lesquelles forment un tronçon de cours d'eau, mais lequel se déverse ensuite dans un autre milieu humide (MH-03), caractérisé par un écoulement diffus, avant que ce cours d'eau (CE-03) disparaisse à nouveau sous la surface du sol.



Photo 40. Point GPS 262. Bien que difficile à percevoir sur cette photo, ce milieu humide (MH-04) est dominé par l'onoclée sensible, lequel est aussi caractérisé par la présence d'un sol saturé en eau provenant de résurgences, ces dernières donnant lieu à des puits d'eau présumée potable.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 41. Vue du milieu humide MH-04 le 13 septembre 2021.



Photo 42. Point GPS 274. Vue vers l'aval du milieu humide (MH-04). Noter le sol noirâtre, saturé en eau, ainsi que le puit d'alimentation en eau (dans la partie gauche de l'image).

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton



Photo 43. Point GPS 316. Vue vers l'aval du cours d'eau intermittent CE-03.



Photo 44. Point GPS 325. Vue vers l'ouest du milieu humide (MH-03) près de la limite aval du cours d'eau CE-03, avant que ce dernier s'infiltre complètement dans le sol disparaisse sous sa surface.

Propriété Télésiège 6 S.E.C.

Délimitation de milieux humides et hydriques, lots 4 848 919, 4 848 596 et 4 847 944 à Sutton

ANNEXE 3. IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES ET RIVERAINS

IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES ET RIVERAINS

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	2
2. OBJECTIFS	2
3. ASPECTS LÉGAUX	2
4. LACS ET COURS D'EAU.....	2
4.1. IDENTIFICATION	2
4.2. DÉLIMITATION.....	3
5. RIVE	4
5.2. IDENTIFICATION	4
5.3. DÉLIMITATION.....	4
6. PLAINE INONDABLE.....	4
6.2. IDENTIFICATION	4
6.3. DÉLIMITATION.....	5
7. BASES DE DONNÉES D'AIDE À L'IDENTIFICATION ET À LA DÉLIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES ET RIVERAINS....	5
8. AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES.....	5
9. BIBLIOGRAPHIE.....	6

ANNEXES

1. INTRODUCTION

Les milieux hydriques et riverains sont des environnements dynamiques et vulnérables. Leur préservation est vitale pour la pérennité des multiples usages qui y sont rattachés, des nombreux services écologiques qui y sont rendus et de la biodiversité qui y foisonne. Pour appliquer adéquatement les lois et règlements visant leur protection, il est primordial de connaître les moyens par lesquels on peut les identifier et les délimiter.

En complément de cette fiche ou pour obtenir plus de détails quant à l'identification des milieux hydriques et de leurs rives, veuillez vous référer au [Guide d'interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables](#).

2. OBJECTIFS

La présente fiche a pour principal objectif d'expliquer la manière d'identifier et de délimiter les milieux hydriques, soit les lacs et les cours d'eau, ainsi que les milieux riverains, soit les rives et les plaines inondables.

3. ASPECTS LEGAUX

Les interventions dans ces milieux sont notamment encadrées par la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, LQE) et par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r.35; PPRLPI ou Politique).

En vertu du 2^e alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, LQE), les travaux prévus « [...] dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac [...] » sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

De plus, en vertu du 1^{er} alinéa de l'article 22 de la LQE, nul ne peut ériger ou modifier une construction « [...] s'il est susceptible d'en résulter [...] une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement du ministre un certificat d'autorisation ».

Aussi, l'article 2 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r.3; RRALQE) indique que tout projet réalisé « [...] sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique (chapitre Q-2, r. 35; PPRLPI) [...] » dont l'usage projeté correspond à

des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès publics (**cinq fins**) nécessite l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation s'il est susceptible de modifier la qualité de l'environnement. Seul le Ministère a la responsabilité d'évaluer si les projets sont susceptibles de modifier la qualité de l'environnement. Lorsqu'ils visent un objectif autre que les cinq fins, les projets sont soumis à l'obtention d'un permis délivré par la municipalité ou par la MRC concernée en vertu de ses règlements d'urbanisme.

Par ailleurs, certaines interventions touchant des lacs et des cours d'eau, leurs rives ou leurs plaines inondables, peuvent être soumises à une procédure d'autorisation en vertu du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (chapitre Q-2, r.23), du chapitre II et de l'annexe A de la LQE pris en application de l'article 31.1 de la LQE.

Pour obtenir de l'information sur les milieux humides (étangs, marais, marécages ou tourbières), lesquels sont également protégés en vertu du 2^e alinéa de l'article 22 de la LQE, veuillez vous référer aux guides [Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional](#) et [Les milieux humides et l'autorisation environnementale](#).

Avertissement : L'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement ne dispense pas son titulaire des obligations légales édictées par toute autre loi ou par tout autre règlement fédéral, provincial ou municipal.

Guichet unique : Le guichet unique d'autorisation des activités prévues en milieux hydriques ou humides permet à une personne d'acheminer, à son choix, sa demande d'autorisation (en deux exemplaires) au MDDELCC ou au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) après avoir rempli le formulaire prévu à cette fin. Le ministère récepteur s'occupera d'acheminer à l'autre ministère concerné la demande pour analyse et décision.

4. LACS ET COURS D'EAU

4.1. Identification

Les interventions réalisées dans les lacs et les cours d'eau à débit régulier et intermittent sont encadrées par l'article 22 de la LQE et visées par la Politique. La Loi et la Politique ne définissent pas le

terme « lacs ». C'est donc au sens large que ce terme doit être interprété.

Cependant, aux fins de l'application de la LQE et de la Politique, des critères ont été élaborés pour identifier les cours d'eau et les fossés¹. Les paragraphes ci-dessous présentent les éléments essentiels à la caractérisation des lacs et des cours d'eau.

Au sens des articles 2.8 et 2.9 de la Politique, modifiés en 2014, l'expression « cours d'eau » correspond à toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, y compris les lits créés ou modifiés par une intervention humaine. Elle désigne aussi le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception des fossés de voies publiques ou privées, des fossés mitoyens et des fossés de drainage. En milieu forestier du domaine de l'État, elle correspond à un cours d'eau tel que défini par le [Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État](#) (chapitre A-18.1, r.7; RNI).

Soulignons que le caractère de cours d'eau est attribué à la totalité du parcours, depuis la source jusqu'à l'embouchure (point de jonction). Le cours d'eau, même s'il a été modifié ou déplacé en tout ou en partie, demeure visé par la LQE et la Politique, et ce, peu importe la superficie de son bassin versant. Il en va de même s'il emprunte le tracé d'un fossé (fossé de voie publique ou privée, fossé mitoyen ou fossé de drainage) sur une partie de son parcours. La superficie du bassin versant est calculée à partir du point de jonction avec un autre fossé ou avec un cours d'eau.

Les critères d'identification des cours d'eau et des fossés sont présentés aux annexes 1, 2 et 3.

Avertissement : *Un fossé ou certaines portions de fossés peuvent être considérés comme un habitat du poisson et être visés par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1; LCMVF) (consulter la direction de la gestion de la faune régionale du MFFP) et par la Loi sur les pêches (consulter Pêches et Océans Canada).*

En ce qui a trait au pouvoir de statuer sur la nature d'un écoulement, différentes autorités peuvent agir dans le cadre des compétences, des rôles et des responsabilités qui leur sont confiés, en vertu des lois qu'elles administrent :

- La LQE permet au MDDELCC de déterminer à quel endroit et pour quelles interventions un certificat d'autorisation est requis; le MDDELCC doit statuer sur l'identification des cours d'eau à partir des critères établis par la Politique;
- La Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1; LCM) demande à la MRC de définir à quel endroit elle a compétence en fonction des critères d'identification de l'article 103 de la LCM;
- La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) permet au MFFP de statuer sur les activités assujetties à une autorisation (dans ce cas-ci, dans l'habitat du poisson);
- La Loi sur les pêches permet à Pêches et Océans Canada de statuer sur les travaux assujettis à une autorisation préalable, notamment dans l'habitat du poisson.

Dans un souci d'harmonisation et de simplification réglementaire, la définition et les critères d'identification de la Politique ont été adaptés à ceux de la LCM.

Il est primordial que les différentes instances travaillent de concert afin d'établir des méthodes communes d'identification des cours d'eau et des fossés qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs respectifs, notamment le maintien de la qualité de l'environnement et des capacités d'écoulement des cours d'eau.

4.2. Délimitation

C'est la ligne des hautes eaux (LHE) qui délimite la rive et le littoral² d'un lac ou d'un cours d'eau. La Politique prescrit plusieurs méthodes pour délimiter la LHE. **Elle privilégie cependant celles qui font appel à des critères botaniques.**

Les méthodes botaniques situent la LHE à l'endroit où la prédominance des plantes aquatiques fait place à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Deux techniques peuvent être utilisées :

- [La méthode botanique experte](#), destinée aux spécialistes en botanique, est réservée aux cas qui nécessitent une grande précision dans la délimitation. Elle est basée sur la notion de prédominance d'espèces hydrophytes et permet d'établir l'endroit où le nombre d'espèces (et non le nombre de plantes) à

¹ Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l'article 103 de la [Loi sur les compétences municipales](#) (chapitre C-47.1; LCM).

² Le littoral est la partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau (Politique).

caractère obligé ou facultatif des milieux humides est supérieur à 50 % du nombre total d'espèces recensées³;

- [La méthode botanique simplifiée](#) est un outil simple et efficace mis à la disposition de tous ceux qui participent à l'analyse, au contrôle ou au développement du territoire (inspecteurs municipaux, biologistes, urbanistes, etc.). Essentiellement, cette méthode consiste à repérer des indicateurs biologiques (espèces indicatrices selon le type de milieu [eau douce ou eau maritime], mousses aquatiques et lichens) et physiques (marques d'inondation sur les troncs, les sols et les structures) dont l'emplacement permet de localiser la LHE avec une précision acceptable.

La Politique prévoit également deux **cas particuliers lorsqu'il y a présence d'un ouvrage de retenue ou d'un mur de soutènement**. Dans de tels cas, la LHE correspond respectivement :

- À la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage de retenue des eaux, soit le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux de retenues dans un contexte d'exploitation normale (ce qui ne correspond pas aux limites maximales du droit d'inondation de l'exploitant, qui sont généralement établies au-delà de la cote maximale d'exploitation);
- Au sommet du mur de soutènement, dans la mesure où le mur a été légalement érigé, c'est-à-dire construit conformément à un règlement municipal ou en vertu d'un certificat d'autorisation du MDDELCC, ou s'il bénéficie d'un droit acquis.

Finalement, s'il s'avère impossible de déterminer la LHE à l'aide des méthodes précédentes, celle-ci peut être localisée en utilisant **la cote d'inondation d'une crue de récurrence de deux ans**, qui correspond au niveau atteint par les eaux d'une crue susceptible de se produire une fois tous les deux ans. Elle est fondée sur l'analyse statistique de données hydrologiques.

Avertissement : Aux fins de l'application du Règlement sur les habitats fauniques, l'habitat du poisson et l'aire de concentration d'oiseaux aquatiques sont circonscrits par la limite d'inondation de récurrence de deux ans (consulter la direction de la gestion de la faune régionale du MFFP). Lorsque cette limite ne peut être établie, la LHE est déterminée à l'aide de la méthode botanique, conformément à la Politique.

³ Se référer aux listes des espèces obligées et facultatives des milieux humides du Québec méridional présentées aux annexes 1 et 2 du

5. RIVE

5.2. Identification

La rive, au sens de la Politique, est la bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la LHE. Les interventions dans la rive sont encadrées par l'article 22 de la LQE (1^{er} alinéa), par le RRALQE et sont visées par la Politique. Dans les forêts situées sur les terres publiques, le Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État prévoit des mesures particulières qui peuvent différer de celles de la Politique.

5.3. Délimitation

Comme il a été mentionné précédemment, la LHE permet de délimiter la rive et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau. Elle peut être déterminée en appliquant l'une des méthodes décrites à la section 4.2 de cette fiche.

La Politique prévoit que la rive se mesure horizontalement, à partir de la LHE d'un lac ou d'un cours d'eau, vers l'intérieur des terres. Deux distances peuvent être attribuées à la rive dépendamment de la pente et de la hauteur du talus, soit 10 ou 15 mètres.

Selon l'article 2.2 de la Politique, la rive a un minimum de 10 mètres de largeur lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La largeur minimale de la rive est de 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et qu'elle présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

La pente d'un talus peut se calculer simplement en faisant le rapport entre sa hauteur et sa profondeur horizontale (sa largeur). Le chapitre 5 du [Guide d'interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables](#) explique davantage la méthode de calcul à appliquer.

6. PLAINE INONDABLE

6.2. Identification

La plaine inondable est l'espace occupé par un lac ou par un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés. Comme les interventions sur les rives, celles en plaine inondable sont encadrées par l'article 22 de la LQE (1^{er} alinéa), par le RRALQE et

sont visées par la Politique, en fonction de leur localisation en zone de grand ou de faible courant.

La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine inondable susceptible d'être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. La zone de faible courant correspond à la partie de la plaine inondable située au-delà de la zone de grand courant et qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.

6.3. Délimitation

Les limites de la plaine inondable sont précisées par l'un des moyens suivants, conformément à l'article 2.4 de la Politique :

- Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines inondables;
- Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
- Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
- Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, dans un règlement de contrôle intérimaire ou dans le règlement d'urbanisme d'une municipalité.

Lorsqu'un conflit survient dans l'application de différents moyens, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, dont la valeur est reconnue par le MDDELCC, devrait être utilisée pour délimiter l'étendue de la plaine inondable.

7. BASES DE DONNEES D'AIDE A L'IDENTIFICATION ET A LA DELIMITATION DES MILIEUX HYDRIQUES ET RIVERAINS

Pour délimiter, dans une première approche, les milieux hydriques et riverains, on pourra se référer aux bases de données suivantes :

- ➔ La **Base de données topographiques du Québec** (BDTQ), à l'échelle 1 : 20 000, est une banque de données géoréférencées qui rassemble plusieurs couches d'information

touchant notamment les milieux hydriques présents sur le territoire :

<http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca/edel/pages/recherche/critereRechercheEdel.faces>;

- ➔ **Google Earth** et **Google Map** sont deux outils permettant de saisir le contexte régional de la zone d'étude :

<http://www.google.com/earth/download/ge/agree.html> et <http://maps.google.com/>;

- ➔ Les photographies aériennes, les orthophotographies et la cartographie des plaines inondables disponibles à la **Géoboutique du Québec** : <http://geoboutique.mrn.gouv.qc.ca>;

- ➔ **Les cartes des cours d'eau du MAPAQ** (disponibles *auprès des MRC* au format papier uniquement);

- ➔ La **cartographie des zones agricoles** (CPTAQ) : <http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=231>;

- ➔ Le site Web de la **Commission de toponymie du Québec** propose un outil permettant la recherche de lieux par leur toponyme, dont des milieux hydriques, et de les localiser géographiquement : <http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/toposweb/recherche.aspx>;

- ➔ La **cartographie des habitats fauniques** du Secteur de la Faune et des Parcs du MFFP : <http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/cartographie.jsp>;

- ➔ Certaines villes et communautés métropolitaines disposent d'outils de navigation cartographique en ligne offrant la visualisation de photographies aériennes à une échelle plus fine.

8. AUTRES DOCUMENTS TECHNIQUES

- [Délimitation de la ligne des hautes eaux](#)
- [Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional](#)
- [La végétalisation de la bande riveraine](#)
- [Les milieux humides et l'autorisation environnementale](#)
- [Note explicative sur la ligne naturelle des hautes eaux](#)

9. BIBLIOGRAPHIE

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, 2007.
*Délimitation de la ligne des hautes eaux : méthode
botanique simplifiée*, 52 p.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, 2008.
*Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables – Note explicative sur la ligne
naturelle des hautes eaux : la méthode botanique
experte*, 27 p.

[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/note-
explic.pdf](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/note-explic.pdf)

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES
PARCS, 2013. *Guide d'interprétation, Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines
inondables*, ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs,
Direction des politiques de l'eau, 131 p.


[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-
interpretationPPRLPI.pdf](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf)

BAZOGÉ, A., D. LACHANCE ET C. VILLENEUVE,
2014. *Identification et délimitation des milieux
humides du Québec méridional*, ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques,
Direction de l'écologie et de la conservation et
Direction des politiques de l'eau, 64 p. + ann.

[http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/identifica-
tion-delimitation-milieux-humides.pdf](http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rives/identification-delimitation-milieux-humides.pdf)

Date de mise à jour : janvier 2015


ANNEXE 1 : Critères d'identification d'un cours d'eau permanent ou intermittent



! Le caractère de cours d'eau s'applique à la totalité du parcours, depuis la source jusqu'à l'embouchure.

* La superficie du bassin versant est calculée à partir du point de jonction.


ANNEXE 2 : Critères permettant la détermination d'un cours d'eau permanent ou intermittent visé par l'application de l'article 22 de la LQE et par la PPRLPI



! Le caractère de fossé s'applique à la totalité du parcours, depuis la source jusqu'à l'embouchure.

* La superficie du bassin versant est calculée à partir du point de jonction.

ANNEXE 3 : Critères permettant la détermination des cours d'eau visés par l'application de l'article 22 de la LQE et par la PPRLPI - Outil d'aide à la décision



1. Dépression où les signes d'écoulement de l'eau sont bien visibles.

2. Dépression : tranchée, excavation pratiquée en long dans le sol et relativement étroite.

Code civil, article 1002 : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire, sur la ligne séparatrice pour moitié ou à ses frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. »

**Développement durable,
Environnement et Lutte
contre les changements
climatiques**

Québec 