

Група I

- 1) F
- 2) F
- 3) V
- 4) F
- 5) F
- 6) V

Група II

- 1) $(h_1 \wedge \neg h_2) \rightarrow h_0$
- 2) $\exists x \in A (x > 0 \vee \exists y \in A xy^2 < 0)$
- 3) $A \cap (\overline{B} \cup C)$
 $(=) (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap C)$
 $A = \{1, 4\} \quad C = \{0, 1, 5\}$
 $B = \{1, 2\}$
- 4) $A \subseteq B$

$$n \in \mathbb{N} \setminus \{A \cup B\} : \forall k \in \mathbb{N} \quad n \neq 2k$$

Група III

- 1) a.

h_0	h_1	$\neg h_1$	$h_0 \leftrightarrow \neg h_1$	$h_1 \rightarrow h_0$	$\varphi \rightarrow \psi$
1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1

Falso

15 - Se φ é verdadeiro

μ_1	μ_0
1	1

0	1
0	0

Não foi para φ ter valor 1,
 μ_0 e μ_1 precisavam ter o mesmo
valor lógico e se $\mu_1 = 0$ e $\mu_0 = 1$,
 φ tem valor lógico 1 e
 φ tem valor lógico 0

2)