

Rappresentazioni soluzioni agli esercizi per natale

Second'anno di matematica, SNS

January 1, 2016

Soluzioni agli esercizi

Esercizio 1

Siano k , e n due interi positivi. Per ogni $\sigma \in S_k$ denotate con $\omega(\sigma)$ il numero di orbite di σ su $\{1, \dots, k\}$. Dimostrate la formula:

$$\frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} n^{\omega(\sigma)} = \binom{n+k-1}{k}$$

Soluzione 1.1

Soluzione 1.2

Esercizio 2

Calcolate la scomposizione in fattori irriducibili dei prodotti di tutte le possibili coppie di rappresentazioni irriducibili di S_4 .

Soluzione 2.1

Soluzione 2.2

Esercizio 3

- (a) Sia $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ una rappresentazione irriducibile di un gruppo G . Dimostrate che l'immagine del centro di G è contenuta nel sottogruppo dei multipli dell'identità.
- (b) Dimostrate che ogni sottogruppo finito di \mathbb{C}^* è ciclico
- (c) Se un gruppo finito ha una rappresentazione fedele irriducibile, allora il suo centro è ciclico. Nota: una rappresentazione ρ di G è fedele se $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V_\rho)$ è iniettivo.

Soluzione 3.1

Soluzione 3.2

Esercizio 4

Se ρ è una rappresentazione irriducibile di S_5 di grado 5 e $s \in S_5$ è un 5-ciclo, fate vedere che $\rho(s)$ ha come autovalori tutte e sole le radici quinte dell'unità.

Soluzione 4.1

Soluzione 4.2

Esercizio 5

Trovare la tavola dei caratteri di A_4 .

Soluzione 5.1 *Do per noto che le classi di coniugio di A_4 siano rappresentate da id , $(12)(34)$, (123) , (132) (si fa a conti ricordandosi che le classi di coniugio di A_n sono o quelle di S_n oppure quelle di S_n spezzate a metà).*

A_4 ha 12 elementi e 4 classi di coniugio. Inoltre so che non è abeliano (quindi ha almeno una rappresentazione di dimensione ≥ 2) e ammette sicuramente la rappresentazione banale. Facendo i casi si vede che l'unico modo di fare 12 sommando quattro quadrati con questi constraint è $12 = 3^2 + 3 \cdot 1^2$. Andiamo quindi a cercare tre omomorfismi di A_4 in \mathbb{C}^ per poi completare la tabella per ortogonalità.*

Notiamo che A_4 è generato dalla classe di coniugio di (123) . Infatti se conosco il valore di χ su questa classe so che $\chi(132) = \chi((123))^2$ e poi completo per omomorfismo. Siccome (123) ha ordine tre e stiamo cercando rappresentazioni di grado 1, si ha che $\chi(123)$ è un radice terza dell'unità. Ci sono quindi al più tre possibilità per un tale omomorfismo. Ciò significa che li abbiamo trovati tutti.

Completando per ortogonalità si ricava:

numero di elementi	1	3	4	4
classi di conj.	id	$(12)(34)$	(123)	(132)
χ_{id}	1	1	1	1
χ_a	1	1	ζ	ζ^2
χ_b	1	1	ζ^2	ζ
χ_g	3	-1	0	0

Soluzione 5.2

Esercizio 6

Trovare la tavola dei caratteri di D_4, D_5 .

Soluzione 6.1 0.1 Tabella dei caratteri di D_4

Ordine di D_4 : 8 elementi. Generato da 2 elementi: ρ, σ (rispettivamente rotazione e simmetria, con relazioni $\rho^4 = \sigma^2 = e$ e $\sigma\rho\sigma^{-1} = \rho^{-1}$). Ha 5 classi di coniugio: $\{e\}, \{\rho^2\}, \{\rho, \rho^3\}, \{\sigma, \sigma\rho^2\}, \{\sigma\rho, \sigma\rho^3\}$. Non è abeliano e ha almeno la rappresentazione banale, quindi si ha $8 = 2^2 + 4 \cdot 1^2$ è l'unico modo di scrivere 8. Dobbiamo quindi trovare 4 omomorfismi di D_4 in \mathbb{C}^ per poi ricavare per ortogonalità la rappresentazione di dimensione 2.*

Notiamo che, siccome σ ha ordine 2, esso può essere mandato solo in ± 1 (radici 2-esime dell'unità) e siccome ρ e ρ^{-1} stanno nella stessa classe di coniugio si ha $x = \chi(\rho)$ deve essere una radice quarta dell'unità che rispetti $x = x^3$ e quindi deve essere solo 1 o -1. Abbiamo quindi solo quattro possibili scelte per un possibile omomorfismo da D_4 in \mathbb{C}^ , che sono quindi obbligate perché sappiamo che esistono 4 caratteri di dimensione 1 per D_4 (ovvero omomorfismi). Quindi scrivendo questi nella tabella e completandola per ortonormalità si ha:*

numero elementi	1	1	2	2	2
classi di conj.	e	ρ^2	ρ, ρ^3	$\sigma, \sigma\rho^2$	$\sigma\rho, \sigma\rho^3$
χ_{id}	1	1	1	1	1
χ_a	1	1	1	-1	-1
χ_b	1	1	-1	1	-1
χ_{ab}	1	1	-1	-1	1
χ_g	2	-2	0	0	0

Soluzione 6.2

Esercizio 7

Sia T un tetraedro di centro nell'origine, e sia $G \subseteq O_3$ il gruppo delle trasformazioni ortogonali che portano T in se stesso. Numerando in qualche modo i vertici di T da 1 a 4, otteniamo un'azione di G su $\{1, 2, 3, 4\}$.

- (a) Fate vedere che questo dà un'identificazione di G con S_4 .
- (b) Fate vedere che il sottogruppo di G delle matrici con determinante positivo corrisponde ad A_4 .
- (c) Scomponete la rappresentazione per permutazioni corrispondente agli spigoli del tetraedro come rappresentazione di A_4 .

Soluzione 7.1

Soluzione 7.2

Esercizio 8

Sia G un gruppo finito che agisce su un insieme finito I con almeno due elementi in modo non banale. Diciamo che l'azione è doppiamente transitiva se date due coppie (i, i') e (j, j') di elementi di I con $i \neq i'$ e $j \neq j'$ esiste $s \in G$ con $s \cdot i = j$ e $s \cdot i' = j'$.

Sia ρ_I la corrispondente rappresentazione per permutazioni e scriviamo $\rho_I = \mathbb{K} + \rho$, come al solito. Allora fate vedere che ρ è irriducibile se e solo se l'azione di G su I è doppiamente transitiva.

Concludete che S_n ha una rappresentazione irriducibile di grado $n - 1$ per ogni $n \geq 2$.

Cenno di soluzione: Fate vedere che ρ è irriducibile se e solo se $\langle \chi_{\rho_I} | \chi_{\rho_I} \rangle = 2$. Ma χ_{ρ_I} è reale, per cui $\langle \chi_{\rho_I} | \chi_{\rho_I} \rangle = \langle \chi_{\rho_I}^2 | 1 \rangle = \langle \chi_{\rho_I \times I} | 1 \rangle$ e $\langle \chi_{\rho_I \times I} | 1 \rangle$ è il numero di orbite di G su $I \times I$.

Soluzione 8.1

Soluzione 8.2

Esercizio 9

Sia G un gruppo finito. Dati due elementi $h, g \in G$ appartenenti a classi di coniugio distinte mostrare che

$$\sum_{\rho \in \text{Irr}(G)} \chi_{\rho}(g) \overline{\chi_{\rho}(h)} = 0$$

dove $\text{Irr}(G)$ denota l'insieme delle rappresentazioni irriducibili di G a meno di isomorfismo. Cosa riuscite a dire sulla precedente somma se invece h e g sono elementi coniugati?

Cenno di soluzione: Considerate il carattere di $\mathbb{C}[G]$ come rappresentazione di $G \times G$

Soluzione 9.1

Soluzione 9.2

Idee utili per gli esercizi