

Informe: luz y plantines

Conclusión

En este grupo, los plantines con 12 horas de luz terminaron más altos y con más hojas nuevas que los de 4 horas. No afirmo que esto ocurra en toda albahaca, sino que es el patrón de los seis casos observados.

Cálculos y evidencia

Para la altura sumé $5,2 + 5,8 + 5,5 = 16,5$ cm; dividido entre tres da **5,5 cm** para el grupo de 12 horas. En el grupo de 4 horas, $3,0 + 3,5 + 3,2 = 9,7$ cm; el promedio es aproximadamente **3,23 cm**. La diferencia entre promedios es de unos 2,27 cm. Además, el primer grupo produjo entre 4 y 5 hojas nuevas, mientras el segundo produjo entre 2 y 3.

La variable modificada fue el número de horas diarias de luz. La altura final y la cantidad de hojas nuevas son medidas de resultado.

Límite

Solo hubo tres plantines por condición y se observaron diez días. También B2 tuvo una hoja dañada al mover la maceta, de modo que esa cuenta de hojas no refleja únicamente la condición de luz. Los datos permiten comparar este ensayo, pero no separar con seguridad todos los factores ni generalizar.

Lectura fila por fila

El promedio resume bien la diferencia, pero no la produce un único valor extremo. Los tres casos A superan al más alto del grupo B: incluso A1, con 5,2 cm, queda 1,7 cm por encima de B2, que alcanza 3,5 cm. En hojas nuevas ocurre algo semejante: el mínimo de A es 4 y el máximo de B es 3. Esa separación entre los rangos refuerza que el patrón está distribuido entre las filas y no depende solo de A2.

La observación de A3, "tallo levemente inclinado", no cambia la medida de altura anotada y no explica una diferencia entre grupos. En cambio, el daño de una hoja de B2 afecta directamente una de las dos medidas de resultado. Por eso usaría la altura como evidencia principal y la cantidad de hojas como apoyo con una reserva específica.

Qué haría en una repetición

Antes de asignar la condición mediría la altura inicial y registraría cambios cada dos días. Así podría comparar crecimiento, no solo altura final, y comprobar si los grupos partieron de tamaños semejantes. También mantendría la fila de cualquier incidente, pero anotaría cuándo ocurrió y qué medida podría alterar. Con seis plantines todavía hablaría de un ensayo pequeño; aumentar la cantidad permitiría saber si la diferencia se repite y si existe más variación dentro de cada condición.