

# Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów statystycznych

**Estymacja** - szacowanie nieznanych wartości parametrów rozkładu pewnej cechy w populacji na podstawie próbki.

**Estymacja punktowa** - oszacowanie wartości parametru przez wartość estymatora (wynik:  $\theta$ )

Na podstawie próbki z całej populacji szacujemy parametr  $\theta$  => Wyciągamy wnioski o parametrze populacji.

Estymacja punktowa jest uzyskiwana za pomocą **estymatora** na podstawie przykładowych danych. Różne próbki będą dawać różne oszacowania, nawet przy użyciu tego samego estymatora.

**Estymacja przedziałowa** – szacowanie wartości parametru za pomocą pewnego przedziału, który z założonym z góry prawdopodobieństwem pokrywa rzeczywistą wartość parametru  $\theta$  (wynik:  $\theta$  leży w przedziale  $[\theta_-, \theta_+]$  z prawdopodobieństwem  $1 - \alpha$ )

**Przedziałem ufności** ( $\theta_1, \theta_2$ ) o poziomie ufności  $1 - \alpha$  nazywamy przedział spełniający warunek:

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

**Poziom ufności**  $1 - \alpha$  – prawdopodobieństwo, że rzeczywista wartość szacowanego parametru  $\theta$  w populacji znajduje się w wyznaczonym przedziale ufności

1. Załaduj pakiet **MASS** i wczytaj zestaw danych **survey**. Zbiór ten przedstawia wyniki ankiety 237 studentów z Uniwersytetu w Adelaide. Ankieta ta opisuje wiele cech – m.in. wiek, płeć, wzrost. Na podstawie wyników tej próby studentów będziemy próbowali wyciągnąć wnioski na temat wieku wszystkich studentów tej uczelni. Podaj punktową ocenę średniej i odchylenia standardowego wieku w populacji. (Przy obliczeniach zwróć uwagę, że nie wszyscy studenci odpowiedzieli na wszystkie pytanie – usuń puste pola)
2. Oblicz przedział ufności dla średniej wieku studentów zakładając przedział ufności na poziomie 95%.
3. Zakładając, że znamy odchylenie standardowe populacji równe 7, oblicz przedział ufności oraz margines błędu dla średniej wieku na poziomie 95%.

Wyznaczanie przedziału ufności dla średniej, gdy rozkład cech w populacji jest rozkładem normalnym **N( $\mu, \sigma$ )** :

$$\left( \bar{x} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$z_{\frac{\alpha}{2}}$  – wartość dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego w punkcie  $1 - \frac{\alpha}{2}$

$\bar{x}$  – estymator nieznannej średniej

$z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$  – margines błędu

4. Nie znając odchylenia standardowego wieku populacji, oblicz przedział ufności oraz margines błędu dla średniej wieku na poziomie 95%. Gdy nie znamy odchylenia standardowego populacji, estymujemy je na podstawie wartości z próby. W tym celu korzystamy z tablic **t-Studenta**.
5. Wylosuj 5 wartości z rozkładu normalnego o średniej =10 i odchyleniu standardowym=  $\sqrt{3}$ . Oblicz średnią z wylosowanej próby 1000 razy. **Przedstaw rozkład estymatora wartości średniej** za pomocą histogramu.
6. **Przedstaw rozkład estymatora wartości średniej** zwiększając wylosowaną próbę do 100 wartości. Porównaj otrzymane wyniki.
7. Wczytaj plik 'szczury.txt', który zawiera informacje na temat wag (w gramach) pewnego gatunku szczura dla losowej próby. Załaduj pakiet **mosaic**. Wylosuj kolejno 1000 próbek z wyjściowej próbki. Losowanie odbywa się ze zwracaniem, a wielkości próbek są takie same jak wielkość próbki wyjściowej. Podpowiedź: Użyj funkcji **sample()**

**Metoda bootstrapowa** estymacji polega na wielokrotnym losowaniu ze zwracaniem próby. Znajduje ona zastosowanie w sytuacji, gdy nie znamy rozkładu z populacji z której pochodzi próbka.

8. Dla każdej z 1000 próbek wyznacz estymator średniej. Średnia z 1000 uzyskanych estymatorów jest wartością szukanego parametru.
9. Wyznacz histogram średniej estymowanej metodą bootstrapową

