Escore de condição corporal (ECC) em cães e gatos

Escala de 9 pontos: de 1 (caquético) a 9 (obeso grave). O escore 5 é o ideal, com faixa aceitável de 4 a 5.



Linha tracejada: largura/profundidade do tórax. Compare com a cintura (vista superior) e com o abdome (vista lateral).

Regra prática: cada ponto acima ou abaixo de 5 equivale a cerca de 10% do peso corporal. As silhuetas são esquemáticas e servem para ilustrar a lógica da escala (profundidade do tórax, cintura e retração abdominal); para uso clínico, consulte também as tabelas oficiais da WSAVA.

Descrição detalhada de cada escore

ECC	Categoria	Peso (% do ideal)	O que ver	O que sentir (palpação)	Nota técnica
1	**Caquético**	60%	Costelas, vértebras e ossos da pelve visíveis de longe; cintura e retração abdominal muito acentuadas.	Nenhuma gordura palpável; perda evidente de massa muscular.	Risco de desnutrição grave ou doença de base (neoplasia, parasitose, endocrinopatia). Investigar a causa e iniciar suporte nutricional com supervisão veterinária.
2	**Muito magro**	70%	Costelas facilmente visíveis; topo das vértebras lombares e ossos pélvicos proeminentes.	Sem gordura palpável; perda mínima de massa muscular.	Déficit calórico crônico. Revisar dieta, vermifugação e doenças associadas.
3	**Magro**	80%	Costelas visíveis, cintura bem marcada e abdome retraído de forma evidente.	Costelas palpáveis com cobertura mínima de gordura.	Reservas energéticas reduzidas. Revisar a quantidade e a densidade energética da dieta.
4	**Abaixo do ideal**	90%	Cintura bem notada de cima; abdome retraído; costelas podem aparecer.	Costelas facilmente palpáveis, com pouca gordura por cima.	Ainda dentro da faixa ideal da escala WSAVA (4 a 5). Comum em animais muito ativos ou de trabalho.
5	**Ideal**	100%	Cintura visível atrás das costelas, vista de cima; abdome retraído visto de lado.	Costelas palpáveis sem excesso de gordura e sem precisar de pressão.	Meta de manutenção, com cerca de 15 a 25% de gordura corporal. Associado a menor risco de doenças ortopédicas e metabólicas.
6	**Acima do ideal**	110%	Cintura ainda visível, mas pouco acentuada; abdome retraído discreto.	Costelas palpáveis com leve excesso de gordura.	Início do sobrepeso (cerca de 10% acima do ideal). Ajustar porções e petiscos antes que evolua.
7	**Sobrepeso**	120%	Cintura pouco distinguível; quase sem retração abdominal; gordura na base da cauda.	Costelas difíceis de palpar, sob camada moderada de gordura.	Cerca de 20% acima do ideal. Maior risco de osteoartrite, diabetes mellitus, hipertensão e intolerância ao exercício e ao calor.
8	**Obeso**	130%	Sem cintura; abdome arredondado ou distendido; gordura na região lombar e na base da cauda.	Costelas não palpáveis, ou só com pressão forte.	Cerca de 30% acima do ideal. Inflamação crônica de baixo grau, resistência à insulina e maior risco anestésico. Em gatos, evitar jejum ou perda de peso rápida (lipidose hepática).
9	**Obeso grave**	140%	Depósitos maciços de gordura em tórax, coluna, cauda, pescoço e membros; abdome muito distendido.	Costelas e coluna não palpáveis.	Cerca de 40% acima do ideal. Exige plano de perda de peso supervisionado e exames (glicemia, perfil renal e hepático, tireoide, cortisol quando indicado).

Parte técnica

O que é o ECC

Método semiquantitativo para estimar a gordura corporal. Combina inspeção visual, palpação das costelas e avaliação do contorno do corpo. A escala de 9 pontos foi validada contra medidas de gordura corporal (Laflamme, 1997) e é recomendada pela WSAVA. Seu uso é indicado em toda consulta, junto com a pesagem.

Como avaliar, passo a passo

- **Palpação:** passe a mão espalmada sobre as costelas, sem pressionar forte. No ideal, elas são sentidas com facilidade, como as costas dos dedos da mão.
- **Vista superior:** olhe de cima. Deve haver uma cintura visível atrás das costelas.
- **Vista lateral:** o abdome deve subir (retração, ou "tuck") do tórax em direção às pernas traseiras.
- **Músculo:** avalie a massa muscular à parte (coluna, escápulas, pelve). É possível ter ECC 5 com perda muscular, sobretudo em idosos e doentes crônicos.

Particularidades

Cães: pelagem longa e densa esconde a condição real; confie na palpação. A conformação varia entre raças, mas a regra da cintura e da retração abdominal vale para todas.

Gatos: a bolsa abdominal (primordial pouch) é uma dobra de pele e gordura normal e, sozinha, não indica sobrepeso. Palpe as costelas e observe a cintura de cima. Gatos obesos não devem passar por jejum ou perda de peso rápida: há risco de lipidose hepática.

Limitações do método

Há componente subjetivo; o resultado melhora quando a mesma pessoa avalia sempre. Gestação, ascite, massas abdominais e raças de conformação extrema podem mascarar o escore. A estimativa de peso por ECC é aproximada e perde precisão nos extremos da escala (1, 2 e 9).

Como estimar o peso ideal

O peso ideal depende de raça, estrutura óssea e porte, por isso não existe tabela única. A estimativa parte do ECC atual, considerando ~10% do peso por ponto fora do 5:

Peso ideal = peso atual x 100 / (100 + 10 x (ECC - 5))

ECC	Fator	Exemplo: animal de 10 kg
1	x 1.67	ideal = 16.7 kg
2	x 1.43	ideal = 14.3 kg
3	x 1.25	ideal = 12.5 kg
4	x 1.11	ideal = 11.1 kg
5	x 1.00	ideal = 10.0 kg
6	x 0.91	ideal = 9.1 kg
7	x 0.83	ideal = 8.3 kg
8	x 0.77	ideal = 7.7 kg
9	x 0.71	ideal = 7.1 kg

Exemplos: cão de 12 kg com ECC 7: 12 x 100 / 120 = 10 kg. Gata de 6 kg com ECC 8: 6 x 100 / 130 = 4,6 kg.

Perda de peso segura

Cerca de 1 a 2% do peso por semana em cães e 0,5 a 2% em gatos, com reavaliação do ECC a cada 2 a 4 semanas e ajuste da dieta pelo veterinário.

Quando procurar o veterinário

ECC igual ou acima de 6, ou igual ou abaixo de 3; perda ou ganho de peso sem mudança de alimentação; apetite alterado. Causas como hipotireoidismo, diabetes, doença renal e parasitas devem ser investigadas.

Referências: WSAVA Global Nutrition Committee. Nutritional assessment guidelines. J Small Anim Pract 2011;52:385-396. Laflamme DP. Development and validation of a body condition score system for dogs. Canine Pract 1997;22:10-15. Laflamme DP. Development and validation of a body condition score system for cats. Feline Pract 1997;25:13-18. Kealy RD et al. Effects of diet restriction on life span and age-related changes in dogs. J Am Vet Med Assoc 2002;220:1315-1320.