

Arterielle Hypertonie

Fallbeispiel

Es ist früher Morgen im Wohnbereich eines Pflegeheims. Sie betreten das Zimmer von Frau Krause, einer 82-jährigen Bewohnerin mit Pflegegrad drei.

Frau Krause sitzt bereits im Sessel, doch ihr Verhalten wirkt anders als sonst. Sie hält sich mit einer Hand an der Sessellehne fest, als würde sie zusätzlichen Halt benötigen. Ihr Gesicht ist leicht gerötet und sie atmet etwas schneller als gewohnt. Als Sie die Bewohnerin begrüßen, reagiert Frau Krause gereizt und unruhig. Sie berichtet, dass sie kaum geschlafen habe und das es ihr heute „überhaupt nicht gut“ gehe. Ein Druckgefühl im Kopf mache ihr zu schaffen und sie fühle sich sehr erschöpft.

Sie beobachten, dass die adipöse Bewohnerin (BMI 30,4) sich beim Versuch aufzustehen unsicher bewegt und stärker als sonst nach Halt sucht. Auf Nachfrage erklärt Frau Krause, dass sie ihre morgendlichen Blutdruckmedikamente noch nicht eingenommen habe, weil sie erst frühstücken wollte. Sie erwähnt außerdem, dass sie am Vorabend Streit mit ihrer Tochter hatte und sich darüber sehr geärgert habe. Die Trinkmenge des Vortags lag bei etwa einem Liter, Schmerzen verneint sie.

Sie messen die Vitalparameter und dokumentieren folgende Werte:

- Der Blutdruck 198/112 mmHg
- Puls 96 S/Min.
- Atemfrequenz 22 AZ/Min.
- Sauerstoffsättigung 96 %

Frau Krause wirkt angespannt und überfordert. Da bei ihr ein Diabetes mellitus bekannt ist, führen Sie anschließend eine BZ-Kontrolle durch, die keine Auffälligkeiten zeigt.

Aufgabenstellung

1. Beschreiben Sie mit Hilfe von Novaheal die Grade der Hypertonie und bestimmen Sie das Stadium von Frau Krause.
2.
 - a) Wenden Sie Ihr Wissen zur Blutdruckregulation auf den Fall an: Beschreiben Sie mithilfe der Begriffe „Pressorezeptoren, Sympathikus/Parasympathikus und Vasodilatation“, wie der Körper von Frau Krause versucht, den Blutdruck kurzfristig zu regulieren
 - b) Erklären Sie, warum der Körper von Frau Krause den hohen Blutdruck nicht ausreichend ausgleichen kann und warum dadurch Stresssymptome wie schneller Puls oder Tachypnoe entstehen.
 - c) Erläutern Sie, warum die Kopfschmerzen von Frau Krause sowohl eine Ursache als auch eine Folge ihres erhöhten Blutdrucks sein können.
3. Bei der Entstehung eines Bluthochdrucks wird die „primäre“ und „sekundäre“ Hypertonie unterschieden. Stellen Sie den Unterschied mit eigenen Worten dar und begründen Sie, warum Frau Krause in die „primäre“ Form klassifiziert wird.
4.
 - a) Identifizieren Sie die im Fallbeispiel genannten Beobachtungen, die auf eine Veränderung des Blutdrucks bei Frau Krause hinweisen. Priorisieren Sie anschließend die drei wichtigsten, die für die unmittelbare pflegerische Einschätzung relevant sind. Begründen Sie Ihre Auswahl.
 - b) Vergleichen Sie Ihre Beobachtungen mit den in Novaheal aufgeführten typischen Symptomen einer Hypertonie. Ergänzen Sie Beschwerden, die bei Frau Krause NICHT auftreten.
 - c) Nennen Sie **drei** unmittelbare pflegerische Maßnahmen, die Sie bei Frau Krause aufgrund ihrer aktuellen Blutdruckwerte und Symptome durchführen würden. Begründen Sie jede Maßnahme.
4. Lesen Sie sich bitte die Diagnosverfahren auf Novaheal durch. Erklären Sie anschließend präzise, warum bei einer Hypertonie
 - die aufgeführten Laborparameter bestimmt werden (bitte einzeln aufführen!).
 - eine Dopplersonografie der hirnversorgenden Gefäße stattfindet
 - eine Echographie durchgeführt wird
5. Frau Krause soll zur Abklärung ihrer Hypertonie eine „24-Stunden-Blutdruckmessung“ durchführen. Erklären Sie der Bewohnerin in einfacher Sprache, wie dieses Verfahren durchgeführt wird und welche Aussagekraft es hat. Nehmen Sie dazu bitte den Artikel auf Ilias (und nur diesen 😊!) zur Hilfe.

6. Nennen Sie drei Beispiele dafür, wie Frau Krause selbst dazu beitragen kann, ihren Blutdruck langfristig zu senken. Beziehen Sie in Ihre Überlegungen die „Planung der Pflegemaßnahmen“ auf Novaheal mit ein:
<https://app.novaheal.de/app/knowledge/article/7uO8nMzBm3OUCx33wWagjX#5Fafksag1kEEODaaSlxbr1>
7. Wiederholen Sie wie die auf Novaheal genannten Antihypertensiva wirken und warum diese zur Behandlung einer Hypertonie eingesetzt werden.
8.
 - a. Rufen Sie den Artikel zu „hypertensiver Entgleisung“ und „hypertensivem Notfall“ auf. Erklären Sie kurz die beiden Formen und nennen Sie die drei wichtigsten Unterschiede.
 - b. Entscheiden Sie, ob der Blutdruckwert von Frau Krause (198/112 mmHg) eher einer hypertensiven Entgleisung oder einem hypertensiven Notfall entspricht. Beziehen Sie dabei auch ihre Symptome ein.

Arterielle Hypotonie

Lesen Sie den Artikel

<https://app.novaheal.de/app/knowledge/article/40zHooJQn3y5yXXH54KzDE> und beantworten Sie bitte anschließend folgendes Arbeitsblatt:

