

Malnutrition Universal Screening Tool (MUST)

Bodymass-Index

BMI [kg/m ²]	Punkte
≥ 20	0
18,5 – 20,0	1
≤ 18,5	2

+

Gewichtsverlust

ungeplant, in den
letzten 3–6 Monaten

Prozent	Punkte
≤ 5%	0
5 – 10%	1
≥ 10%	2

+

akute Erkrankung

Nahrungskarenz von
(voraussichtlich) mehr als
fünf Tagen
2 Punkte

Gesamtrisiko für das Vorliegen einer Mangelernährung

Summe	Risiko	Maßnahme	Durchführung
0	gering	→ Wiederhole Screening!	Klinik: wöchentlich Heim: monatlich ambulant: jährlich bei bestimmten Gruppen, z. B. Alter > 75 Jahre
1	mittel	→ Beobachte!	Klinik und Heim: Ernährungs- und Flüssigkeits- protokoll über 3 Tage ambulant: erneutes Screening in 1 bis 6 Monaten, ggf. EZ-Bestimmung (z.B. SGA) und Diätberatung
≥ 2	hoch	→ Behandle!	Klinik / Heim / ambulant: EZ-Bestimmung (z.B. SGA), Ernährungstherapie beginnen (Diätassistenz bzw. hauseigene Protokolle). Abfolge: 1. Nahrungsmittel, 2. angereicherte Nahrung, 3. orale Supplemente

EZ = Ernährungszustand

Copyright der deutschen Übersetzung:
Dr. Tatjana Schütz, Tel. 030/450514059, elke-tatjana.schuetz@charite.de