


Intertrigo

Häufigkeit

Ein Intertrigo weist bei den über 80-Jährigen Prävalenzraten von mehr als 20% auf.

Ein Intertrigo ist eine entzündliche Hauterkrankung, die zumeist in aufeinanderliegenden Hautfalten durch „Wundreiben“ entsteht. Geeignete pflegerische Maßnahmen helfen, die schmerzhafteste Hauterkrankung und Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen zu vermeiden. Es zeigt sich an scharf begrenzten Hautrötungen, Juckreiz, Brennen, rote und nässende Entzündung der Haut, Risse, Schmerzen und/ oder Krustenbildung.



Pathogenese

Ursächlich ist eine Haut-an-Haut-Reibung in den erkrankten Arealen in Kombination mit einer Feuchtigkeitserhöhung und einer hieraus resultierenden Schwächung der Hautbarriere. Übergewicht, ein begleitender Diabetes mellitus, Kleidung aus synthetischen Fasern und eingeschränkte Mobilität sind Risikofaktoren.

Diagnose

Eine Intertrigo kann individuell unterschiedlich schnell entstehen und sich durchaus innerhalb eines Tages entwickeln. Typisch sind Entzündungszeichen wie Rötung, Überwärmung und Schmerzen und/oder allgemeine Hautirritationen wie Pickelchen, Bläschen und Hautrisse an den betroffenen Hautflächen und Hautfalten. Verursacht wird die entzündliche Hauterkrankung durch Reibung, gestaute Wärme und Feuchtigkeit. Als gefährdete Bereiche gelten die Bereiche unter den Brüsten (meist bei Frauen), in den Bauchfalten, im Bauchnabel, in der Leiste, an den Innenseiten der Oberschenkel, in der Analfalte, in der Dammregion, unter den Hoden, in den Zwischenräumen der Finger und Zehen und in den Achselhöhlen. Weniger häufig werden bei bestehenden Kontrakturen beispielsweise die Bereiche in den Ellen- und/oder Kniebeugen sowie bei Adipositas in der Hals- oder Kinnfalte beschrieben. Auch die Region hinter den Ohren, die Augenlider, Mundwinkel und Hautfalten, die durch Ödeme verursacht werden, können betroffen sein.

Feuchtigkeit verursacht Mazerationen (Aufweichen der Haut)

Zwischen Hautflächen, die längere Zeit aufeinander liegen, kann es zum Feuchtigkeitsstau und damit zu Aufweichungen der Haut (Mazerationen) kommen. Über längere Zeit unbeachtet, führt dies zu Reizungen und/oder zum „Wundreiben“. Begünstigend für die Entstehung einer Intertrigo sind:

■ Übermäßiges Schwitzen

Besonders häufig bei Erkrankungen die mit Fieber einhergehen, bei Übergewicht, Diabetes mellitus, Apoplex, Morbus Parkinson

■ Inkontinenz

Luftundurchlässige Inkontinenzvorlagen lassen Feuchtigkeit nicht verdunsten, Inhaltsstoffe des Urins und Stuhl schädigen die Haut zusätzlich

■ Falsche/mangelnde Hautpflege

Pflegemittel mit stark austrocknenden chemischen Substanzen greifen den Säureschutzmantel an oder können zu allergischen Reaktionen führen. Nachlässiges Abtrocknen in Hautfalten oder Zehenzwischenräumen führt zu feuchten Kammern ebenso wie übermäßiges Auftragen von stark wasserhaltigen Cremes oder Lotionen

■ Bewegungsmangel

Bei Bettlägerigkeit besonders im Kontext mit Lähmungen, Kontrakturen und Spastiken können durch mangelnde Belüftung feuchte Kammern in den gefährdeten Bereichen entstehen

■ Warme Umgebungstemperatur

Vor allem im Sommer kommt es zu Stauungswärme in den gefährdeten Bereichen und damit zu vermehrtem Schwitzen

Prophylaxe im Pflegealltag

Durch das feuchte Milieu, das einen idealen Nährboden für Bakterien und Pilze bildet, kommt es häufig zu Sekundärinfektionen mit Candida. Wichtig ist daher

eine aufmerksame – gegebenenfalls tägliche – Hautinspektion sowie gerade bei inkontinenten Betroffenen die regelmäßige Kontrolle auf Einnässen.

Für die Hautpflege und Problemstellenversorgung empfehlen sich regelmäßige Waschungen ohne Zusätze oder mit auf den Hauttyp abgestimmten Präparaten. Das Wasser darf dabei nicht zu heiß sein. Beim Einsatz von Cremes sollten Wasser-in-Öl-Emulsionen bevorzugt werden – je nach Verträglichkeit. Für die Pflege bereits betroffener Hautregionen ist klares Wasser zu verwenden. Nur sichtbare Verunreinigungen werden mit pH- neutraler Seife oder ähnlichen Reinigungsmitteln beseitigt. Auf Puder ist zu verzichten. Es können sich Klumpen bilden und/oder Krusten entstehen. Diese fördern zum einen die Reibung zwischen den Hautfalten, zum anderen bilden sie den Nährboden für Pilze und Bakterien. Auch Fettsalben sollten nicht verwendet werden, da diese luftdicht abschließen und die Haut nicht mehr ausreichend „atmen“ kann. Die betroffenen Bereiche sollten darüber hinaus nicht mit einem Deodorant oder Parfüm in Kontakt kommen.

Um die Hautfalten trocken zu halten, empfiehlt sich sorgfältiges und gründliches Abtrocknen. Die gefährdeten Bereiche vorsichtig aber gründlich trocken tupfen, nicht reiben oder „rubbeln“. Das Aufeinanderliegen von Hautfalten lässt sich durch Einlegen von Kompressen (Foto 1) vermeiden. Besonders geeignet sind Vlieskompressen, da sie nicht so hart sind. Weil die Kompressen die Feuchtigkeit binden, sind sie regelmäßig und bedarfsgerecht zu wechseln.

Wichtig: Der/ Die Betroffene sollte atmungsaktive Kleidung tragen, die nicht zu eng anliegt und auftretende Feuchtigkeit absorbiert. Besonders geeignet ist Baumwollkleidung. Die Betroffenen sollten nicht zu warm angezogen sein. Durchfeuchtete oder durchgeschwitzte Kleidung muss umgehend gewechselt werden.

Mobilität fördern

Immobilie Pflegebedürftige sollten so gelagert werden, dass eine gute Hautbelüftung möglich ist. Das heißt, die gefährdeten Bereiche werden möglichst frei gelagert.

Mit Hilfe eines individuellen Bewegungsplans wird der/die Betroffene in kurzen Abständen umgelagert. Bei jedem Positionswechsel erfolgt eine Inspektion gefährdeter Bereiche, um Hautveränderungen frühzeitig zu erkennen. Durch die Auswahl einer geeigneten Matratze, durch Anleitung und Motivation kann der

/die Betroffene angeregt werden, die Fähigkeiten zum eigenständigen Positionswechsel wiederzuerlangen oder auszubauen.

Die Betroffenen einbinden

Die Pflegeempfänger/innen müssen verstehen, wie wichtig prophylaktische Maßnahmen zur Vermeidung einer Intertrigo für sie selbst sind. Sie sollten daher angeleitet und über das Krankheitsbild informiert werden, über hygienische und pflegerische Maßnahmen, körperliche Aktivitäten im Rahmen ihrer Möglichkeiten sowie über die Risiken, die mit der bisherigen Versorgung einhergehen. Denn mit einem motivierten und aufgeklärten Bewohner lassen sich Prophylaxemaßnahmen in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zielführender umsetzen. Die Pflegekraft sollte zudem alle Aspekte rund um eine gesunde Ernährung und die damit einhergehende Gewichtsreduktion thematisieren – gerade bei adipösen Betroffenen.

Besondere Achtsamkeit bei Inkontinenz

Maßnahmen zur Vermeidung und/oder Linderung einer Inkontinenz können gerade bei Menschen mit hohem Intertrigo-Risiko helfen, solche Hautschäden zu vermeiden. Dazu zählen das Toilettentraining, Beckenbodengymnastik, die Nutzung von Hilfsmitteln wie zum Beispiel Vorlagen und/oder Schutzhosen ohne Plastik.

Die tägliche Inspektion der Haut, das sofortige Säubern des Intimbereiches nach Ausscheidung, die Reinigung mit klarem Wasser und/oder pH-neutraler Seife und das konsequente Trockenhalten der gefährdeten Bereiche minimiert nicht nur die Auswirkungen der Inkontinenz, sondern auch das Risiko, an einer Intertrigo zu erkranken. Zusätzlich steigern die Maßnahmen das Wohlbefinden der Betroffenen und damit deren Lebensqualität.

Fazit für die Pflege

- Ständiges Jucken und Brennen – für die Betroffenen bedeutet eine Intertrigo eine Einschränkung der Lebensqualität. Nässende Bereiche können zudem unangenehme Gerüche verursachen. Schmerzen bei der Bewegung immobilisieren und isolieren die Betroffenen zusätzlich.
- Geeignete Prophylaxemaßnahmen (z.B. Hautinspektion, Lagerungswechsel) helfen, der Entstehung von Intertrigo vorzubeugen.

■ Der Aufwand zur Behandlung einer Intertrigo ist bei immobilen Betroffenen hoch und muss über einen längeren Zeitraum betrieben werden. Der Prophylaxeaufwand ist dagegen deutlich geringer – für alle Beteiligten.

Foto Vlieskompressen:



Foto Bauchfalte:



Foto Brust:



Foto Intimbereich:

