

CE 02 UE4

URINBEOBACHTUNG UND MIKTION / MIKTIONSSTÖRUNGEN

Frau Küppers

Bitte nutzen Sie diese Präsentation als inhaltliche Grundlage.
Notieren Sie sich bitte weitere Informationen, die im Unterricht besprochen werden.







VGL. AUCH

NOVAHEAL

[HTTPS://APP.NOVAHEAL.DE/APP/KNOWLEDGE/ARTICLE/27YPH6FZZ0ZOYKKJ3UVSUK](https://app.novaheal.de/app/knowledge/article/27YPH6FZZ0ZOYKKJ3UVSUK)



ÜBERSICHT ÜBER DAS HARNSYSTEM




Das Harnsystem kann in **zwei Teile** eingeteilt werden

Die Nieren als **harnproduzierende** Organe und Hormondrüse.

Niere (Ren): dient der Filterung des Blutes und Bildung des Harns, sowie der Hormonproduktion.

ÜBERSICHT ÜBER DAS HARNSYSTEM




Das Harnsystem kann in **zwei Teile** eingeteilt werden

Die **harnableitenden** Organe, bestehend aus Nierenbecken, Harnleiter, Harnblase und Harnröhre, als Harnwege

- **Nierenbecken**: empfängt den Harn und gibt ihn an den Harnleiter weiter.
- **Harnleiter** (Ureter): transportiert den Harn zur Harnblase.
- **Harnblase** (Vesica urinaria): sammelt den Harn, um ihn ab einer bestimmten Menge über die Harnröhre aus dem Körper zu leiten.
- **Harnröhre** (Urethra): befördert den Harn von der Harnblase über die äußeren Geschlechtsorgane aus dem Organismus.

URIN



- DAS HARNSYSTEM DIENT DER AUSSCHIEDUNG UND FILTERUNG ZAHLREICHER STOFFE AUS DEM MENSCHLICHEN KÖRPER. ZUDEM IST ES FÜR DIE REGULATION DES FLÜSSIGKEITS- UND SALZHAUSHALTS ZUSTÄNDIG.
- DIE GESAMTHEIT DER AUSZUSCHIEDENDEN STOFFE NENNT SICH **HARN** ODER **URIN**.

• ZUSAMMENSETZUNG DES URINS

- 95% WASSER
- ENDPRODUKTE DES EIWEIßSTOFFWECHSELS (HARNSTOFF, KREATININ, HARNSÄURE)
- SALZE (Z.B. KOCHSALZ)
- SÄUREN (Z.B. ZITRONENSÄURE)
- SCHLEIM
- FARBSTOFF AUS DEM ABBAU VON ROTEN BLUTKÖRPERCHEN (UROBILINOGEN)
- WASSERLÖSLICHE VITAMINE
- HORMONE

DER PH-WERT VOM URIN BETRÄGT CA. 5-6





<https://www.heilpraxisnet.de/symptome/milchiger-urin-trueber-urin-ursachen-symptome-therapie/>

TAUSCHEN SIE SICH IN PARTNERARBEIT AUS:

- WARUM KÖNNTE ES WICHTIG SEIN, DEN URIN ZU BEOBACHTEN?
- WAS KANN ICH BEI DER URINBEOBACHTUNG ERKENNEN?
- NOTIEREN SIE IHRE ERGEBNISSE AUF DEN BEIDEN NACHFOLGENDEN FOLIEN.



<https://stock.adobe.com/images/3d-mannchen-denkt-nach-rotes-fragezeichen/181003626>

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with several realistic water droplets of various sizes. Some droplets are located in the top-left corner, others in the top-right, and a cluster of larger droplets is in the bottom-right corner. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

**DIE URINBEOACHTUNG IST
WICHTIG, UM**

KRITERIEN DER URINBEOBACHTUNG



URINFARBE

NORMAL

DER HARN EINES
GESUNDEN MENSCHEN IST
BEI BETRACHTUNG _____,
_____ UND BESITZT
EINEN LEICHT _____ PH-
WERT.



<https://www.berliner-kurier.de/ratgeber/merkwuerdige-urinfarbe-diese-krankheiten-koennen-der-grund-sein-li.2210660>

FARBVERÄNDERUNG DES URINS

- KANN BEI GESUNDEN MENSCHEN AUFTRETEN, WENN SIE Z.B. ZU WENIG GETRUNKEN ODER LEBENSMITTEL WIE ROTE BEETE GEGESSEN HABEN
- KANN ABER AUCH EIN ZEICHEN FÜR EINE ERKRANKUNG SEIN, Z.B. WENN VIEL ZU WENIG GETRUNKEN WIRD ODER EINE ENTZÜNDUNG IM HARNSYSTEM VORHANDEN IST



https://www.google.com/search?client=firefox-b-es&sa=us&as=3ba3f7c6207a53&channel=ntp&udm=3&bs=41&imgKQh6wpocn18KLPMw8n5LfnfGPHLgJ2wEqsErR3-mKuWiz2D-sVXFEmdK1aT4M_sWr3n3Dd2pueyTk074yG_0NZ60IQ85YatKR3LTVFwGKA6op8PmmV1_Q7eEH7-kiAdoKERwqW3PGh4JJQy_8Do9CmbW_O_s6EODwlmGt3tVfVf_3J8_SH5eeW15v2MCTvJmWfC9Lle5RI09mselw&q=rote+beete&sa=X&ved=2ahUKEwjBilrOguyPAxv8BRKQEH3R3FtsQIKgLegQIFRAB&w=1680&bih=857#vhid=Hl-gT2M9ph544M&vssid=mosaic



<https://www.heilpraxisnet.de/symptome/milchiger-urin-trueber-urin-ursachen-symptome-therapie/>

FARBVERÄNDERUNGEN DES URINS

PHYSIOLOGISCHE (NORMALE) FARBE



<https://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Warum-ist-Urin-gelb-article22450741.html>


PATHOPHYSIOLOGISCHE (DURCH KRANKHEITEN BEDINGTE) VERÄNDERUNG

WICHTIG:

BEI DIESEN FARBVERÄNDERUNGEN BITTE UNBEDINGT EINE PFLEGEFACHKRAFT INFORMIEREN!



(DIESES SYMBOL STEHT AB JETZT IMMER DAFÜR, WENN SIE EINE PFLEGEFACHKRAFT ÜBER IHRE BEOBACHTUNG INFORMIEREN MÜSSEN)



<https://vivoy.com/blogs/ratgeber/urinfarbe>

FARBVERÄNDERUNGEN DES URINS

GRÜNER URIN



<https://login.medscape.com/login/sso/getlogin?sc=ng&wcod=e=102&client=205502&scode=msp&urlCache=aHR0cHM6Ly9kZXV0c2NoLm1lZHNjYXBILmNvbS9kaWFzaG93LzQ5MDA1MDMw>

BRAUNER URIN



https://www.reddit.com/r/Anemic/comments/1cc70b4/urine_dar_k_brownish_red_immediately_after_venofer/?tl=de

BLUT IM URIN



Urin<https://www.esanum.de/today/posts/mehr-patientensicherheit-bei-blut-im-urin>

WEITERE FARBVERÄNDERUNG

Farbe des Urins	Mögliche Bedeutung
Trüb, flockig	Harnwegsinfektion, Eiter, Fibrin
Milchig	Harnwegsinfektion, Geschlechtskrankheit, hoher Eiweißanteil durch Nierenfunktionsstörung



Fallbeispiel: Trübung bei Harnwegsinfekt

Die Trübung wird besonders durch das unterlegte Schriftstück deutlich. Sie war verursacht durch Leukozyten, Bakterien und ausgefallene Salze.
(Leukozyten $>500/\mu\text{l}$, pH 9, Nitrit positiv, Karbonate und wahrscheinlich Phosphate. Der Harn roch stark.)

BEIMENGUNGEN

SUBSTANZEN, DIE NORMALERWEISE NICHT ODER ZUVIEL IM URIN ENTHALTEN SIND, Z.B

- ROTE BLUTKÖRPERCHEN (_____), Z.B. BEI BLUTUNGEN UND ENTZÜNDUNGEN
- WEIßE BLUTKÖRPERCHEN (_____), Z.B. BEI ENTZÜNDUNGEN
- EITER (_____), Z.B. BEI EITRIG ENTZÜNDLICHEN PROZESSEN
- BAKTERIEN (_____), Z.B. BEI ENTZÜNDUNGEN
- ZUCKER (_____), Z.B. BEI DIABETES MELLITUS
- KETONE (_____), Z.B. BEI DIABETES MELLITUS
- EIWEIß (_____), Z.B. BEI SCHÄDIGUNG DER NIERE

(DIESE BEIMENGUNGEN LASSEN SICH ÜBER URINUNTERSUCHUNGEN, Z.B. STREIFENSCHNELLTESTS NACHWEISEN)



GERUCH

DER GERUCH ENTSTEHT
DURCH GELÖSTE _____
UND SPUREN VON _____.
NORMAL IST ER
UNAUFFÄLLIG. ERST BEI
LÄNGEREM STEHEN WIRD ER
STECHEND.



<https://www.zavamed.com/de/urin-mit-geruch.html>

GERUCHSVERÄNDERUNGEN

Beobachtungskriterium	Veränderung	Ursachen
Geruch unauffällig	physiologische Abweichungen	
	typischer Geruch nach Speisen	z. B. Spargel
	pathologische Veränderungen	
	Foetor hepaticus (intensiv, süßlich, frische Leber)	Lebererkrankungen
	Azetongeruch (obstartig)	Diabetes mellitus, beim Fasten
	Ammoniak (beißend, „Pferdestallgeruch“)	bei Harnwegsinfekten oder nach längerem Stehen



MENGE

DIE NORMALE MENGE DIE EIN MENSCH PRO TAG AUSSCHIEDET BETRÄGT CA. 1500-2000 ML UND IST UNTER ANDEREM ABHÄNGIG VON

- DER TRINKMENGE
- DER ERNÄHRUNG (BESTIMMTE SPEISEN Z.B. MELONE, ENTHALTEN VIEL WASSER)
- KÖRPERLICHE AKTIVITÄT (Z.B. VERBUNDEN MIT ERHÖHTEM SCHWEIßAUFGKOMMEN)
- UMGEBUNGSFAKTOREN (Z.B. HITZE, HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT)
- GESUNDHEITSZUSTAND (Z.B. NIERENFUNKTIONSTÖRUNG)
- HORMONELLE REGULATION (Z.B. „NIERENHORMONE BEEINFLUSSEN MENGE“)
- ALTER (KINDER PRODUZIEREN WENIGER URIN ALS ERWACHSENE)

MENGE

DIE NORMALE MENGE DIE EIN **ERWACHSENER** MENSCH PRO TAG AUSSCHIEDET BETRÄGT CA. 1500-2000 ML.

Urinmenge	Medizinische Bezeichnung	Mögliche Erkrankung
1 500–2 000 ml/Tag	Normale Urinmenge	Keine
> 2 500–3 000 ml/Tag	Polyurie	Diabetes mellitus
< 500 ml/Tag	Oligurie	Dehydration, Niereninsuffizienz
< 100 ml/Tag	Anurie	Akutes Nierenversagen, Harnverhalt durch mechanisches Hindernis



pathologisch {

BEI **KINDERN** IST DIE NORMALE MENGE GERINGER:

- NEUGEBORENES (5-10 ML / 8-10 X TÄGLICH)
- SÄUGLINGE (15-30 ML / 12-18 X TÄGLICH)
- KINDER IM SCHULFÄHIGEN ALTER (CA. 150 ML / 6-8 X TÄGLICH)

ÜBERPRÜFEN SIE IHR WISSEN

BITTE LESEN SIE SICH DIE PRÄSENTATION BIS HIER NOCH EINMAL DURCH UND LÖSEN ANSCHLIEßEND DAS KREUZWORTRÄTSEL. RUFEN SIE DAZU FOLGENDEN LINK AUF.

[HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/WATCH?V=PEH7IHRKT24](https://learningapps.org/watch?v=PEH7IHRKT24)



https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen

1. ORGAN, IN DEM URIN PRODUZIERT WIRD
2. BESTANDTEIL DES URINS
3. ROTE BLUTKÖRPERCHEN IM URIN
4. FARBVERÄNDERUNG BEI DEHYDRATATION
5. GERUCHSVERÄNDERUNG DES URINS BEI LÄNGEREM STEHEN
6. URINPRODUKTION UNTER 100 ML / TAG
7. FACHBEGRIFF HARNRÖHRE
8. WENN DER URIN SO AUSSIEHT, SOLLTEN SIE MEHR TRINKEN
9. BEI EINER HARNWEGSINFEKTION WIRD DER URIN ...
10. BEIMENGUNG DES URINS BEI ENTZÜNDUNG
11. ÜBERSETZUNG: URETER
12. URSACHE FÜR EINEN ORANGE-BRAUNEN URIN
13. FACHBEGRIFF: EIWEIß IM URIN
14. BEI DIESER ERKRANKUNG RIECHT DER URIN "OBSTARTIG,,
15. URINAUSSCHIEDUNG ÜBER 2500 ML / TAG
16. ZUCKER IM URIN
17. KRITERIUM DER URINBEOBACHTUNG
18. PHYSIOLOGISCHE URSACHE FÜR ROTEN URIN
19. SUBSTANZEN, DIE NORMALERWEISE NICHT ODER ZUVIEL IM URIN ENTHALTEN SIND WERDEN ALS ... BEZEICHNET
20. ANDERER NAME FÜR URIN

DIE BLASENENTLEERUNG (MIKTION)


DAS _____ DER HARNBLASE EINES ERWACHSENEN BETRÄGT _____. BEREITS BEI _____ ENTSTEHT _____.

DURCH DEHNUNGSREZEPTOREN IN DER BLASENWAND WIRD DIESES GEFÜHL AUSGELÖST UND AN DAS GEHIRN GESENDET.

DER ÄUßERE (QUERGESTREIFTE) BLASENSCHLIEßMUSKEL VERHINDERT EINE VORZEITIGE ENTLEERUNG. EINE MIKTION KANN ERST ERFOLGEN, WENN SICH DER INNERE UND ÄUßERE BLASENSCHLIEßMUSKEL ÖFFNET.

DIE BLASENMUSKULATUR ZIEHT SICH ZUSAMMEN (KONTRAKTION), DAMIT ES ZU EINER VOLLSTÄNDIGEN BLASENENTLEERUNG KOMMT. DURCH DIE KONTRAKTION DER BAUCH- UND BECKENBODENMUSKULATUR WIRD DER DRUCK AUF DIE HARNBLASE ERHÖHT, SO DASS DER URIN „IM STRAHL“ ABFLIEßEN KANN.

BLASENENTLEERUNG



<https://community.paraplegie.ch/de/wiki/blase-darm/blasenlaehmungen>


BLASENSCHLIEßMUSKEL



Innerer Schließmuskel
(nicht bewusst steuerbar)





Äußere Schließmuskel
(bewusst steuerbar)




<https://www.schwabe.at/harnblase/>

STEUERUNG DER MIKTION DURCH NERVEN



SITZ DES MIKTIONSZENTRUMS



GEFÜHL DES HARNDRANGES




Abb. 9.9: Sagittalschnitt durch das Gehirn.

ÜBERPRÜFEN SIE IHR WISSEN

WAS HABEN SIE VON DEM
VORTRAG BEHALTEN?

FÜLLEN SIE DIE LÜCKEN
AUS:

[HTTPS://LEARNINGAPPS.ORG/
WATCH?V=POX0M5QNN24](https://learningapps.org/Watch?v=POX0M5QNN24)



[https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword
&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen](https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen)

MIKTION / MIKTIONSFREQUENZ

PHYSIOLOGISCH

DIE MIKTION

- ERFOLGT IM STRAHL
- SCHMERZLOS
- WILLKÜRLICH

DIE ENTLEERUNGSPHASE DAUERT
CA. 20-30 SEC

DIE MEISTEN MENSCHEN MÜSSEN
ETWA _____ TÄGLICH ZUR
TOILETTE, MEISTENS TAGSÜBER.

DIE MIKTIONSFREQUENZ IST U.A. **ABHÄNGIG VON**


- AUFREGUNG / ANGST
- EKEL / SCHAMGEFÜHL
- NICHTVORHANDENSEIN
GEEIGNETER ÖRTLICHKEITEN
- ORGANFUNKTION
- DRUCKVERHÄLTNISSEN
- FÜLLUNGSZUSTAND DES
GEFÄßSYSTEMS

VERÄNDERUNG DES HARNSTRAHLS

PATHOLOGISCH



- **ABGESCHWÄCHTER**, „SCHLAFFER“ HARNSTRAHL (VERZÖGERTER MIKTIONSBEGINN, VERLÄNGERUNG DER MIKTIONSZEIT Z.B. BEI PROSTATAVERGRÖßERUNG)
- **UNTERBROCHENER** HARNSTRAHL „HARNSTOTTERN“ (IN SEHR KURZEN, MIT ZEITLICHEN ABSTÄNDEN SCHNELL HINTEREINANDER ERFOLGENDE MIKTION Z.B. BEI VERLEGUNG DER HARNRÖHRE DURCH TUMORE ODER BEI ANGST/SCHAM IN GEGENWART VON ANDEREN URIN ZU LASSEN)
- **HARNTRÄUFELN** (TROPFENWEISER, UNBEABSICHTIGTER ABGANG VON URIN ODER ANDAUERNDEN TROPFEN Z.B. BEI CHRONISCHER HARNRETENTION; NACHTTRÄUFELN Z.B. BEI HARNRÖHRENERWEITERUNG)
- **GESPALTENER GEDREHTER** HARNSTRAHL (Z.B. BEI HARNRÖHRENVERENGUNG, NARBENBILDUNG NACH DIAGNOSTISCHEN EINGRIFFEN ODER HARNRÖHRENENTZÜNDUNGEN)



STÖRUNGEN DER MIKTIONSFREQUENZ

PATHOLOGISCH



- **POLLAKISURIE:** ERHÖHUNG DER MIKTIONSFREQUENZ BEI ERNIEDRIGTER MIKTIONSMENGE, URINMENGE ÜBER 24 STUNDEN KANN ABER NORMAL SEIN (Z.B. BEI BLASENENTZÜNDUNG)
- **ALGURIE / DYSURIE:** SCHMERZHAFTES WASSERLASSEN / UND ERSCHWERTES WASSERLASSEN (Z.B. BEI BLASENENTZÜNDUNG)
- **NYKTURIE:** VERMEHRTES WASSERLASSEN IN DER NACHT (Z.B. BEI HERZSCHWÄCHE)

STÖRUNGEN DER MIKTION

- **HARNVERHALT (= RETENTION)**: UNVERMÖGEN, DIE GEFÜLLTE BLASE ZU ENTLEEREN (Z.B. DURCH MEDIKAMENTE, DIE FÜR EINE NARKOSE GEGEBEN WERDEN)
- **RETHARN**: HARN, DER NACH DEM MIKTIONSVORGANG IN DER HARNBLASE VERBLEIBT UND DAMIT DAS RISIKO EINER HARNWEGSINFEKTION DEUTLICH ERHÖHT. PATHOLOGISCHE MENGE: 50-100 ML (Z.B. DURCH EINE PROSTATAVERGRÖßERUNG, DIE DIE HARNRÖHRE VERSCHLIEßT)
- **HARNINKONTINENZ**



ÜBERPRÜFEN SIE IHR WISSEN

ORDNEN SIE DIE RICHTIGEN
ANTWORTEN ZU

[HTTPS://LEARNINGAPPS.OR
G/DISPLAY?V=P9F3NGM3C24](https://learningapps.org/Display?V=P9F3NGM3C24)



[https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword
&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen](https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen)

UNTERSCHIEDUNG

HARNKONTINENZ

- IST DIE FÄHIGKEIT, WILLKÜRLICH UND ZUR PASSENDEN ZEIT AN EINEM GEEIGNETEN ORT DIE BLASE ZU ENTLEEREN.

KONTINENZ BEINHALTET WEITERHIN DIE FÄHIGKEIT, BEDÜRFNISSE ZU KOMMUNIZIEREN, UM HILFESTELLUNGEN ZU ERHALTEN, WENN EINSCHRÄNKUNGEN BEIM SELBSTÄNDIGEN TOILETTENGANG BESTEHEN.

HARNINKONTINENZ

- IST JEDLICHER UNWILLKÜRLICHER HARNVERLUST.


INKONTINENZFORMEN

1. _____ INKONTINENZ (IST DIE UNFÄHIGKEIT EINES NORMALERWEISE KONTINENTEN MENSCHEN, DIE TOILETTE RECHTZEITIG ZU ERREICHEN, UM EINEN UNWILLKÜRLICHEN URINABGANG ZU VERMEIDEN)
2. _____ HARNINKONTINENZ (EINE AKUTE HARNINKONTINENZ, DIE NACH DER BEHANDLUNG Z.B. EINER HARNWEGSINFEKTION WIEDER VERSCHWINDET)
3. _____ HARNINKONTINENZ (EINE HARNKONTINENZ, DIE DAUERHAFT BLEIBT)

CHRONISCHE HARNINKONTINENZ

HAUPTFORMEN

- **BELASTUNGSINKONTINENZ**
(Z.B. BEDINGT DURCH EINE
SCHWÄCHUNG DES
BECKENBODENS)
- **DRANGINKONTINENZ** (Z.B.
BEDINGT DURCH EINE
SCHÄDIGUNG VON NERVEN)



RISIKOFAKTOREN FÜR EINE HARNINKONTINENZ

PERSONENBEZOGENE RISIKOFAKTOREN

- GEISTIGE EINSCHRÄNKUNGEN
- KÖRPERLICHE EINSCHRÄNKUNGEN INSBESONDERE IN DER MOBILITÄT
- CHRONISCHER HUSTEN
- MEDIKAMENTE
- HARNWEGSINFEKTION
- VERSTOPFUNG (OBSTIPATION)
- ÜBERGEWICHT
- GEBURTEN (INSBESONDERE GROßER KINDER)
- ERKRANKUNGEN DER PROSTATATA / OPERATIONEN DER PROSTATATA

UMGEBUNGSBEDINGTE RISIKOFAKTOREN

- ERREICHBARKEIT VON TOILETTEN
(Z.B.: WEITE WEGE, UNBEZWINGBARE TREPPEN, SCHLECHTE BESCHILDERUNG, UNKLARE KENNZEICHNUNG)
- NUTZBARKEIT VON TOILETTEN
(Z.B.: UNGEEIGNETE SITZHÖHE, FEHLENDE ODER UNBENUTZBARE HALTEGRIFFE, UNGEEIGNETE BELEUCHTUNG, ABSTOßENDER HYGIENISCHER ZUSTAND)
- ZUGÄNGLICHKEIT VON TOILETTEN
(Z.B.: UNGEEIGNETE TÜRGRIFFE, ZU SCHWERE ODER ZU ENGE TÜREN, HINDERNISSE)

WAS KÖNNEN BETROFFENE TUN?



Allgemein

- Regelung der Flüssigkeitszufuhr
- Gewichtsreduktion
- Obstipationsprophylaxe
- Anpassen der Kleidung

Hilfsmittel

- Auffangende Hilfsmittel
- Aufsaugende Hilfsmittel

ALLGEMEINE MAßNAHMEN

REGELUNG DER FLÜSSIGKEITZUFUHR

- GERINGE TRINKMENGE FÜHRT ZU EINER HOHEN URINKONZENTRATION UND DAMIT ZU EINEM VERSTÄRKTEN HARNDRANG.
- KOFFEIN VERSTÄRKT DIE DRANGPROBLEMATIK.
- RÜCKSICHTNAHME AUF INDIVIDUELLEN FLÜSSIGKEITSBEDARF UND TRINKMENGE.
 - BEACHTET: ÄRZTLICH VERORDNETE FLÜSSIGKEITSEINSCHRÄNKUNG

GEWICHTSREDUKTION

- GEWICHT WIRD VOM BECKENBODEN GENOMMEN (VORBEUGUNG BELASTUNGSINKONTINENZ)

ALLGEMEINE MAßNAHMEN

OBSTIPATIONS- PROPHYLAXE

VERSTOPFUNG FÖRDERT
INKONTINENZPROBEMATIK
DURCH STARKES PRESSEN.

Orientierung schaffen

Beschilderung, Nachtlicht

Insbesondere bei funktioneller
Inkontinenz



ANPASSEN DER KLEIDUNG

ANFORDERUNGEN

- SCHNELL ZU ÖFFNEN (KLETTVERSCHLÜSSE, GUMMIZUG)
- BEQUEM UND LEICHT
- LUFT- UND FEUCHTIGKEITSDURCHLÄSSIG
- BEDRUCKTE, FARBIGE UND DUNKLE STOFFE
- PFLEGELEICHT
- RUTSCHFESTE SCHUHE
 - STURZGEFAHR



MOBILE UND AUFFANGENDE HILFSMITTEL

URINFLASCHEN



© URBAN u FISCHER
Pflege Technik 1. Auflage, 2001

STECKBECKEN
(„BETTPFANNE“)




© URBAN u FISCHER
Pflege Technik 1. Auflage, 2001

TOILETTENSTÜHLE



MOBILE UND AUFFANGENDE HILFSMITTEL


Kondomurinal



Urinkollektor mit
mobilem Harnab-
leitungssystem



Blasenkatheeter mit
Harnableitungssystem
für immobile Pflege-
empfänger



AUFSAUGENDE / ABSORBIERENDE HILFSMITTEL

- SAUGFÄHIGE EINLAGEN UND BETTUNTERLAGEN
- NETZHOSEN SOWIE INKONTINENZSLIPS



ÜBERPRÜFEN SIE IHR WISSEN

FRAU MELINEK IST 58 JAHRE ALT. SIE WIEGT 84 KG BEI EINER GRÖÖE VON 1,64 M. SIE HAT DREI KINDER UND ARBEITET IN DER BETTENAUFBEREITUNG IN EINEM KRANKENHAUS. AUFGRUND DER ARBEITSBELASTUNG KANN SIE SELTEN EINE PAUSE MACHEN. WENN SIE ES SCHAFFT, RAUCHT SIE SCHNELL EINE ZIGARETTE UND TRINKT EINEN KAFFEE. SEIT EINIGER ZEIT MERKT SIE, DASS SIE WÄHREND DER ARBEIT TRÖPFCHENWEISE HARN VERLIERT.

1. UM WELCHE FORM DER INKONTINENZ HANDELT ES SICH WAHRSCHEINLICH BEI FRAU MELINEK?
2. WELCHE RISIKOFAKTOREN KÖNNEN ZU DER HARNINKONTINENZ BEIGETRAGEN HABEN?
3. WAS KÖNNTE FRAU MELINEK TUN, UM IHRE KONTINENZ ABZUMILDERN? GEBEN SIE IHR DREI EMPFEHLUNGEN.



https://de.freepik.com/freie-psd/grundlegender-vermarktungscharakter_415578508.htm#fromView=keyword&page=1&position=1&uuid=00b0d711-31f2-4e0f-887e-9a27cefde05a&query=3d+maennchen