

## ÜBERAUS BREIT GEFÄCHERT: DIE MOTORISCHE ENTWICKLUNG

Gerade in der Entwicklung ihrer Beweglichkeit zeigen Babys große zeitliche Unterschiede. Manche beginnen schon früh mit dem freien Sitzen, andere tun dies erst sehr viel später. Viele Babys rollen sich schon sehr früh auf die Seite und in eine andere Lage, andere tun dies erst gegen Ende des 1. Lebensjahres. Und nicht nur das: Viele Kinder durchlaufen innerhalb zweier Monate mehrere Entwicklungsschritte der Körpermotorik fast nebeneinander, andere tun dies Schritt für Schritt. Aber die meisten Babys in unserem Kulturkreis, die sich normal entwickeln, können schließlich mit 10 Monaten frei sitzen.



Sobald Ihr Baby hierfür bereit ist, bringt es sich Kriechen, Sitzen, Aufstehen und Gehen selbst bei. Dabei lernen die meisten Kinder das freie Gehen über Robben, Kriechen, auf allen Vieren laufen usw. Andere lassen diese Zwischenstufen aber einfach aus, und einige Kinder entwickeln ihre ganz eigene Art der Fortbewegung, z. B. Schlängeln, Rutschen, Rollen, bevor sie gehen lernen. Die oben stehende Übersicht kann daher nur einen groben Anhaltspunkt geben, wie sich das Baby in seinen Bewegungen entwickelt.

Wenn Ihr Baby immer beweglicher wird, wird so manches in der Wohnung zum Unfallrisiko. Beseitigen oder entschärfen Sie deshalb Gefahrenpunkte in der Wohnung, damit sich Ihr Baby gefahrlos und möglichst wenig eingeschränkt bewegen kann. Vorsicht: Herabhängende Tischdecken sind sehr verlockend (siehe „Unfallverhütung“ auf Seite 70).

.....



Bringen Sie Ihr Baby nicht in Positionen wie Sitzen oder Stehen, die es nicht selbstständig erreichen kann. Nur so lernt es die wichtigen Übergangsbewegungen, das Abstützen und das „richtige“ Fallen.

.....

## ETAPPEN IN DER ENTWICKLUNG DER KÖRPERMOTORIK

| ALTER (ca.) | BEWEGUNG                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Monate    | Der Kopf wird selbstständig aufrecht gehalten, wenn das Baby auf dem Bauch liegt oder auf dem Schoß gehalten wird. |
| 3–7 Monate  | Beginn der eigenständigen Körperdrehung (erst zur Seite, dann vom Bauch auf den Rücken und schließlich umgekehrt). |
| 7–10 Monate | Beginn der eigenständigen Fortbewegung (robben, kriechen).                                                         |
| 10 Monate   | Das Kind kann frei sitzen und hat nun beide Hände frei zum Spielen.                                                |
| 9–15 Monate | Selbstständiges Aufziehen zum Stand, Entlanggehen an Möbeln u. Ä.                                                  |
| 9–18 Monate | Mit Festhalten an den Händen und entlang der Möbel und Wände lernt das Kind, frei zu gehen.                        |

## SCHALTZENTRALE GEHIRN

Alle diese unterschiedlichen Bewegungsformen muss das Gehirn vor- und teilweise wieder umprogrammieren. Ein Teil dieser Bewegungsformen wird entwicklungsbedingt nur über eine gewisse Zeit verwendet. Die meisten werden jedoch – weil sie lebensnotwendig sind – schließlich weitgehend fest im Gehirn gespeichert. Vor und nach der Geburt bewegen Babys zunächst Teile ihres Körpers, Arme und Beine gleichzeitig. Die Bewegungen sind eher gleichförmig und kaum gezielt. Etwa ab dem 3. Lebensmonat beginnt ein Baby allmählich, seine Arme, Hände und Finger gezielt zu bewegen. Die bisherigen Mitbewegungen des Körpers werden dabei zunehmend weniger: Das Baby beginnt, sich auf ein Bewegungsziel zu konzentrieren und störende Mitbewegungen zu vermeiden.

Hierzu müssen die Nervenverbindungen der Bewegungszentren neu strukturiert werden. Durch diesen „Umbau“ können im Verlauf des 1. Lebensjahres immer wieder mal Auffälligkeiten im Bewegungsverhalten auftreten, die bei den Früherkennungsuntersuchungen festgestellt und ärztlich kontrolliert werden müssen. In etwa 90 bis 95 Prozent der Fälle sind diese Bewegungsauffälligkeiten bis zum Ende des 1. Lebensjahres verschwunden und die Kinder bewegen sich flüssig und sicher. Die Kontrollen sind jedoch wichtig, weil solche Bewegungsauffälligkeiten zuweilen auch frühe Anzeichen einer beginnenden krankhaften Bewegungsstörung sein können, die von den üblichen vorübergehenden Bewegungsauffälligkeiten im 1. Lebensjahr zunächst nicht sicher zu unterscheiden sind.



**Ganz wichtig:**

**Verzichten Sie unbedingt auf „Gehfrei“-Lauf-  
lernhilfen!** Sie bergen ein hohes Unfallrisiko  
mit oft schwerwiegenden Folgen. Und was das  
Gehenlernen betrifft, bewirken sie eher das  
Gegenteil.

.....

#### WIE SIE DIE FRÜHE BEWEGUNGSENTWICKLUNG ANREGEN KÖNNEN

Damit ein Kind seine körperlichen Fähigkeiten in ganzer Bandbreite entfalten kann, braucht es einen möglichst abwechslungsreichen Bewegungsraum mit vielfältigen Übungs- und Erfahrungsmöglichkeiten. Nur so kann es lernen, seinen Körper zu beherrschen, und seine Möglichkeiten wie auch seine Grenzen herausfinden.

- Körpererfahrung fördert die Bewegungsentwicklung:  
Tragen Sie Ihr Baby z. B. auf dem Arm, in Tragetüchern o. Ä.  
herum, streicheln und massieren Sie es nach dem Baden,  
„turnen“ Sie mit ihm spielerisch beim Wickeln.
- Lassen Sie Ihr Baby möglichst oft auf der Krabbeldecke  
kräftig strampeln.
- Legen Sie Ihr Baby, wenn es wach ist, abwechselnd auf den Bauch  
oder Rücken. Hin und wieder darf es für kurze Zeit etwas aufrecht  
in einer Babyschale liegen. So kann es auf unterschiedliche Weise  
strampeln und auch mit seinen Händen spielen.
- Versuchen Sie, Ihrem Baby einen möglichst großen  
Bewegungsraum in der Wohnung zu schaffen.



#### BABYWIPPEN NUR BEGRENZT NUTZEN

Lassen Sie Ihr Baby nicht lange in einer Wippe liegen. Auch ein  
kleines Baby braucht Bewegungsfreiheit. Die starre Position kann  
zudem zu Fehlhaltungen, besonders der Halswirbelsäule, führen.  
Legen Sie Ihr Baby deshalb lieber auf eine Krabbeldecke (Steppdecke)  
auf den Boden, wenn es dort nicht zu kalt ist.

Quelle: <https://shop.bzga.de/das-baby-ein-leitfaden-fuer-eltern-11030000/https://shop.bzga.de/das-baby-ein-leitfaden-fuer-eltern-11030000/>

[22.07.2024]