

Medikamente zur Behandlung von Asthma Bronchiale

Wirkstoff	Handelsname	Art der Anwendung	Wirkung	Nebenwirkung
SABA = kurz wirksames β2-Sympathomimetikum: - Salbutamol - Fenoterol - Terbutalin	- Salbutamol-rathiofarm - SalbuHEXAL - Cyclocaps - Salbutamol AL - Berotec - Terbutalin AL - Bricanyl	- Inhalation - Kapseln zum Inhalieren	Aktivierung der β 2-Rezeptoren. Die Wirkung setzt innerhalb weniger Minuten ein und hält drei bis sechs Stunden an. - Erweiterung der Bronchien durch Entspannung der glatten Muskulatur - Verbesserung des Selbstreinigungsmechanismus - Verminderung der Freisetzung von Bronchienverengenden Botenstoffen aus Entzündungsquellen - Erweiterung der Blutgefäße - Steigerung der Herzfrequenz - Beeinflussung des Stoffwechsels (Erhöhung der Insulin- und Blutzuckerkonzentration)	- Steigerung der Herzfrequenz - Herzklopfen - Kopfschmerzen - Zittern - Unruhe - Übelkeit - Muskelkrämpfe
LABA = lang wirksames β2-Sympathomimetikum: - Salmetreol - Formoterol - Indacaterol - Vilanterol	- Salmeterol AL - SalmeterolHEXAL - Formoterol STADA - Formoterol AL - Ultibro - ANORO	- Inhalationen - Hartkapseln zur Inhalation	Dienen zur Dauertherapie beziehungsweise beugen Anfälle vor. Wirkung hält ca. 12-24h an. Sonst dieselbe Wirkung wie SABA.	Selben Nebenwirkungen wie SABA.
ICS = inhalatives Glukokortikoid - Beclomethason - Budesonid - Ciclesonid - Fluticason - Mometason OCS = orales Glukokortikoid	- Ventolair - Sanasthmax - Pulmicort - Flutide - Atemur - Inhacort	- Inhalationen	Bei langfristigem Asthma bronchiale Behandlung. - Vermindern die Freisetzung von entzündungsfördernden Botenstoffen - Verminderung der Aktivierung von Immunzellen im Gewebe - Verminderung der Hyperreagibilität - Verminderung der Sekretbildung in Bronchien - Verbesserung des Selbstreinigungsmechanismus - Verbesserung der Wirkung von SABA und LABA	Meist nur lokale Nebenwirkungen im Mund-Rachenraum. - Heiserkeit - Mund-trockenheit - Erhöhte Infektanfälligkeit - Selten Pilzinfektionen
LTRA = Leukotrien-Rezeptor-Antagonist - Montelukast	-accord	- Tabletten zur oralen Einnahme	Hemmstoff der Leukotriene, schwächere Wirkung als Glukokortikoide.	Kann zur Wechselwirkung mit anderen

CE 10 UE 5: Unterstützung chronisch kranker Kinder und ihrer Familien

			- Verbessern in einer Dauertherapie die Asthma Symptome - Vermindern die Verengung der Bronchien - Verminderung der Sekret Produktion - Verminderung der Reizbarkeit der Bronchien	Medikamenten führen. - Kopfschmerzen - Bauchschmerzen - Schwindel - Erhöhte Infektanfälligkeit der oberen Atemwege
--	--	--	---	--