

複數與複數平面

沈威宇

2025 年 7 月 5 日

目錄

第一節 複數 (Complex number) 與複數平面 (Complex plane)	1
一、 複數 (Complex number)	1
二、 共軛複數 (Conjugate complex number)	1
(一) 複數除法	1
(二) 共軛複數的性質	1
三、 複數的絕對值/向徑/模 (長)	1
四、 負實數根號的性質	1
五、 歐拉公式 (Euler's formula)	2
六、 多項式的性質	2
(一) 代數基本定理 (Fundamental theorem of algebra)	2
(二) 根數	2
(三) 虛根成對定理	2
(四) 共軛複數的函數值	2
(五) 奇數次實係數多項式方程	2
七、 複數平面 (Complex plane) /阿爾岡平面 (Argand plane) /高斯平面 (Gaussian plane)	2
八、 輻角 (Argument)	2
(一) 輻角 (Argument)	2
(二) 輻角主值/主輻角 (Principal argument)	3
(三) 複數極式	3
九、 複數運算的幾何意義	3
(一) 四則運算	3
(二) 隸美弗公式 (De Moivre's formula)	3
(三) 雙曲線函數隸美弗公式	3
(四) 點積	3
十、 複數的冪及其在複數平面上的幾何意義	3
(一) 1 的正整數分之一次冪及其在複數平面上的幾何意義	3
(二) 非零複數的正整數分之一次冪及其在複數平面上的幾何意義	3
(三) 非零複數的複數次冪及其在複數平面上的幾何意義	4

第一節 複數 (Complex number) 與複數平面 (Complex plane)

一、 複數 (Complex number)

- 複數 (Complex number)：可表示成 $z = a + bi$ 得數，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 。
- 實部 (Real part)： $z = a + bi$ 的實部 $\Re(z) = a$ 。
- 虛部 (Imaginary part)： $z = a + bi$ 的虛部 $\Im(z) = b$ 。
- 虛數 (Imaginary number)：虛部不為零的複數。
- 純虛數 (Pure imaginary number)：實部為零的虛數。

二、 共軛複數 (Conjugate complex number)

z 的共軛複數 \bar{z} ，稱 z bar，為其實部加上其虛部的負一倍，即絕對值不變幅角乘上負號。

(一) 複數除法

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}, z \neq 0$$

(二) 共軛複數的性質

$$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}.$$

$$\overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}.$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}.$$

$$\Re(\overline{z_1} \cdot z_2) = \Re(z_1 \cdot \overline{z_2}).$$

$$\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}, \quad z_2 \neq 0.$$

$$\overline{z^n} = (\bar{z})^n, \quad zn \neq 0.$$

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}.$$

三、 複數的絕對值/向徑/模 (長)

$$|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

即：

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

四、 負實數根號的性質

$$\forall a > 0: \sqrt{-a} = \sqrt{a}i$$

$$\sqrt{ab} = \begin{cases} -\sqrt{a}\sqrt{b}, & a < 0 \wedge b < 0 \\ \sqrt{a}\sqrt{b}, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

五、 歐拉公式 (Euler's formula)

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

六、 多項式的性質

(一) 代數基本定理 (Fundamental theorem of algebra)

任何一個次數大於零的複係數 n 次方程式都至少有一個複數根。

(二) 根數

若 k 重根計作 k 個根，則複係數 n 次多項式方程恰有 n 個複數根。

(三) 虛根成對定理

實係數多項式方程 $f(x) = 0$ 如有虛根 x 則 \bar{x} 亦為其根。

(四) 共軛複數的函數值

實係數多項式函數 f 、複數 z ：

$$\overline{f(z)} = f(\bar{z}).$$

(五) 奇數次實係數多項式方程

奇數次實係數多項式方程必有實根。

七、 複數平面(Complex plane)/阿爾岡平面(Argand plane)/高斯平面(Gaussian plane)

由實軸為橫軸與虛軸為縱軸定義的二位笛卡爾座標平面，與複數域一一對應。

八、 輻角 (Argument)

$\arg(z)$ 代表 z 的輻角 (Argument)， $\text{Arg}(z)$ 代表 z 的輻角主值/主輻角 (Principal argument)，惟少數文獻反之。

(一) 輻角 (Argument)

$z = x + yi \in \mathbb{C}_{\neq 0}$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ ， z 的輻角 $\arg(z) = \varphi$ 定義為使等式：

$$z = x + yi = \sqrt{x^2 + y^2}(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

成立的任何實數 φ 。

0 的輻角主值未定義。

(二) 輻角主值/主輻角 (Principal argument)

$z = x + yi \in \mathbb{C}_{\neq 0}$ ，其中 $x, y \in \mathbb{R}$ ， z 的輻角主值 $\text{Arg}(z)$ 定義為其輻角中處於 $(-\pi, \pi]$ 者，亦有文獻定義為其輻角中處於 $[0, 2\pi)$ 者。

0 的輻角主值未定義。

(三) 複數極式

令複數 z 有輻角 θ ，則其極式為：

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta).$$

九、 複數運算的幾何意義

(一) 四則運算

- 複數相加減，實部與虛部分別相加減，相當於平面向量相加減。
- 複數相乘，模長相乘、輻角相加。
- 複數相除，模長相除、輻角相減。

(二) 隸美弗公式 (De Moivre's formula)

$$(r(\cos \theta + i \sin \theta))^n = r^n(\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)), \quad r \neq 0 \wedge n \in \mathbb{Z}.$$

(三) 雙曲線函數隸美弗公式

$$(r(\cosh \theta + i \sinh \theta))^n = r^n(\cosh(n\theta) + i \sinh(n\theta)), \quad r \neq 0 \wedge n \in \mathbb{Z}.$$

(四) 點積

複數平面上 $P(z_1)$ 與 $Q(z_2)$ 的點積為 $\Re(z_1 \cdot \overline{z_2})$ 。

十、 複數的幕及其在複數平面上的幾何意義

(一) 1 的正整數分之一次幕及其在複數平面上的幾何意義

令 $n \in \mathbb{N}$ ， $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ ，則 $1^{\frac{1}{n}}$ ，即 $x^n = 1$ 的 n 個根，為 ω 的 0 到 $n-1$ 次方，即：

$$e^{\frac{2\pi k}{n}} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k \in \mathbb{N}_0 < n.$$

彼等根在複數平面上為以原點為圓心的單位圓的內接正 n 邊形的 n 個頂點。

(二) 非零複數的正整數分之一次幕及其在複數平面上的幾何意義

令 $z \in \mathbb{C}_{\neq 0} \wedge n \in \mathbb{N}$ ， $\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ ，則 $z^{\frac{1}{n}}$ ，即 $x^n = z$ 的 n 個根為 $\sqrt[n]{|z|}$ 乘以 ω 的 0 到 $n-1$ 次方，即：

$$\sqrt[n]{|z|} e^{\frac{\text{Arg}(z) + 2\pi k}{n}} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\text{Arg}(z) + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\text{Arg}(z) + 2\pi k}{n} \right), \quad k \in \mathbb{N}_0 < n.$$

彼等根在複數平面上為以原點為圓心、半徑 $\sqrt[n]{|z|}$ 的圓的內接正 n 邊形的 n 個頂點。

(三) 非零複數的複數次冪及其在複數平面上的幾何意義

令 $z \in \mathbb{C}_{\neq 0} \wedge w \in \mathbb{C}$ ，則 z^w 為：

$$\begin{aligned} z^w &= e^{w \ln(z)} \\ &= (|z| e^{i \arg(z)})^w \\ &= |z|^{\Re(w)} |z|^{\Im(w)i} e^{i \Re(w) \arg(z)} e^{-\Im(w) \arg(z)} \\ &= |z|^{\Re(w)} e^{-\Im(w) \arg(z) + i(\Re(w) \arg(z) + \Im(w) \ln |z|)} \\ &= |z|^{\Re(w)} e^{-\Im(w) \arg(z)} (\cos(\Re(w) \arg(z) + \Im(w) \ln |z|) + i \sin(\Re(w) \arg(z) + \Im(w) \ln |z|)), \end{aligned}$$

其中：

$$\arg(z) = \text{Arg}(z) + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

彼等根在複數平面上為螺旋

$$|z|^{\Re(w)} e^{-\Im(w)\theta} (\cos(\Re(w)\theta + \Im(w) \ln |z|) + i \sin(\Re(w)\theta + \Im(w) \ln |z|))$$

上等輻角差的點。

模長：

$$|z^w| = |z|^{\Re(w)} e^{-\Im(w) \arg(z)}.$$

- 當 $\Im(w) > 0$ ：模長對 k 指數衰減，即隨 k 增大趨近於零、隨 k 減小發散至無限大。
- 當 $\Im(w) < 0$ ：模長對 k 指數增長，即隨 k 增大發散至無限大、隨 k 減小趨近於零。
- 當 $\Im(w) = 0$ ：模長始終為 $|z|^{\Re(w)}$ ，即在複數平面上根在以原點為圓心、半徑 $|z|^{\Re(w)}$ 的圓上。

輻角：

$$\arg(z^w) = \Re(w) \arg(z) + \Im(w) \ln |z|.$$

- 當 $\Re(w) > 0$ ：輻角對 k 線性增長，即隨 k 增大逆時針旋轉、隨 k 減小順時針旋轉。
- 當 $\Re(w) < 0$ ：輻角對 k 線性衰減，即隨 k 增大順時針旋轉、隨 k 減小逆時針旋轉。
- 當 $\Re(w) \in \mathbb{Z}$ ：輻角主值始終為 $(\Re(w) \text{Arg}(z) + \Im(w) \ln |z|) \bmod (2\pi)$ ，即在複數平面上根在輻角 $\Re(w) \text{Arg}(z) + \Im(w) \ln |z|$ 的射線上。

螺旋方向：

- 當 $\Re(w)\Im(w) > 0$ ：在複數平面上根在以原點為中心點的順時針發散的螺旋上。
- 當 $\Re(w)\Im(w) < 0$ ：在複數平面上根在以原點為中心點的逆時針發散的螺旋上。
- 當 $\Im(w) = 0$ ：在複數平面上根在以原點為圓心的圓上。

根的個數：

- 當 $\Im(w) = 0 \wedge \Re(w) \in \mathbb{Q}$ ：令 $|\Re(w)| = \frac{m}{n}$ 其中 $n \in \mathbb{N}, \gcd(m, n) = 1$ ，則有 n 個根，且彼等根在複數平面上為以原點為圓心、半徑 $|z|^{\frac{1}{n}}$ 的圓的內接正 n 邊形的 n 個頂點，且其中一個頂點在輻角 $\Re(w) \operatorname{Arg}(z)$ 的射線上。
- 其他情況：有無限多個根。