## 機率

沈威宇

2024年12月27日

## 目錄

## 第一節 機率 (Probability)

- 試驗(Experiment):指一個可以重複進行並且每次結果可能不同的過程。具有可重複性,即 試驗可以在相同條件下重複進行,與隨機性,即每次試驗的結果可能不同,具有隨機性和不確 定性。
- 樣本空間(Sample Space):一試驗所有可能結果的集合。例如,擲一枚硬幣的樣本空間是正面,反面。
- 事件(Event): 樣本空間的子集。例如, 擲一枚骰子得到一個偶數的事件是 {2,4,6}。
- 機率(Probability):事件發生的可能性,為0到1之間的數字。機率越接近1,事件發生的可能性就越大。
- 和事件:事件 A 和事件 B 的和事件為  $A \cup B$  •
- 積事件: 事件 A 和事件 B 的和事件為  $A \cap B$  •
- 餘事件:樣本空間 S 中,事件 A 的餘事件  $A' = S \setminus A$ 。
- 獨立事件(Independent Events):指在一次試驗中,兩個或多個事件彼此之間沒有影響。即:

互斥事件(Mutually Exclusive Events):指在一次試驗中,兩個或多個事件不可能同時發生。
 即:

$$(\forall i \neq j, \ 0 < i < n+1, \ 0 < j < n+1, \ i, \ j \in \mathbb{N} \ : \ A_i \cap A_j = \varnothing) \iff (\forall i \neq j, \ 0 < i < n+1, \ 0 < j < n+1, \ i, \ j \in \mathbb{N})$$

• 古典機率(Classical Probability):如果一個事件的所有可能結果數目是有限,且樣本空間中每個結果發生的機會相等,則事件發生的機率可以通過以下公式計算:

$$P(A) = \frac{\text{發生事件 A 的結果數}}{\text{所有可能結果數}}$$

• 條件機率(Conditional Probability):在已知某事件發生的情況下,另一事件發生的機率。通常表示為 P(A|B),即在事件 B 發生的情況下事件 A 發生的機率。

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

• 若  $\{A_i\}_{i\in I}$  是樣本空間  $\Omega$  的一個分割,那麼滿足以下條件:

$$\begin{aligned} &\forall i \in I \ : \ A_i \subseteq \Omega, \\ &\forall i, \ j \in I \land i \neq j \ : \ A_i \cap A_j = \varnothing, \\ &\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega. \end{aligned}$$

• 貝葉斯/貝氏定理(Bayes' Theorem): 若  $\{A_i\}_{i\in I}$  是樣本空間  $\Omega$  的一個分割,則:

$$\forall 1 \le j \le |I| : P(A_j|B) = \frac{P(A_j) \times P(B|A_j)}{\sum_{k=1}^{|I|} P(A_k) \times P(B|A_k)}$$

- 隨機變數(Random Variable):一個數值函數,將樣本空間中的每個結果映射到一個數值。例如,擲一枚骰子可以看作是一個隨機變數,其值可以是 1 到 6 之間的任意一個整數。
- 期望值(Expected Value):隨機變數的長期平均值。對於離散隨機變數 X,其期望值計算公式
  為:

$$E(X) = \sum_{i} [x_i \cdot P(x_i)]$$

- 變異數(Variance)和標準差(Standard Deviation):度量隨機變數的分散程度。變異數表示數據與期望值的差的平方的平均值,標準差是變異數的平方根。
- 客觀機率/頻率機率:根據過往的經驗或統計數據而得到的客觀數值,通常以過往事件發生的 頻率或多次重複試驗來得到該事件發生的機率。
- 主觀機率:沒有統計數據支持的機率數值。