Quadratic Curve and Quadric Surface

沈威宇

November 8, 2026

Contents

Chapter 1 Quadratic Curve and Quadric Surface 1

1 Quadratic Equation 1

Ⅰ General form 1

Ⅱ Reduction to standard form 1

2 圓錐曲線/圓錐截痕（conic section, quadratic curve） 3

Ⅰ 約定 3

Ⅱ 圓錐曲線定義 4

i 圓錐曲線的等價定義 4

ii 參數與相關圖形定義 4

iii 分類 5

iv 性質 5

Ⅲ 圓（circle） 6

i 性質 6

ii 圓 6

iii 直徑式 7

iv 圓與直線關係 7

v 兩圓關係 7

Ⅳ 橢圓（ellipse） 8

i 性質 8

ii 標準方向橢圓 8

iii 兩焦點式 9

V 拋物線（parabola） 9
i 性質 9
ii 標準方向拋物線 10
iii 焦點-準線式 10
VI 雙曲線（hyperbola） 11
i 性質 11
ii 共軛雙曲線（Conjugate hyperbola） 11
iii 雙曲線族 12
iv 標準方向雙曲線 12
v 兩焦點式 13
vi 漸近線式 13
vii 至二漸近線距離乘積 13
viii 等軸雙曲線 13
VII 標準方向非退化圓錐曲線極座標方程 13
VIII 圓錐曲線的判別 13
i 一般式 13
ii 圖形判別式 14
iii 退化判別式 14
iv 轉軸與移軸不變性（rotation and translation invariance） 15
v 中心的代數判定 15
vi 方向的代數判定 15
vii 圓的判別式 15
viii 圓與直線幾何關係的代數判定 15
IX 雙葉圓錐/雙重圓錐（double-napped cone, double cone, or cone） . . 16
i 定義 16
ii 標準方向雙葉圓錐 16
iii 圓錐截痕的離心率與丹德林球 16
X 公切圓圓心軌跡 17
i 非拋物線 17

ii 拋物線 19

3 Quadric Surface 21

I Cylinder 21

II Quadric surface 21

i General equation. 21

ii Trace 21

iii Types 21

Chapter 1 Quadratic Curve and Quadric Surface

1 Quadratic Equation

I General form

In $\mathbb{R}^n$,

$$C + \sum_{j=1}^{n} x_j \left(B_j + \sum_{k=j}^{n} A_{jk} x_k \right), \quad A_{jk}, B_j, C \in \mathbb{R}$$

or

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{B}^\top \mathbf{x} + C = 0, \quad \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^n, C \in \mathbb{R}$$

where

$$\begin{gathered} \mathbf{A}_{jj} = A_{jj}, \\ \mathbf{A}_{jk} = \mathbf{A}_{kj} = \frac{A_{jk}}{2}, \quad j \neq k, \\ \mathbf{B}_j = B_j, \\ \prod_{j=1}^{n} \prod_{k=j}^{n} A_{jk} \neq 0. \end{gathered}$$

A is symmetric.

II Reduction to standard form

If **A** is invertible, translate

$$\mathbf{x} = \mathbf{y} - \frac{1}{2} \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B},$$

diagonalize with orthogonal matrix Q such that

$$Q^\top \mathbf{A} Q = \operatorname{diag}\left(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\right),$$

rotate to

$$\mathbf{y} = Q \mathbf{z},$$

and obtain the standard form

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i \mathbf{z}_i^{\,2} + C - \frac{1}{4} \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} = 0.$$

Proof. If $\mathbf{A}$ is invertible, first remove linear form. Let $\mathbf{x} = \mathbf{y} + \mathbf{x}_0$,

$$\left(\mathbf{y} + \mathbf{x}_0\right)^\top \mathbf{A} \left(\mathbf{y} + \mathbf{x}_0\right) + \mathbf{B}^\top \left(\mathbf{y} + \mathbf{x}_0\right) + C = 0$$

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} + \left(2\mathbf{A}\mathbf{x}_0 + \mathbf{B}\right)^\top \mathbf{y} + \left(\mathbf{x}_0 \mathbf{A} \mathbf{x}_0 + \mathbf{B}^\top \mathbf{x}_0 + C\right) = 0$$

$$2\mathbf{A}\mathbf{x}_0 + \mathbf{B} = 0$$

$$\mathbf{x}_0 = -\frac{1}{2}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$$

$$\mathbf{y}^\top \mathbf{A} \mathbf{y} + C' = 0$$

$$C' = C - \frac{1}{4}\mathbf{B}^\top \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$$

By spectral theorem, there exists orthogonal matrix Q such that

$$Q^\top \mathbf{A} Q = \Lambda = \operatorname{diag}\left(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\right).$$

Assign new coordinate

$$\mathbf{y} = Q\mathbf{z}$$

$$\mathbf{z}^\top \Lambda \mathbf{z} + C' = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i {\mathbf{z}_i}^2 + C' = 0$$

□

If $\mathbf{A}$ is singular, diagonalize with orthogonal matrix Q such that

$$Q^\top \mathbf{A} Q = \operatorname{diag}\left(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0\right), \quad r = \operatorname{rank}(\mathbf{A}),$$

rotate

$$\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$$

with $b = Q^\top B$, translate

$$y_i = z_i - \frac{b_i}{\lambda_i}, \quad i \le r$$

$$y_i = z_i, \quad i > r,$$

obtain

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i {\mathbf{z}_i}^2 + \sum_{i=r+1}^{n} b_i \mathbf{z}_i + C - \sum_{i=1}^{r} {b_i}^2 = 0$$

if there exists any $b_k \neq 0$ for $k > r$, pick any one of them and translate

$$\mathbf{w}_k = \mathbf{z}_k + C - \sum_{i=1}^{r} {b_i}^2$$

$$\mathbf{w}_j = \mathbf{z}_j, \quad j \neq k,$$

obtain paranoid-type standard form

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathbf{w}_i{}^2 + \sum_{i=r+1}^{n} b_i \mathbf{w}_i = 0$$

if $b_k = 0$ for all $k > r$, it is degenerate

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathbf{z}_i{}^2 + C - \sum_{i=1}^{r} b_i{}^2 = 0.$$

Proof.

$$\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$$
$$\mathbf{y}^\top \Lambda \mathbf{y} + \left(Q^\top B\right)^\top \mathbf{y} + C = 0$$
$$\mathbf{y}^\top \Lambda \mathbf{y} + \left(Q^\top B\right)^\top \mathbf{y} + C = 0$$
$$\mathbf{z}^\top \Lambda \mathbf{z} + C - \sum_{i=1}^{r} b_i{}^2 = 0$$

□

2 圓錐曲線/圓錐截痕（conic section, quadratic curve）

I 約定

若無另聲明：

- 參數屬於擴展實數系（extended real number system），即 $\mathbb{R} \cup \{\infty, -\infty\}$。
- 若一表達式中某值為無限大，該表達式定義為其在該值趨近於無限大的極限，且允許該極限為無限大、負無限大或無意義。
- 定義無限大乘以任意正擴展實數為無限大；定義無限大乘以零無意義；定義任何數除以零無意義；定義無限大除以或減去無限大無意義。
- 若 $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$、$\lim_{x\to\infty} g(x) = \infty$，則定義 $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x)$，與 $\lim_{x\to\infty} f(x) - g(x)$ 或 $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 無關。
- 圓錐和圓錐曲線均為某歐幾里德仿射空間（Euclidean affine space）的子集。
- 某點與空間中某方向無限遠處的距離定義為無限大；A 點與空間中某方向無限遠處的距離減去 B 點與空間中某方向無限遠處的距離定義為 $B - A$ 與該方向單位向量的點積。
- 位置表示依賴於座標時，使用笛卡爾右手座標系統。
- 表達式依賴空間時，使用該表達式所須的最小維度的歐幾里德仿射空間。
- 將一線段作為一值時，其值為其長度。
- 各等式或不等式僅考慮其兩側均有意義時。

II 圓錐曲線定義

i 圓錐曲線的等價定義

- 圓錐截痕定義：圓錐曲線指三維空間（或大於三維空間中的一個三維超平面）中，一雙葉圓錐（double-napped cone）被一不通過其頂點的平面所截的截線。稱兩個同時與圓錐與該平面相切的球為丹德林球（Dandelin spheres）或焦球（focal spheres），其一的球心可以在無限遠處（拋物線）；稱該二丹德林球與該平面的切點為焦點。
- 兩焦點定義：圓錐曲線指平面上距兩不一定相異的定點（稱焦點（focus））的距離和為一大於兩焦點距離的定值（稱兩倍半主軸）的所有點的集合（圓、橢圓、拋物線），或平面上距兩相異的定點（稱焦點）的距離差的絕對值為一大於兩焦點距離的定值（稱兩倍半主軸）的所有點的集合（拋物線、雙曲線），其中一定點可在某方向無限遠處（拋物線）。
- 焦點-準線定義：對於 $0 \leq \varepsilon \leq 1$ 的離心率/偏心率（eccentricity）ε，圓錐曲線指平面上距一定點（稱焦點）的距離與距一定直線（稱準線（directrix））的距離之比值為離心率的所有點的集合，其中焦點不可在準線上，其中準線可在無限遠處（圓）；對於 $\varepsilon > 1$（雙曲線），圓錐曲線指前述集合及和該集合有相同漸近線（asymptote）、對稱軸與離心率的同種集合之聯集。
- 笛卡爾方程定義：圓錐曲線指平面上，任取原點定義笛卡爾座標後，$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的圖形，且 $\det \begin{pmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{pmatrix} < 0$。
- 極方程定義：圓錐曲線指平面上，取極點於圓錐曲線一焦點定義極座標後，$r = \dfrac{\ell}{1 - \varepsilon \cos(\theta + \varphi)}$ 的圖形，其中半正焦弦 $\ell > 0$，離心率 $\varepsilon \geq 0$。
- 半徑差不為零公切圓圓心軌跡定義：一平面上兩定圓，半徑差的絕對值不為零，其中可有一圓在某方向無限遠處且其半徑為無限大，圓錐曲線定義為同時外切兩圓或同時內切兩圓且一圓在公切圓內且另一圓在公切圓外的公切圓圓心軌跡或內切圓一圓且該圓在公切圓外並外切另一圓的公切圓圓心軌跡。
- 半徑和不為零公切圓圓心軌跡定義：一平面上兩定圓，半徑和不為零，其中可有一圓在某方向無限遠處且其半徑為無限大，圓錐曲線定義為同時內切兩圓且一圓在公切圓內且另一圓在公切圓外的公切圓圓心軌跡或內切圓一圓且該圓在公切圓內並外切另一圓的公切圓圓心軌跡。

ii 參數與相關圖形定義

- **離心率（eccentricity）**ε：圓錐曲線上的點與焦點的距離與其與準線的距離之比值。
- **中心（center）**：對於圓、橢圓和雙曲線為幾何中心（對於雙曲線即兩漸近線的交點）；對於拋物線無幾何中心，此為方便表示，稱拋物線頂點（即對稱軸與拋物線的焦點）為中心。

- **焦距（focal length）**f：中心與焦點的距離，對於拋物線特指非無限遠處的焦點與中心的距離。
- **線性離心率（linear eccentricity）**c：兩焦點距離之一半。
- **焦點準線距/焦點參數（focal parameter）**p：與某準線較近的焦點與該準線的距離。
- **中心準線距** d：中心與準線的距離。
- **主軸（major axis）**：通過中心與兩焦點的直線或最短線段。
- **半主軸（semi-major axis）**a：主軸 上以中心為一端點、長度為主軸與圓錐曲線兩交點的距離的一半但若僅一交點則為無限大（拋物線）的線段。
- **弦（chord）**：連接圓錐曲線上的兩點的線段。
- **焦半徑（focal radius）**：焦點與圓錐曲線上一點的連線段。
- **焦弦（focal chord）**：過焦點連接一條圓錐曲線上的兩點的線段。
- **正焦弦（latus rectum）**：垂直主軸的焦弦。
- **半正焦弦（semi-latus rectum）**ℓ：正焦弦上以焦點為一端點、長度為正焦弦長度的一半的線段。
- **副軸（minor axis）**：垂直主軸於中心的直線，或垂直主軸於中心且長度為 $2a\sqrt{|1-\varepsilon^2|}$ 且以中心為中點的線段。
- **半副軸（semi-minor axis）**b：副軸 上以中心為一端點、長度為 $a\sqrt{|1-\varepsilon^2|}$ 的線段。

iii 分類

- 圓：$\varepsilon = 0$ 的圓錐曲線
- 橢圓：$0 < \varepsilon < 1$ 的圓錐曲線
- 拋物線：$\varepsilon = 1$ 的圓錐曲線
- 雙曲線：$\varepsilon > 1$ 的圓錐曲線

iv 性質

$$
\begin{aligned}
c &= a\varepsilon \\
p &= \frac{b^2}{c} \\
\ell &= \frac{b^2}{a} = p\varepsilon = a|1-\varepsilon^2| \\
cd &= a^2 \\
d &= \frac{f}{\varepsilon^2} = \frac{a^2}{c}
\end{aligned}
$$

- 副軸平行正焦弦平行準線垂直主軸。

- 正焦弦是最短的焦弦。
- 中心與兩焦點必共線，該線即主軸。除拋物線外，中心為兩焦點之中點；除拋物線外，主軸與圓錐曲線交於兩點，且中心為該二點之中點。
- 必存在一個直角三角形使得其三邊長為半主軸、半副軸與線性離心率且半副軸必為一股長（含一邊長為零另二邊等長（圓）或兩邊無限長（拋物線））。
- 兩焦點與中心之距離的平均為線性離心率。
- 不論位置（2 個平移自由度）、方向（1 個旋轉自由度），圓錐曲線有兩個自由度。
- 不論位置（2 個平移自由度）、方向（1 個旋轉自由度）、大小（1 個伸縮自由度），圓錐曲線有一個自由度。
- 圓錐曲線退化若且惟若 $\ell = 0$。

III 圓（circle）

i 性質

$$\varepsilon = 0$$

主軸：任意過圓心直線

a, b： 半徑

$$a = b$$

$2a, 2b$： 直徑

$$\varepsilon = c = f = 0$$

$$\ell = a = b$$

$$p = d = \infty$$

- 圓上一點距焦點的距離為半徑。
- 任一過焦點/中心的直線為對稱軸。
- 若某點在一圓上，則其以任意過圓心直線為線對稱軸的對稱點亦在該圓上。

ii 圓

- 標準式：

$$\left(\frac{x-h}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-k}{a}\right)^2 = 1$$

- 準線方程：任意無限遠處直線
- 中心/圓心：(h, k)
- 焦點：(h, k)

- 主、副軸方程：任意互相垂直於 (h, k) 的一組直線。
- 參數式：

$$(a\cos(t) + h, a\sin(t) + k), \quad 0 \le t < 2\pi$$

- 一般式形式：

$$Ax^2 + Ay^2 + Dx + Dy + F = 0, \quad \text{有實數解}$$

iii 直徑式

令兩點 $P(x_1, y_1)$、$Q(x_2, y_2)$，則以 $\overline{PQ}$ 為直徑的圓的方程式為：

$$(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

iv 圓與直線關係

- 相交於相異二點：相割。
- 相交於一點：相切
- 沒有交點：相離

v 兩圓關係

- 相交於相異二點：相割。
- 相交於一點且一圓在另一圓之內：內切
- 沒有交點且一圓在另一圓之內：內離
- 相交於一點且非一圓在另一圓之內：外切
- 沒有交點且非一圓在另一圓之內：外離

IV 橢圓（ellipse）

i 性質

主軸：長軸

副軸：短軸

a： 半長軸

b： 半短軸

$$ab \neq 0, \quad a > b$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$$

$$c = f = \sqrt{a^2 - b^2}$$

$$\ell = \frac{b^2}{a}$$

$$p = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

$$d = \frac{c}{\varepsilon^2} = \frac{a}{\varepsilon} = c + p = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}}$$

- 稱橢圓與主/長軸和副/短軸的四個交點為頂點。
- 橢圓上一點距兩焦點的距離和為兩倍半長軸。
- 主/長軸和副/短軸為對稱軸。
- 若某點在一橢圓上，則其以長軸或短軸為線對稱軸的對稱點亦在該橢圓上。
- 橢圓上各點相對於一焦點的平均距離為 a。

ii 標準方向橢圓

- 方向：主/長軸平行 x 軸
- 標準式：

$$\left(\frac{x-h}{a}\right)^2 + \left(\frac{y-k}{b}\right)^2 = 1$$

- 極方程：

$$r = \frac{\frac{b^2}{a}}{1 - \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\cos(\theta)} = \frac{a\left(1-\varepsilon^2\right)}{1-\varepsilon\cos(\theta)}, \quad h = \sqrt{a^2-b^2} \wedge k = 0$$

$$r = \frac{\frac{b^2}{a}}{1 - \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}\cos(\pi-\theta)} = \frac{a\left(1-\varepsilon^2\right)}{1-\varepsilon\cos(\pi-\theta)}, \quad h = -\sqrt{a^2-b^2} \wedge k = 0$$

- 準線方程：

$$x = \pm\frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} + h$$

- 中心/圓心：(h, k)
- 焦點：$(h \pm \sqrt{a^2 - b^2}, k)$
- 主/長軸方程：

$$y = k$$

- 副/短軸方程：

$$x = h$$

- 長軸頂點：$(h \pm a, 0)$
- 短軸頂點：$(0, k \pm b)$
- 參數式：

$$(a\cos(t) + h, b\sin(t) + k), \quad 0 \le t < 2\pi$$

- 一般式形式：

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad AC > 0 \land |A| < |C| \land \text{有實數解}$$

iii 兩焦點式

- 兩焦點式：

$$\sqrt{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2} + \sqrt{(x-\gamma)^2 + (y-\delta)^2} = 2a$$

- 焦點：(α, β) 與 (γ, δ)
- 中心：$\left(\frac{\alpha+\gamma}{2}, \frac{\beta+\delta}{2}\right)$
- 主/長軸方程：

$$(\alpha - \gamma)(y - \beta) = (\beta - \delta)(x - \alpha)$$

V 拋物線（parabola）

i 性質

$$\varepsilon = 1$$

主軸：對稱軸、軸

副軸：頂點切線

$$c = a = \infty$$

$$\ell = p = 2d = 2f$$

$b =$ 無意義

ii 標準方向拋物線

- 方向：開口向 x 軸正方向
- 標準式：

$$(y-k)^2 = 4f(x-h)$$

- 極方程：

$$r = \frac{2f}{1-\cos(\theta)}, \quad h = -f \wedge k = 0$$

- 準線方程：

$$x = -f + h$$

- 中心/頂點：(h, k)
- 焦點：$(h+f, k)$（與 (∞, k)）
- （主/對稱）軸方程：

$$y = k$$

- 副軸方程：

$$x = h$$

- 參數式：

$$(ft^2 + h, 2ft + k), \quad t \in \mathbb{R}$$

- 一般式形式：

$$Ax^2 + Dx + Ey + F = 0, \quad AE \neq 0$$

iii 焦點-準線式

- 焦點-準線式：

$$\sqrt{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2} = \frac{|mx+ny+r|}{\sqrt{m^2+n^2}}$$

- 焦點：(α, β)
- 準線方程：$mx + ny + r$
- 頂點：

$$\left(\alpha - \frac{m(m\alpha+n\beta+r)}{2(m^2+n^2)}, \beta - \frac{n(m\alpha+n\beta+r)}{2(m^2+n^2)}\right)$$

- （主/對稱）軸方程：

$$n(x-\alpha) = m(y-\beta)$$

VI　雙曲線（hyperbola）

i　性質

主軸：貫軸（transverse axis）

副軸：共軛軸（conjugate axis）

a： 半貫軸（semi-transverse axis）

b： 半共軛軸（semi-conjugate axis）

$$ab \neq 0$$

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$$

$$c = f = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\ell = \frac{b^2}{a}$$

$$p = \frac{b^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$d = \frac{c}{\varepsilon^2} = \frac{a}{\varepsilon} = c - p = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

- 一雙曲線在共軛軸兩側的部分稱其兩分支（branch）。
- 稱貫軸與雙曲線的兩交點為頂點。
- 距中心距離趨近於無限大時，雙曲線趨近於一對漸近線，兩者交叉於中心且線對稱於貫軸與共軛軸，且該二漸近線是以該雙曲線中心為兩焦點的退化雙曲線。
- 雙曲線上一點距兩焦點的距離差為兩倍半貫軸。
- 主/貫軸和副/共軛軸為對稱軸。
- 若某點在一雙曲線上，則其以貫軸或共軛軸為線對稱軸的對稱點亦在該雙曲線上。
- 對於任意雙曲線，存在唯一一個矩形，使得：其中心為雙曲線中心，其二邊垂直貫軸且長度為二倍半共軛軸。該矩形垂直貫軸的二邊分別與雙曲線之兩分支相切於貫軸上，另二邊平行貫軸且長度為二倍半貫軸，對角線在雙曲線的漸近線上且長度為二倍線性離心率，以其中心為圓心、線性離心率為半徑的圓通過雙曲線的兩焦點與矩形的四個頂點。

ii　共軛雙曲線（Conjugate hyperbola）

一雙曲線的共軛雙曲線為具有相同線性離心率和漸近線的另一不同雙曲線。原雙曲線的貫軸為共軛雙曲線的共軛軸，原雙曲線的共軛軸為共軛雙曲線的貫軸，原雙曲線的半貫軸等於共軛雙曲線的半共軛軸，原雙曲線的半共軛軸等於共軛雙曲線的半貫軸。

iii 雙曲線族

雙曲線族指具有相同漸近線的雙曲線的集合。

iv 標準方向雙曲線

- 方向：主/貫軸平行 x 軸
- 標準式：

$$\left(\frac{x-h}{a}\right)^2-\left(\frac{y-k}{b}\right)^2=1$$

- 極方程：

$$r=\frac{\frac{b^2}{a}}{1-\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\cos(\theta)}=\frac{a\left(\varepsilon^2-1\right)}{1-\varepsilon\cos(\theta)},\quad h=-\sqrt{a^2+b^2}\wedge k=0$$

$$r=\frac{\frac{b^2}{a}}{1-\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}\cos(\pi-\theta)}=\frac{a\left(\varepsilon^2-1\right)}{1-\varepsilon\cos(\pi-\theta)},\quad h=\sqrt{a^2+b^2}\wedge k=0$$

- 準線方程：

$$x=\pm\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2}}+h$$

- 中心：(h,k)
- 頂點：$(h\pm a,k)$
- 焦點：$(h\pm\sqrt{a^2+b^2},k)$
- 主/貫軸方程：

$$y=k$$

- 副/共軛軸方程：

$$x=h\pm a$$

- 漸近線方程：

$$\frac{x-h}{a}\pm\frac{y-k}{b}=0$$

- 參數式：

$$(a\sec(t)+h,b\tan(t)+k),\quad 0\le t<2\pi\wedge t\neq\frac{\pi}{2}\wedge t\neq\frac{3\pi}{2}$$

- 一般式形式：

$$Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=0,\quad AC<0\wedge\frac{D^2}{4A}-\frac{E^2}{4C}+F<0\wedge\text{有實數解}$$

- 共軛雙曲線標準式：

$$\left(\frac{y-k}{b}\right)^2-\left(\frac{x-h}{a}\right)^2=1$$

v 兩焦點式

- 兩焦點式：

$$\left|\sqrt{(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2}-\sqrt{(x-\gamma)^2+(y-\delta)^2}\right|=2a$$

- 焦點：(α,β) 與 (γ,δ)
- 中心：$\left(\frac{\alpha+\gamma}{2},\frac{\beta+\delta}{2}\right)$
- 主/長軸方程：

$$(\alpha-\gamma)(y-\beta)=(\beta-\delta)(x-\alpha)$$

vi 漸近線式

以 $a_1x+b_1y+c_1=0$ 與 $a_2x+b_2y+c_2=0$ 為漸近線的雙曲線可以表示為：

$$(a_1x+b_1y+c_1)(a_2x+b_2y+c_2)=k$$

其中 $k=0$ 時為退化雙曲線，即該二漸近線。

vii 至二漸近線距離乘積

半貫軸 a、半共軛軸 b 的雙曲線上一點 P 至該雙曲線的二漸近線之距離的乘積 M 為：

$$M=\frac{a^2b^2}{a^2+b^2}$$

viii 等軸雙曲線

$\varepsilon=\sqrt{2}$ 的雙曲線，服從：

$$a=b=\ell=\sqrt{2}p=\sqrt{2}d=\frac{c}{\sqrt{2}}$$

VII 標準方向非退化圓錐曲線極座標方程

定義極座標 $[r,\theta]=(x\cos\theta,y\sin\theta)$，則較 x 座標較小的焦點在原點的標準方向非退化圓錐曲線方程為：

$$r=\frac{\ell}{1-\varepsilon\cos\theta}$$

VIII 圓錐曲線的判別

i 一般式

討論一般式：

$$Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$$

，其中所有係數都是實數，且 $ABC\neq0$。

令：

$$Q = \begin{bmatrix} A & B/2 & D/2 \\ B/2 & C & E/2 \\ D/2 & E/2 & F \end{bmatrix}$$

$$M = \begin{bmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{bmatrix}$$

$$N = \begin{bmatrix} D/2 \\ E/2 \end{bmatrix}$$

又可以寫作：

$$\begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} Q \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

又可以寫作：

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + N^{\top} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + f = 0$$

ii 圖形判別式

圖形判別式 $\det(M) = AC - \frac{B^2}{4}$，圖形含實圖形與虛圖形。

- $\det(M) > 0$：不退化圖形為圓（當且僅當 $A = C$ 且 $B = 0$）或橢圓；退化圖形為一點，即中心，發生於 $F = \frac{AD^2}{4|A|^3} + \frac{CE^2}{4|C|^3}$。
- $\det(M) = 0$：不退化圖形為拋物線；退化圖形為一對平行的直線，平行於退化前拋物線的對稱軸，發生於 $AE = CD = 0$，兩直線重合於 $D^2 + E^2 = 4(A + C)F$。（$A = B = C = 0 \wedge DE \neq 0$ 與退化前拋物線相切但不屬於圓錐曲線。）
- $\det(M) < 0$：不退化圖形為雙曲線；退化圖形為一對交叉於退化前雙曲線中心的直線，發生於 $F = \frac{AD^2}{4|A|^3} + \frac{CE^2}{4|C|^3}$。

iii 退化判別式

退化判別式 $\det(Q) = \det(M)F - \frac{AE^2 + CD^2}{4} = AC - \frac{AE^2 + CD^2 + BF^2}{4}$。

- $\det(Q) < 0$（對於拋物線即 $D^2 + E^2 > 4(A + C)F$）：圖形為實圖形。
- $\det(Q) = 0$（對於拋物線即 $D^2 + E^2 = 4(A + C)F$）：圖形為退化圖形。
- $\det(Q) > 0$（對於拋物線即 $D^2 + E^2 < 4(A + C)F$）：圖形為虛圖形。

iv　轉軸與移軸不變性（rotation and translation invariance）

$\det(Q)$、$\det(M)$ 與 $A+C$ 在轉軸，即：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

和移軸，即：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}$$

後不變。

v　中心的代數判定

令圖形的中心為 (x_0, y_0)，有：

$$(x_0, y_0)^{\top} = -M^{-1}N$$

對於拋物線 M^{-1} 為 M 之偽逆。

vi　方向的代數判定

主軸極角 θ 服從：

$$\tan(2\theta) = \frac{B}{A-C}$$

vii　圓的判別式

設圖形是圓，令：

$$\Delta_c = D^2 + E^2 - 4F$$

- $\Delta_c > 0$：圖形為實圓，圓心 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$，半徑 $\frac{\sqrt{\Delta_c}}{2}$。
- 如果 $\Delta_c = 0$，圖形退化為一點 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$。
- 如果 $\Delta_c < 0$，圖形為虛圓，圓心 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$，半徑 $\frac{\sqrt{\Delta_c}}{2}$。

viii　圓與直線幾何關係的代數判定

已知圓 C：$x^2 + y^2 + dx + ey + f = 0$ 與直線 **L**：$ax + by + c = 0$。

將 **L** 化為 $y = f(x)$（或 $x = g(y)$）代入 C，消去 y（或 x）得 $\alpha x^2 + \beta x + \gamma = 0$（或 $\alpha y^2 + \beta y + \gamma = 0$）。

令 $\Delta_{\mathbf{L}} = \beta^2 - 4\alpha\gamma$：

- $\Delta_{\mathbf{L}} > 0$：圓 C 與直線 **L** 相割。
- $\Delta_{\mathbf{L}} = 0$：圓 C 與直線 **L** 相切。
- $\Delta_{\mathbf{L}} < 0$：圓 C 與直線 **L** 相離。

IX 雙葉圓錐/雙重圓錐（double-napped cone, double cone, or cone）

i 定義

設空間中有一定直線（稱軸（axis））過一定點（稱頂點（vertex））。定義母線（generatrix）為一通過頂點並與軸夾一非零且非直角的定角度的直線，則所有母線形成的曲面稱雙葉圓錐。

ii 標準方向雙葉圓錐

- 方向：開口向 z 軸正負向
- 標準式：

$$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=\tan^2(\phi)(z-\gamma)^2$$

  其中 α、β、γ 為常數，$0\le\phi<\frac{\pi}{2}$，ϕ 是母線與軸的夾角。
- 軸：

$$(\alpha,\beta,\gamma)+(0,0,1)t,\quad t\in\mathbb{R}$$

- 頂點：(α,β,γ)
- 母線：任意 $0\le s\le 1$ 的直線：

$$(\alpha,\beta,\gamma)+\left(s,\sqrt{1-s^2},\cot^2(\phi)\right)t,\quad t\in\mathbb{R}$$

- 過 $0\le s\le 1$ 的母線 $(\alpha,\beta,\gamma)+\left(s,\sqrt{1-s^2},\cot^2(\phi)\right)t,\quad t\in\mathbb{R}$ 切圓錐之平面：

$$s(x-\alpha)+\sqrt{1-s^2}(y-\beta)=\tan^2(\phi)(z-\gamma)$$

iii 圓錐截痕的離心率與丹德林球

$0\le s\le 1$ 且 $\omega\neq 0$ 的平面：

$$z=\cot(\theta)\left(s(x-\alpha)+\sqrt{1-s^2}(y-\beta)\right)+\omega+\gamma$$

截雙葉圓錐：

$$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=\tan^2(\phi)(z-\gamma)^2$$

其中 α、β、γ 為常數，$0\le\phi<\frac{\pi}{2}$，ϕ 是母線與軸的夾角，$0\le\theta<\frac{\pi}{2}$，θ 是平面與軸的夾角。

離心率為：

$$\varepsilon=\frac{\cos\theta}{\cos\phi}$$

- 圓：$\theta=\frac{\pi}{2}$，$\varepsilon=0$
- 橢圓：$\theta>\phi$，$0<\varepsilon<1$
- 拋物線：$\theta=\phi$，$\varepsilon=1$

- 雙曲線：$\theta < \phi$，$\varepsilon > 1$

兩丹德林球為：

- 球心：

$$\left(\alpha, \beta, \frac{\omega \sin(\theta)}{\sin(\phi) + \sin(\theta)} + \gamma\right)$$

  半徑：

$$\left|\frac{\omega \sin\phi \sin\theta}{\sin\phi + \sin\theta}\right|$$

- 球心：

$$\left(\alpha, \beta, \frac{\omega \sin(\theta)}{-\sin(\phi) + \sin(\theta)} + \gamma\right)$$

  半徑：

$$\left|\frac{\omega \sin\phi \sin\theta}{\sin\phi - \sin\theta}\right|$$

X　公切圓圓心軌跡

i　非拋物線

一平面上兩定圓 A、B，兩圓圓心距離 $f \geq 0$、兩圓半徑分別為 $r \geq 0$ 與 $s \geq 0$，$f, r, s \in \mathbb{R}$，則與該二圓均相切的動圓的圓心軌跡必由以下組成：

- 以兩圓圓心為焦點、$r + s$ 或 $|r - s|$ 的圓、橢圓或雙曲線的一分支，或
- 過兩圓圓心的直線的一部分，或
- 兩圓圓心連線的中垂線，或
- 不存在。

令 P 與 A 圓心的距離為 $\overline{PA}$、P 與 B 圓心的距離為 $\overline{PB}$，定義動點 P 軌跡方程（存在指有實解）：

- F：$\overline{PA} + r = \overline{PB} + s$：同時外切兩圓，存在於 $f \geq |r - s|$。
- G：$\overline{PA} - r = \overline{PB} - s$：同時內切兩圓且公切圓同時在兩圓內或兩圓均在公切圓內，存在於 $f \geq |r - s|$。
- H：$\overline{PA} - r = s - \overline{PB}$：同時內切兩圓且一圓在公切圓內且另一圓在公切圓外，存在於 $f \leq r + s$。
- I：$\overline{PA} + r = -\overline{PB} - s$：存在於 $f = r = s = 0$。
- J：$\overline{PA} + r = \overline{PB} - s$：外切圓 A、內切圓 B 且 B 在公切圓內，存在於 $f \geq r + s$。
- K：$\overline{PA} - r = \overline{PB} + s$：內切圓 A 且 A 在公切圓內、外切圓 B，存在於 $f \geq r + s$。
- L：$\overline{PA} - r = -\overline{PB} - s$：內切圓 A 且 A 在公切圓外、外切圓 B，存在於 $f \leq r - s \geq 0$。

- M：$\overline{PA}+r=-\overline{PB}+s$：外切圓 A、內切圓 B 且 B 在公切圓外，存在於 $f\le s-r\ge 0$。

F 和 G 的圖形為：

- $f>r-s=0$（即兩同半徑圓相割、外切或外離）：F 和 G 均為兩圓圓心連線的中垂線。
- $f=r-s=0$（即兩圓重合）：F 和 G 均為整個平面。
- $f>|r-s|\neq 0$（即兩異半徑圓相割、外切或外離）：F 和 G 為以兩圓圓心為焦點、$|r-s|$ 為兩倍半貫軸的雙曲線的兩分支，其中 F 在焦點-準線定義中的焦點為半徑較大的圓的圓心，G 在焦點-準線定義中的焦點為半徑較小的圓的圓心。
- $f=|r-s|\neq 0$（即兩異半徑圓內切）：F 為自半徑較大的圓的圓心向另一圓圓心的反方向的半直線，G 為自半徑較小的圓的圓心向另一圓圓心的反方向的半直線，合起來為過兩圓圓心的直線扣除兩圓圓心連線段。

H 和 I 的圖形為：

- $f=r=s=0$：H 和 I 均為兩圓圓心。
- $f=0<r+s$（即兩圓同心）：H 為以兩圓圓心為圓心、$r+s$ 為兩倍半徑的圓。
- $0<f<r+s$（即兩圓非同心內離、內切或相割）：H 為以兩圓圓心為焦點、$r+s$ 為兩倍半長軸的橢圓。
- $f=r+s>0$（即兩圓外切）：H 為兩圓圓心連線段。

J 和 K 的圖形為：

- $f=r=s=0$：J 和 K 均為整個平面。
- $f=r+s>0$（即兩圓外切）：J 為自 A 的圓心向另一圓圓心的反方向的半直線，G 為自 B 的圓心向另一圓圓心的反方向的半直線，合起來為過兩圓圓心的直線扣除兩圓圓心連線段。
- $f>r=s=0$：J 和 K 均為兩圓圓心連線的中垂線。
- $f>r+s>0$（即兩圓外離）：J 和 K 為以兩圓圓心為焦點、$r+s$ 為兩倍半貫軸的雙曲線的兩分支，其中 J 在焦點-準線定義中的焦點為 A 的圓心，K 在焦點-準線定義中的焦點為 B 的圓心。

L 和 M 的圖形為：

- $f=0<|r-s|$（即兩異半徑同心圓）：L 和 M 存在者為以兩圓圓心為圓心、$|r-s|$ 為兩倍半徑的圓。
- $0<f<|r-s|$（即兩非同心圓內離）：L 和 M 存在者為以兩圓圓心為焦點、$|r-s|$ 為兩倍半長軸的橢圓。
- $f=|r-s|\neq 0$（即兩異半徑圓內切）：L 和 M 存在者為兩圓圓心連線段。
- $f=r-s=0$（即兩圓重合）：L 和 M 為兩圓圓心。

所有情況的所有圖形為：

- $f > r+s > |r-s| > 0$：兩異同焦點雙曲線。
- $f = r+s > |r-s| > 0$：一雙曲線與通過兩圓圓心的直線。
- $r+s > f > |r-s| > 0$：一雙曲線與一橢圓。
- $r+s > f = |r-s| > 0$：一橢圓與通過兩圓圓心的直線。
- $r+s > |r-s| > f > 0$：兩異同焦點橢圓。
- $r+s > |r-s| > f = 0$：兩異同心圓。
- $f > r+s = |r-s| > 0$：兩重合雙曲線。
- $f = r+s = |r-s| > 0$：兩重合通過兩圓圓心的直線。
- $r+s = |r-s| > f > 0$：兩重合橢圓。
- $r+s = |r-s| > f = 0$：兩重合圓。
- $f > r+s > |r-s| = 0$：一雙曲線與兩圓圓心連線的中垂線。
- $f = r+s > |r-s| = 0$：兩圓圓心連線的中垂線與通過兩圓圓心的直線。
- $r+s > f > |r-s| = 0$：一橢圓與兩圓圓心連線的中垂線。
- $r+s > f = |r-s| = 0$：一圓與整個平面。
- $f > r = s = 0$：兩重合兩圓圓心連線的中垂線。
- $f = r = s = 0$：兩重合整個平面。

ii 拋物線

另討論一圓（不失一般性地令其為 B）圓心在某方向無限遠處（此時 $f = \infty$）且其半徑為無限大且 $\infty > |f-s| > 0$ 時，則 B 圓周在非無限遠處形成一條直線，令稱 L，稱點 P 與直線 L 的以 P 在 B 圓內為負的有向距離為 $\overline{PL}$，稱以 A 圓心在 B 圓內為負的 A 圓心距直線 L 有向距離為 p，動點 P 軌跡方程（存在指在非無限遠處有實解，均不存在者省略）為：

- $G\colon \overline{PA} - r = \overline{PL}$：外切 A 於 B 外且切 L 於 B 外，或內切 A 於 B 內且切 L 於 B 內且公切圓在 A 內，發生於 $p + r \geq 0$，即 $f + r - s \geq 0$。
- $H\colon \overline{PA} - r = -\overline{PL}$：外切 A 於 B 內且切 L 於 B 內，或內切 A 於 B 外且切 L 於 B 外且公切圓在 A 內，發生於 $p - r \leq 0$，即 $f - r - s \leq 0$。
- $J\colon \overline{PA} + r = \overline{PL}$：外切 A 於 B 外且切 L 於 B 外，或內切 A 於 B 外且切 L 於 B 外且 A 在公切圓內，發生於 $p - r \geq 0$，即 $f - r - s \geq 0$。
- $M\colon \overline{PA} + r = -\overline{PL}$：外切 A 於 B 內且切 L 於 B 內，或內切 A 於 B 內且切 L 於 B 內且 A 在公切圓內，發生於 $p + r \leq 0$，即 $f + r - s \leq 0$。

G 的圖形為：

- $p+r>0$：以 A 圓心為焦點、以 L 向 B 圓心方向平移 r 為準線的拋物線。
- $p+r=0$：A 圓心向 B 圓心的反方向的半直線。

H 的圖形為：

- $p-r<0$：以 A 圓心為焦點、以 L 向 B 圓心的反方向平移 r 為準線的拋物線。
- $p-r=0$：A 圓心向 B 圓心方向的半直線。

J 的圖形為：

- $p-r>0$：以 A 圓心為焦點、以 L 向 B 圓心的反方向平移 r 為準線的拋物線。
- $p-r=0$：A 圓心向 B 圓心的反方向的半直線。

M 的圖形為：

- $p+r<0$：以 A 圓心為焦點、以 L 向 B 圓心方向平移 r 為準線的拋物線。
- $p+r=0$：A 圓心向 B 圓心的反方向的半直線。

所有情況的所有圖形為：

- $p+r>p-r>0$：B 圓外兩不相交開向 B 圓心的反方向的拋物線。
- $p+r=p-r>0$：B 圓外兩重合開向 B 圓心的反方向的拋物線。
- $p-r>p+r>0$：B 圓外兩不相交開向 B 圓心的反方向的拋物線。
- $p-r>p+r=0$：B 圓外一開向 B 圓心的反方向的拋物線與 A 圓心向 B 圓心的反方向的半直線。
- $p-r>0>p+r$：一開向 B 圓心的反方向的拋物線與一開向 B 圓心方向的拋物線交於 L 和 A 圓的兩交點。
- $p+r>p-r=0$：B 圓外一開向 B 圓心的反方向的拋物線與過 A、B 圓心的直線。
- $p+r=p-r=0$：過 A、B 圓心的直線。
- $p-r=0>p+r$：B 圓內一開向 B 圓心方向的拋物線與過 A、B 圓心的直線。
- $p+r>r-p>0$：B 圓內兩不相交開向 B 圓心方向的拋物線。
- $p+r=r-p>0$：B 圓內兩重合開向 B 圓心方向的拋物線。
- $r-p>p+r>0$：B 圓內兩不相交開向 B 圓心方向的拋物線。
- $r-p>p+r=0$：B 圓內一開向 B 圓心方向的拋物線與 A 圓心向 B 圓心的反方向的半直線。
- $r-p>0>p+r$：一開向 B 圓心的反方向的拋物線與一開向 B 圓心方向的拋物線交於 L 和 A 圓的兩交點。

3 Quadric Surface

I Cylinder

A cylinder is a surface that consists of all lines (called rulings) that are parallel to a given line and pass through a given plane curve. If the curve is a circle, it's called circular cylinder. If the curve is a ellipse, it's called elliptic cylinder. If the curve is a parabola, it's called parabolic cylinder. If the curve is a hyperbola, it's called hyperbolic cylinder. If the curve is a polygon, it's called prism.

II Quadric surface

i General equation

A quadric surface is the graph of a second-degree equation in three variables, that is,

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

By translation and rotation, it can be brought into either of the two standard forms (axis being z-axis and vertex being origin)

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + J = 0$$

or

$$Ax^2 + By^2 + Iz = 0.$$

ii Trace

Horizontal trace is the section of a plane parallel to the xy plane and the quadric surface.

Vertical trace is the section of a plane parallel to the z-axis and the quadric surface.

iii Types

In standard form, traces exclude trivial cases.

- Ellipsoid:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
All traces that pass through it are ellipses. If $a = b = c$, it's a sphere.
- Hyperboloid of one sheet:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$
Horizontal traces are ellipses. Vertical traces are hyperbolas. If $a = b$, horizontal traces are circles.

- Hyperboloid of two sheets:
$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
Horizontal traces for $|z| > c$ are ellipses. Vertical traces are hyperbolas. If $a = b$, horizontal traces are circles.

- (Elliptic) cone:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$
Horizontal traces are ellipses. Vertical traces are hyperbolas. If $a = b$, it's circular cone.

- Elliptic paraboloid:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$
Horizontal traces are ellipses. Vertical traces are parabolas. If $a = b$, it's circular paraboloid.

- Hyperbolic paraboloid:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}$$
Horizontal traces are hyperbolas. Vertical traces are parabolas.

- Parabolic cylinder:
$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}$$
Horizontal traces are two parallel lines. Vertical traces are parabolas.

- Elliptic cylinder:
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
Horizontal traces are ellipses. Vertical traces are two parallel lines. If $a = b$, it's circular cylinder.

- Two parallel planes:
$$\frac{x^2}{a^2} = 1$$
All traces are two parallel lines.

- Hyperbolic cylinder:
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$
Horizontal traces are hyperbolas. Vertical traces are two lines.