單變數實多項式函數

沈威宇

November 8, 2026

Contents

1 單變數實多項式函數 1
I 多項式（Polynomial） 1
II 單變數實多項式函數定理 1
i 領導係數（leading coefficient） 1
ii 最高次項次數 1
iii 除法原理/商定則（Quotient rule） 1
iv 餘式定理 1
v 因式定理 1
vi 恆等定理 1
III 零函數 1
IV 一元一次函數 2
i 一般式、標準式 2
ii 線性函數（Linear function） 2
iii 圖形特徵 2
iv 根數 2
V 一元二次函數 2
i 一般式 2
ii 標準式 2
iii 判別式 2
iv 根 2
v 圖形特徵 3
vi 根數 3

vii 根與係數關係 3
VI 一元三次函數 3
i 一般式 3
ii 標準式 3
iii 判別式 3
iv 根 4
v 圖形特徵 4
vi 根數 4
vii 根與係數關係 4
viii 卡丹諾公式（Cardino’s formula） 4
VII 單變數實多項式函數的導函數 5
VIII 多項式插值法（Polynomial Interpolation） 5
i 牛頓插值法（Newton’s Polynomial） 5
ii 拉格朗日插值法（Lagrange Polynomial） 6

1　單變數實多項式函數

I　多項式（Polynomial）

指由多個項（term）組成的代數表達式，每個項是常數（稱該項係數（coefficient））與零或正整數（為零則該項稱常數項（constant term））個變數的非負整數冪次的乘積。

II　單變數實多項式函數定理

下 $f(x)$、$g(x)$、$q(x)$、$r(x)$ 均為 x 的實多項式，a、b 為非零實數。

i　領導係數（leading coefficient）

指單變數多項式的最高次項係數。

ii　最高次項次數

$$\deg(af(x)\cdot g(x))=\deg(f(x))+\deg(g(x))$$

$$\deg(af(x)+bg(x))\le\max\big(\deg(f(x)),\deg(g(x))\big)$$

iii　除法原理/商定則（Quotient rule）

恰有一組 $q(x)$、$r(x)$ 滿足：

$$f(x)=g(x)\cdot q(x)+r(x),\quad \deg(r(x))<\deg(g(x))\vee r(x)=0$$

稱被除式 $f(x)$ 除以除式 $g(x)$ 的商式為 $q(x)$、餘式為 $r(x)$。若 $r(x)=0$ 則 $q(x)$ 為 $f(x)$ 的因式，$f(x)$ 為 $q(x)$ 的倍式。

iv　餘式定理

$f(x)$ 除以 $(ax+b)$ 的餘式為 $f\left(\frac{b}{a}\right)$。

v　因式定理

$f\left(\frac{b}{a}\right)=0$ 若且惟若 $ax+b$ 為 $f(x)$ 的因式。

vi　恆等定理

兩 n 次多項式 $f(x)$ 與 $g(x)$，若存在 $n+1$ 個相異數 a 使得 $f(a)=g(a)$，則 $f(x)=g(x)$。

III　零函數

$$f(x)=0$$

IV　一元一次函數

$a \neq 0$

i　一般式、標準式

$$f(x) = ax + b$$

其中 a 稱斜率，b 稱 y 截距。

ii　線性函數（Linear function）

零函數與一元一次函數合稱線性函數。

iii　圖形特徵

- 直線。
- 二階旋轉對稱點：圖形上任一點。
- 沒有反曲點。

iv　根數

一實根。

V　一元二次函數

$a \neq 0$

i　一般式

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

ii　標準式

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

其中 $(h, k) = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2 - 4ac}{4a} \right)$

iii　判別式

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

iv　根

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

v 圖形特徵

- 拋物線。
- 頂點、極值點、最值點：(h, k)。
- 對稱軸：$x = h$。
- 開口：a 為正，開口向上；a 為負，向下。$|a|$ 愈大，開口愈小。
- 沒有反曲點。

vi 根數

- $\Delta > 0$：二相異實根。
- $\Delta = 0$：一實根且為二重根。
- $\Delta < 0$：無實根，二相異共軛虛根，$a > 0$ 則 $f(x) > 0$，$a < 0$ 則 $f(x) < 0$。

vii 根與係數關係

令根 α、β

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}$$

VI 一元三次函數

$a \neq 0$

i 一般式

$$f(x) = ax^3 + bx^x + cx + d$$

ii 標準式

$$f(x) = a(x - h)^3 + p(x - h) + k$$

其中 $(h, p, k) = \left(-\frac{b}{3a}, c - \frac{b^2}{3a}, \frac{2b^3 - 9abc}{27a^2} + d\right)$

iii 判別式

$$\Delta = 18abc - 4a^3c + a^2b^2 - 4b^3 - 27c^2$$

iv 根

$$x = -\frac{b}{3a} + e^{\frac{i2\pi k}{3}}\sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a} + \sqrt{\left(\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}\right)^2 + \left(\frac{c}{3a} - \frac{b^2}{9a^2}\right)^3}}$$
$$+ e^{-\frac{i2\pi k}{3}}\sqrt[3]{\frac{bc}{6a^2} - \frac{b^3}{27a^3} - \frac{d}{2a}}, \quad k = 0, 1, 2$$

v 圖形特徵

- 頂點、二階旋轉對稱點、反曲點：(h, k)。
- 開口：$a > 0$ 則 $x > h$ 時向上、$x < h$ 時向下；$a < 0$ 則 $x < h$ 時向上、$x > h$ 時向下。
- 極值：$ap < 0$ 若且惟若存在二個極值點，$p = 0$ 若且惟若存在一個極值點（圖形單調遞增或減），$ap > 0$ 若且惟若不存在極值點（圖形嚴格遞增或減）。
- 最值點：不存在。
- 發散：a 為正，$x \to \infty$ 向上發散，$x \to -\infty$ 向下發散；a 為負，$x \to \infty$ 向下發散，$x \to -\infty$ 向上發散。$|a|$ 愈大，發散愈快。
- 頂點處斜率：p

vi 根數

- $\Delta > 0$：三相異實根。
- $\Delta = 0$：一實根且為三重根或二相異實根且其一為二重根。
- $\Delta < 0$：一實根，二相異共軛虛根。

vii 根與係數關係

令根 α、β、γ

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$
$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$
$$\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

viii 卡丹諾公式（Cardino's formula）

$x^3 = px + q$ 的判別式為：

$$\Delta = 4p^3 - 27q^2$$

根為：

$$x = e^{\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + e^{-\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}, \quad k = 0, 1, 2$$
$$= e^{\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{-\Delta}{108}}} + e^{-\frac{i2\pi k}{3}} \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{-\Delta}{108}}}, \quad k = 0, 1, 2$$

VII　單變數實多項式函數的導函數

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n = n \cdot x^{n-1}$$

Proof.

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} x^n &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\left(\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k \right) - x^n}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^k}{\Delta x} \\
&= \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} (\Delta x)^{k-1} \\
&= n x^{n-1}
\end{aligned}$$

□

VIII　多項式插值法（Polynomial Interpolation）

給定：

$$A = \{a_k \mid k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n\} \subseteq \mathbb{R} \text{ s.t. } \forall i \neq j : a_i \neq a_j,$$

$$B = \{b_k \mid k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n\} \subseteq \mathbb{R},$$

多項式插值法指找 到一個次數最多為 n 的多項式 $p(x)$ 使得：

$$\forall k \in \mathbb{N}_0 \wedge k \leq n : p(a_k) = b_k$$

的方法。

i　牛頓插值法（Newton's Polynomial）

定義差商（divided difference）：

$$\begin{cases}
f[a_i] = b_i, & i \in \mathbb{N}_0 \wedge i \leq n, \\
f[a_i, a_{i+1}] = \dfrac{f[a_{i+1}] - f[a_i]}{a_{i+1} - a_i}, & i \in \mathbb{N}_0 \wedge i \leq n - 1, \\
f[(a_i)_{i=j}^{k}] = \dfrac{f[(a_i)_{i=i+1}^{k}] - f[(a_i)_{i=j}^{k-1}]}{a_k - a_j}, & j < k \leq n \wedge j, k \in \mathbb{N}_0.
\end{cases}$$

則：

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} f[(a_i)_{i=0}^{k}] \prod_{i=0}^{k-1} (x - a_i).$$

ii　拉格朗日插值法（Lagrange Polynomial）

標準形式：定義基函數（base function）：

$$\ell_k(x) = \prod_{a \in A \setminus \{a_k\}} \frac{x - a}{a_k - a}$$

則：

$$p(x) = \sum_{k=0}^{n} b_k \ell_k(x).$$

重心形式（Barycentric form）：定意權重（weight）：

$$w_k = \prod_{a_i \in A \setminus \{a_k\}} \frac{1}{a_k - a_i}$$

則：

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\sum_{k=0}^{n} \frac{b_k w_k}{x - a_k}}{\sum_{k=0}^{n} \frac{w_k}{x - a_k}}, & x \notin A. \\ b_k, \quad x = a_k \in A. \end{cases}$$