男性 HPV 感染：家庭健康不能忽视的“隐秘角落”

□寇　卉（西北妇女儿童医院 陕西西安 710005）

在家庭健康管理的日常讨论中，HPV（人乳头状瘤病毒）感染常被认为是女性专属的健康议题，从宫颈癌筛查到 HPV 疫苗接种，话题的焦点几乎始终围绕着女性群体。但事实上，男性同样是 HPV 感染的重要群体，其感染带来的健康风险不仅影响男性自身，更会波及整个家庭。作为守护家庭健康的重要一环，男性 HPV 感染的相关知识值得每个家庭成员深入了解。

男性 HPV 感染：被低估的健康威胁

HPV 是全球范围内广泛传播的性传播病毒。研究数据显示，男性生殖器 HPV 感染率高达 45.2%，尤其在性生活活跃且未采取保护措施的男性群体中，这一比例可能更高。目前已知的 HPV 亚型超过 200 种，其中约 40 种与生殖道感染相关。这些病毒根据致癌风险可分为低危型和高危型。

低危型 HPV 以HPV-6 和 HPV-11 为代表，主要引起皮肤和黏膜的异常增生，常会导致尖锐湿疣的出现，一般不具备致癌性。

高危型 HPV 如 HPV-16 和 HPV-18，与阴茎癌、肛门癌、口咽癌等多种恶性肿瘤的发生密切相关。

HPV 传播途径主要有性传播和间接接触传播两种

性传播 这是 HPV 最主要的传播途径。无保护性行为、多个性伴侣、同性性行为等，都会显著增加 HPV 感染风险。即使正确使用避孕套，也无法完全覆盖所有可能感染的区域，因此避孕套虽能降低感染概率，但不能杜绝 HPV 传播。

间接接触传播 虽然 HPV 传染的概率相对较低，但共用毛巾、浴盆、马桶圈等个人卫生用品若被 HPV 污染，接触后也存在感染的可能性。尤其是在卫生条件较差、人群密集的场所，间接传播风险会有所增加。

男性 HPV 感染的现状：无声无息的潜伏者

症状隐匿，极易被忽视 多数男性感染 HPV 后，并不会出现明显症状，处于隐匿感染状态。这使得病毒更容易在不知不觉中传播给性伴侣。少数感染者可能出现生殖器疣（尖锐湿疣），表现为生殖器或肛门周围出现菜花样赘生物。此外，部分患者可能出现阴茎龟头溃疡、红斑等表现，但这些症状常常被误认为是普通的炎症，未能引起重视，从而延误诊断和治疗。

筛查意识薄弱，检测手段有限 与女性拥有较为规范的宫颈癌筛查体系不同，目前对男性 HPV 感染尚缺乏广泛普及且特异性强的筛查手段。加上男性的自身筛查意识淡薄，使得许多 HPV 感染未能及时被发现，病毒在体内持续潜伏，增加了传播和致病风险。

男性 HPV 感染的潜在危害：影响家庭健康的多重风险

生殖器病变：困扰生活的“小麻烦” 低危型 HPV 感染最常见的表现是生殖器疣。这些疣体不仅影响外观，给患者带来心理压力，还具有较高的复发率。部分患者在治疗后 6 个月内，生殖器疣可能再次出现。频繁复发的生殖器疣不仅严重影响患者的生活质量，还可能导致患者出现焦虑、抑郁等心理问题。此外，生殖器疣还可能引起局部瘙痒、疼痛，影响正常的性生活，进而影响夫妻关系和家庭和谐。

癌症风险：危及生命的“定时炸弹” 高危型 HPV 的持续感染是男性多种恶性肿瘤发生的重要危险因素。在阴茎癌患者中，高危型 HPV 的检出率较高，尤其是 HPV-16 和 HPV-18 亚型。肛门癌在男性同性恋人群中

中国知网 https://www.cnki.net

发病率较高，约80%以上的肛门癌患者可检测到高危型HPV。此外，口咽癌与HPV感染的关系也日益受到关注，口腔性行为可能导致口腔黏膜感染高危型HPV，进而增加口咽癌的发病风险。这些恶性肿瘤严重威胁男性的生命健康，一旦患病，整个家庭都将承受巨大的经济和精神压力。

生育风险：影响家庭传承的“绊脚石” 研究发现，男性精液中若存在HPV感染，会对精子质量产生负面影响。HPV感染可能影响精子的活力、形态和DNA完整性，导致精子运动能力下降、畸形精子增多，增加精子DNA断裂的风险。此外，HPV感染还可能引发附睾炎、睾丸炎等生殖系统炎症，损害生精功能，导致精子生成减少或质量下降，从而影响男性的生育能力，或影响下一代的健康。

伴侣感染风险：波及全家的“健康危机” 男性感染HPV后，即使自身没有明显症状，也可在性行为过程中将病毒传染给女性伴侣。女性感染高危型HPV后，若持续感染，可能导致宫颈上皮内癌变，进一步发展为宫颈癌。此外，男性HPV感染还可能增加女性患阴道癌、外阴癌等疾病的风险。在妊娠过程中，HPV感染还可能影响胚胎发育，导致自然流产、早产、胎膜早破等不良妊娠结局，对母婴健康造成严重威胁。

男性HPV感染的预防：守护家庭健康的防线

接种HPV疫苗：家庭健康的“保护伞” HPV疫苗是预防HPV感染的有效手段，对男性同样适用。目前适用于男性的四价和九价HPV疫苗不仅能预防高危型HPV感染，降低男性患生殖器疣、肛门癌、阴茎癌、口咽癌等疾病的风险，还能减少将病毒传播给性伴侣的概率。研究表明，接种HPV疫苗后，男性生殖器疣的发病率显著降低。

男性包皮环切：降低感染风险的“小手术，大作用” 越来越多的研究表明，男性包皮环切术可降低HPV感染率。包皮环切术通过切除过长的包皮，减少包皮垢的形成，改善局部卫生状况，降低HPV感染风险。同时，包皮环切术还能降低女性患宫颈癌和其他性传播疾病的风险，对男女双方的生殖健康都具有保护作用。

安全性行为：夫妻健康的“守护者” 坚持安全性行为是预防HPV感染的重要措施。全程正确使用避孕套虽然不能完全杜绝HPV感染，但能有效地降低感染风险。此外，应避免高危性行为，如无保护的肛交、口交等，保持单一、稳定的性伴侣关系，等。这些措施都有助于降低HPV感染概率。

定期体检：家庭健康的“预警器” 尽管目前缺乏针对男性HPV感染的特异性筛查手段，但定期进行生殖系统检查，有助于早期发现生殖器病变或其他相关疾病。对有多个性伴侣、同性性行为、免疫功能低下等高危因素的男性，更应增加体检频率，以便及时发现潜在的健康问题，采取相应的干预措施。

男性HPV感染后的应对：全家携手战胜病毒

正确认识，保持良好心态 对免疫力正常的男性，约80%的HPV感染可在1～2年被免疫系统自动清除。因此，确诊HPV感染后不必过度焦虑，保持良好的心态、适度锻炼、均衡饮食，增强免疫力，是防治HPV的关键。

规范治疗，听从医生指导 若感染低危型HPV并出现尖锐湿疣，可采用激光、冷冻、电灼等物理治疗方法，直接去除疣体；也可使用外用药物，抑制病毒生长，促进疣体脱落。高危型HPV持续感染的患者需定期进行监测，通过HPV DNA检测、组织活检等方法，密切观察病毒感染情况及是否出现细胞病变。一旦发现有癌变倾向，应及时采取相应的治疗措施。

伴侣同治，防止交叉感染 由于HPV感染具有性传播特点，性伴侣双方应同时进行检查和治疗。治疗期间应避免无保护性行为，防止交叉感染，导致病情反复。只有双方共同配合，积极治疗，才能有效清除病毒，摆脱HPV感染的困扰。家庭作为一个整体，在面对HPV感染时，需要夫妻双方携手共进，共同战胜疾病，守护家庭健康。

中国知网 https://www.cnki.net